

护理专业资格考试

通关
宝典

2009年 护士执业资格考试 习题精选集

崔景晶 颜琬华 许红梅 主编

- 紧扣最新考试大纲
- 精选典型习题 2500 道
- 涵盖考试大纲重要考点

提高复习效率 掌握考试重点



化学工业出版社
生物·医药出版分社

护理专业资格考试

通关
宝典

2009年
护士执业资格考试
习题精选集

崔景晶 颜琬华 许红梅 主编



化学工业出版社
生物·医药出版分社

· 北京 ·

本书根据最新护士资格考试大纲编写,将考纲中要求掌握的知识点用习题的形式列出,习题类型与考试题型相同,包括A型、B型和X型,共提供2500余道习题。本书可帮助考生掌握考试要点、提高复习效率。本书适合参加执业护士资格考试的考生和护理专业在校生参考。

图书在版编目(CIP)数据

2009年护士执业资格考试习题精选集/崔景晶,颜琬华,
许红梅主编. —北京:化学工业出版社,2009.1
(护理专业资格考试通关宝典)
ISBN 978-7-122-04419-8

I. 2… II. ①崔…②颜…③许… III. 护士-资格考核-
习题 IV. R192.6-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第201551号

责任编辑:赵兰江 蔡红
责任校对:洪雅姝

文字编辑:戴小玲
装帧设计:关飞

出版发行:化学工业出版社 生物·医药出版分社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印刷:北京云浩印刷有限责任公司
装订:三河市宇新装订厂
787mm×1092mm 1/16 印张12½ 字数362千字 2009年3月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:26.00元

版权所有 违者必究

编写人员名单

主 编 崔景晶 颜琬华 许红梅

副主编 韩瑞敏 于秀荣 纪洪新 王海英 孙丽红

编 者 (以姓氏笔画为序)

于秀荣 于玲莉 王 辉 王海英 毛雪梅

乔昌秀 刘 莉 许红梅 孙丽红 纪洪新

杨 敏 沙卫华 张 丽 张晓丽 张雪雁

赵芳芹 赵晓敏 徐仁华 高云秀 郭红丽

唐永云 韩瑞敏 崔景晶 颜琬华

前

言

为了使我国护理队伍的管理更加规范,根据《中华人民共和国执业护士法》,卫生部制定并实施了护士资格考试制度,自1995年起每年举行一次执业护士考试。国家进行执业护士考试的目的是全面提高护理人员的专业技术水平,限制不合格人员从事护理工作,其最终目标是确保从业护士为病人提供高水平的优质护理服务。

执业护士考试的主要内容为护理基本理论、基本知识、基本技能,涉及内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、护理学基础5门课程。在短短数个月的时间内,在繁忙的临床护理工作之余,很难通过有关教材全面复习。为此,我们组织了各专业富有经验的护理学教师,根据最新考试大纲编写了本书。

本书紧扣卫生部护理资格考试委员会和国家医学考试中心修订的2009年考试大纲,根据考试范围和题型分章节编写,力求习题典型,使考生在尽量短的时间内,全面地掌握考点,并提高护理理论水平,在轻松应对考试的同时使临床护理水平有质的飞跃。

为了帮助考生顺利通过考试,我们从各个方面做了不懈的努力,但不当之处在所难免,恳请同行专家和广大考生批评指正。

最后,衷心祝愿考生朋友们顺利通过本次考试,成为一名优秀的白衣天使!

编 者

2008年11月

目

录

第一章 内科护理学 1

- 第一单元 绪论 1
- 第二单元 呼吸系统疾病病人的护理 6
- 第三单元 循环系统疾病病人的护理 13
- 第四单元 消化系统疾病病人的护理 20
- 第五单元 泌尿系统疾病病人的护理 29
- 第六单元 血液系统疾病病人的护理 32
- 第七单元 内分泌与代谢疾病病人的护理 35
- 第八单元 风湿性疾病病人的护理 39
- 第九单元 神经系统疾病病人的护理 42

第二章 外科护理学 46

- 第一单元 水、电解质酸碱代谢失调的
护理 46
- 第二单元 外科休克病人的护理 48
- 第三单元 多器官功能障碍综合征 51
- 第四单元 麻醉病人的护理 53
- 第五单元 心肺脑复苏 54
- 第六单元 外科围手术期护理 56
- 第七单元 外科感染病人的护理 58
- 第八单元 损伤病人的护理 60
- 第九单元 营养支持病人的护理 62
- 第十单元 肿瘤病人的护理 63
- 第十一单元 颈部疾病病人的护理 65
- 第十二单元 乳房疾病病人的护理 66
- 第十三单元 腹外疝病人的护理 67
- 第十四单元 急性化脓性腹膜炎与腹部损伤
病人的护理 69
- 第十五单元 胃、十二指肠疾病病人的
护理 71
- 第十六单元 肠道疾病病人的护理 72
- 第十七单元 直肠、肛管疾病病人的护理 74
- 第十八单元 门脉高压症与原发肝癌
病人的护理 76
- 第十九单元 胆道疾病病人的护理 78

第二十单元 胰腺疾病病人的护理 79

第二十一单元 急腹症病人的护理 81

第二十二单元 周围血管疾病病人的护理 82

第二十三单元 颅内压增高与颅脑损伤病人的
护理 83第二十四单元 胸部外伤与食管癌病人的
护理 85第二十五单元 泌尿及男性生殖系统疾病病人
的护理 87

第二十六单元 骨与关节疾病病人的护理 89

第三章 妇产科护理学 92

第一单元 女性生殖系统解剖 92

第二单元 女性生殖系统生理 93

第三单元 妊娠生理 94

第四单元 妊娠期孕妇的护理 95

第五单元 分娩期产妇的护理 97

第六单元 产褥期妇女的护理 98

第七单元 围生医学概念 99

第八单元 新生儿护理 99

第九单元 异常妊娠孕妇的护理 100

第十单元 妊娠合并症产妇的护理 103

第十一单元 异常分娩产妇的护理 104

第十二单元 分娩期并发症产妇的护理 105

第十三单元 产褥感染产妇的护理 107

第十四单元 胎儿及新生儿异常的护理 108

第十五单元 产科手术受术者的护理 109

第十六单元 妇科护理病史特点及检查的
配合 110第十七单元 女性生殖系统炎症病人的
护理 111第十八单元 女性生殖系统肿瘤病人的
护理 113

第十九单元 滋养细胞疾病病人的护理 115

第二十单元 月经失调病人的护理 117

第二十一单元 妇科其他疾病病人的护理 119

第二十二单元	妇产科常用手术及护理	120
第二十三单元	计划生育	122
第四章	儿科护理学	124
第一单元	绪论	124
第二单元	儿童保健	124
第三单元	儿童医疗组织机构组织特点	126
第四单元	儿科基础护理	127
第五单元	儿科护理技术操作	127
第六单元	新生儿及患病新生儿的护理	128
第七单元	营养性疾病患儿的护理	129
第八单元	消化系统疾病患儿的护理	130
第九单元	呼吸系统疾病患儿的护理	132
第十单元	循环系统疾病患儿的护理	134
第十一单元	造血系统疾病患儿的护理	136
第十二单元	泌尿系统疾病患儿的护理	138
第十三单元	神经系统疾病患儿的护理	141
第十四单元	常见传染病患儿的护理	142
第十五单元	结核病患儿的护理	144
第十六单元	常见急症患儿的护理	145

第五章	护理学基础	147
第一单元	绪论	147
第二单元	护士素质和行为规范	147
第三单元	护理程序	148
第四单元	医院和住院环境	152
第五单元	入院和出院病人的护理	154
第六单元	卧位和安全的护理	157
第七单元	医院内感染的预防和控制	159
第八单元	患者的清洁护理	163
第九单元	生命体征的评估	165
第十单元	病人饮食的护理	169
第十一单元	冷热疗法	171
第十二单元	排泄护理	172
第十三单元	药物疗法和过敏试验法	176
第十四单元	静脉输液与输血法	180
第十五单元	标本采集	182
第十六单元	病情观察和危重病人的抢救	184
第十七单元	临终病人的护理	187
第十八单元	医疗和护理文件的书写	189

第一章

内科护理学

第一单元 绪 论

A 型题

1. 水冲脉的特点
 - A. 脉搏不规则的搏动
 - B. 平静吸气时脉搏显著减弱
 - C. 脉搏强—弱交替出现
 - D. 脉搏骤起骤落
 - E. 脉搏细速
2. 同一时间测脉率少于心率称
 - A. 脉搏短绌
 - B. 奇脉
 - C. 期前收缩
 - D. 交替脉
 - E. 缓冲脉
3. 呼吸加深而次数稍快, 主要见于
 - A. 呼吸性酸中毒
 - B. 肺气肿
 - C. 代谢性酸中毒
 - D. 肺炎
 - E. 呼吸性碱中毒
4. 按“浅慢→深快→浅慢→暂停 30s→重复”呼吸的类型称为
 - A. 间停呼吸
 - B. 潮式呼吸
 - C. 毕奥呼吸
 - D. 酸中毒大呼吸
 - E. 临终呼吸
5. 脉压增大可见于
 - A. 低血压
 - B. 甲亢
 - C. 心功能不全
 - D. 心包积液
 - E. 二尖瓣狭窄
6. 胸骨左缘第二肋间为哪个瓣膜听诊区
 - A. 主动脉瓣第一听诊区
 - B. 二尖瓣听诊区
 - C. 肺动脉瓣听诊区
 - D. 主动脉第二听诊区
 - E. 三尖瓣听诊区
7. 提示慢性病容的是
 - A. 面容灰暗、憔悴、表情疲惫
 - B. 面容枯槁、灰白、表情淡漠
 - C. 面颊潮红、兴奋、表情痛苦
 - D. 面容苍白、惊愕、目光呆滞
 - E. 面容晦暗、紫红、口唇发绀
8. 哪种情况不易出现发绀
 - A. 肺心病心力衰竭
 - B. 严重贫血
 - C. 重度一氧化碳中毒
 - D. 先天性心脏病
 - E. 急性呼吸道阻塞
9. 病人不能调整或变换肢体的体位属于
 - A. 主动体位
 - B. 强迫体位
 - C. 瘫痪体位
 - D. 被动体位
 - E. 疼痛体位
10. 舟状腹最常见于
 - A. 肝硬化
 - B. 肾病综合征
 - C. 恶性肿瘤晚期
 - D. 结核性腹膜炎
 - E. 心功能不全
11. 腹部触诊有“揉面感”提示
 - A. 急性胃穿孔
 - B. 肝硬化腹水
 - C. 结核性腹膜炎
 - D. 急性胰腺炎
 - E. 急性胃扩张
12. 正常人的肝脏触诊
 - A. 一般摸不到
 - B. 平静呼吸时可触到 1cm 以内的肝下缘
 - C. 深呼吸时在肋弓下可触及 2cm 以内的肝下缘
 - D. 剑突下可触及 4cm 以内的肝下缘
 - E. 在剑突下可触及 4cm 以上的肝下缘

13. 上腹部可见到自左向右移动的胃蠕动波应考虑是
- 幽门梗阻
 - 肠麻痹
 - 肠穿孔
 - 急性胃扩张
 - 腹膜炎
14. 皮肤或黏膜下出血直径为 4mm 称为
- 斑疹
 - 红痣
 - 瘀点
 - 紫癜
 - 瘀斑
15. 意识模糊可有
- 错觉、幻觉
 - 醒觉时反应迟钝
 - 醒时答话含糊不清
 - 定向力丧失, 乱语躁动
 - 大小便失禁
16. 下述哪个体征为深反射
- 巴宾斯基征
 - 膝腱反射
 - 戈登征
 - 奥本海姆征
 - 布鲁津斯基征
17. 双侧瞳孔缩小见于
- 颅内压增高
 - 阿托品中毒
 - 脑疝
 - 硬脑膜下血肿
 - 乐果中毒
18. B 超不适用于
- 肝脏检查
 - 胆囊检查
 - 子宫检查
 - 胰腺检查
 - 骨骼检查
19. 心电图图中, P 波是表示
- 心房除极波
 - 右心房除极波
 - 左心房除极波
 - 心室除极波
 - 心室复极波
20. 白细胞中嗜酸性粒细胞减少见于
- 化脓性感染
 - 支气管哮喘
 - 病毒性肝炎
 - 活动性结核
 - 长期应用糖皮质激素
21. 下列属于双极肢体导联的是
- aVL 导联
 - V₁ 导联
 - aVF 导联
 - Ⅲ导联
 - V₅ 导联
22. 外周血中网织红细胞变化是反映
- 红细胞破坏程度
 - 机体缺氧程度
 - 体内铁缺乏水平
 - 失血量多少
 - 骨髓造血功能盛衰
23. 最能反映贫血的实验室检查指标是
- 红细胞计数
 - 网织红细胞计数
 - 血红蛋白测定
 - 红细胞沉降率
 - 血细胞比容测定
24. 网织红细胞增多见于
- 妊娠中、后期
 - 严重缺氧
 - 骨髓造血功能亢进
 - 骨髓造血功能不良
 - 严重脱水
25. 窦性心动过速不会发生于下列哪种情况
- 甲状腺功能减退症
 - 发热
 - 甲状腺功能亢进症
 - 运动
 - 贫血
26. 尿浓缩与稀释功能试验结果: 尿比重固定在 1.010 左右时表示
- 肾功能不全早期
 - 肾浓缩功能不全
 - 肾浓缩功能严重障碍
 - 病人有脱水
 - 肾小球滤过率下降
27. 内生肌酐清除率应收集
- 2h 尿
 - 4h 尿
 - 12h 尿
 - 24h 尿
 - 72h 尿
28. 肉眼血尿尿中含血量至少
- 1ml
 - 2ml
 - 3ml
 - 4ml
 - 5ml
29. 镜下脓尿是指镜检尿白细胞每高倍镜下
- >3 个
 - >5 个
 - >10 个
 - >100 个
 - 满视野
30. 做清洁中段尿培养, 正确的是
- 取在膀胱内停留 6~8h 的尿液
 - 宜在停用抗生素 48h 后收集尿液
 - 留取尿液前用消毒剂清洗外阴部
 - 尿液留置清洁器皿内
 - 尿标本如不能送检, 应加防腐剂
31. 肾炎有肾实质性病变者尿中可出现
- 絮状混合物
 - 块状混合物

- C. 脓细胞 D. 上皮细胞
E. 管型
32. 尿呈烂苹果气味的疾病是
A. 膀胱直肠癌 B. 肝硬化
C. 膀胱炎 D. 糖尿病酮症
E. 肝性脑病
33. 粪便隐血试验检查前避免食用大量
A. 蛋类 B. 动物肝、血
C. 面食 D. 甜食
E. 水果
34. 急性胆道梗阻病人的粪便是
A. 柏油样便 B. 米泔水样便
C. 鲜血便 D. 果酱样便
E. 白陶土样便
35. 血清钾升高常见于
A. 补钾过多 B. 肾衰竭
C. 呕吐 D. 严重腹泻
E. 大量利尿
36. 心电图不能直接提供诊断依据的是
A. 心律失常 B. 心肌梗死
C. 高钾血症 D. 心肌收缩力
E. 心肌缺血
37. 夜尿增多提示
A. 肾小管浓缩功能减退
B. 肾小管浓缩功能增强
C. 肾小管功能损害
D. 肾小管功能减退
E. 肾小管功能增强
38. 尿蛋白定量标本瓶中的防腐剂是
A. 稀盐酸 B. 甲苯
C. 甲醛 D. 碳酸
E. 浓盐酸
39. 胆囊或胰腺超声检查前应禁食
A. 8h B. 4h
C. 12h D. 24h
E. 6h
40. 血中白蛋白/球蛋白正常比例为
A. (1~2):1 B. (1.5~2):1
C. (1.5~2.5):1 D. (3~4):1
E. (1.5~3.5):1
41. 肝硬化病人当白蛋白低于多少时会出现水肿和腹水
A. 25g/L B. 35g/L
C. 45g/L D. 15g/L
E. 50g/L
42. 乳酸脱氢酶增高主要见于
A. 急性心肌梗死 B. 阻塞性黄疸
C. 急性溶血 D. 急性肝炎
E. 急性肾炎
43. 病人, 女性, 65岁。行走方式为初起步时步伐缓慢, 步幅小, 以后步频增快, 身体前倾似踉跄状, 不能马上停止。该步态称为
A. 慌张步态 B. 剪刀式步态
C. 蹒跚步态 D. 醉酒步态
E. 舞蹈步态
44. 被检者仰卧, 先将其一侧髋关节、膝关节屈成直角, 再将该侧小腿抬高伸膝, 正常人可将膝关节伸达 135° (角), 若伸膝在 135° (角) 以内出现抵抗或疼痛, 即为
A. 凯尔尼格征阳性
B. 布鲁津斯基征阳性
C. 戈登征阳性
D. 奥本海姆征阳性
E. 巴宾斯基征阳性
45. 病人, 男性, 45岁。因发热 39℃ 左右 3 天入院。检查血常规显示: 红细胞计数 $4.5 \times 10^{12}/L$, 血红蛋白 140g/L, 白细胞 $13.5 \times 10^9/L$, 其中中性粒细胞占 80%, 淋巴细胞占 20%。考虑可能是
A. 真菌感染
B. 急性细菌感染
C. 急性病毒感染
D. 系统性红斑狼疮
E. 恶性肿瘤早期
46. 病人, 女性, 38岁。其脉搏随深吸气逐渐减弱甚至消失, 呼气时又有所加强, 该脉搏称为
A. 不整脉 B. 奇脉
C. 水冲脉 D. 交替脉
E. 间歇脉
47. 病人突然诉说头痛不适、心慌、胸闷, 测量脉搏为 45 次/分, 考虑可能为
A. 早期心功能不全 B. 肺性脑病
C. 贫血 D. 房室传导阻滞
E. 周围循环衰竭
48. 病人, 男性, 25岁。肝硬化腹水。近日来神志恍惚, 答非所问, 行为反常, 呼吸中嗅到异味。该异味可能的特点是
A. 刺激性蒜味 B. 肝腥味
C. 烂苹果味 D. 氨味

- E. 恶臭味
49. 一患者水肿伴肝肿大, 颈静脉怒张、肝静脉回流征阳性, 应考虑的疾病是
- A. 心肌炎 B. 慢性肾炎
C. 肝硬化 D. 左心功能不全
E. 右心功能不全
50. 陆女士, 30岁。近1周出现尿频、尿急、尿痛。尿液检查: 白细胞6个/HP, 红细胞2个/HP。应判断为
- A. 镜下血尿 B. 镜下脓尿
C. 正常尿液 D. 管型尿
E. 以上都不是
51. 病人, 男性, 19岁。因发热、咳嗽、痰多2天入院, 诊断为“左下大叶性肺炎”。该病人的阳性表现不包括
- A. 左下肺X线显示大片云雾状阴影
B. 左下肺闻及较多水泡音
C. 左侧胸部语颤增强
D. 胸片显示左肺叶间裂积液
E. 左侧胸部可闻及弥漫性哮鸣音
52. 黄女士, 高热、腰酸1天, 尿检查: 白细胞满视野, 大量上皮细胞, 应考虑
- A. 急性肾炎 B. 慢性肾炎
C. 肾脏肿瘤 D. 急性肾盂肾炎
E. 泌尿系统结石
53. 赵先生, 30岁。右侧胸痛5天, 气促2天入院。胸腔积液检查结果: 外观红色, 浑浊, 比重1.020, 黏蛋白定性试验阳性, 细胞计数 $0.80 \times 10^9/L$ 。应考虑
- A. 化脓性胸膜炎 B. 肺癌
C. 结核性胸膜炎 D. 肝硬化
E. 右心功能不全
54. 李女士26岁。血红蛋白40g/L, 白细胞计数 $2.5 \times 10^9/L$, 血小板计数 $23 \times 10^9/L$ 。最可能是
- A. 急性白血病
B. 特发性血小板减少性紫癜
C. 再生障碍性贫血
D. 溶血性贫血
E. 缺铁性贫血
55. 患者男性, 69岁。间断腹泻1年, 有轻度贫血, 需做粪便隐血试验。目前病人正在服用硫酸亚铁和硝苯地平药物, 刷牙时偶有出血。留取标本时错误的方法是
- A. 晚餐不要进食动物肝、血
B. 牙龈出血时唾液不要咽下
C. 停用以前所有的药物
D. 保持盛粪便的容器干燥
E. 留一小块粪便即可
- (56~59题共用题干)
- 患者男性, 36岁。突发性呼吸困难1h来诊。查体: 呼吸30次/分, 呼气相延长, 双肺满布哮鸣音。
56. 上述病例属于哪种呼吸困难
- A. 吸气性呼吸困难
B. 呼气性呼吸困难
C. 夜间阵发性呼吸困难
D. 混合性呼吸困难
E. 劳力性呼吸困难
57. 该病人可能的诊断是
- A. 心源性哮喘 B. 自发性气胸
C. 支气管哮喘 D. 大叶性肺炎
E. 急性支气管炎
58. 该病人的面容可能是
- A. 病危病容 B. 无特殊病容
C. 慢性病容 D. 急性病容
E. 面具病容
59. 护理过程中, 置病人于下列哪种体位
- A. 坐位、半坐位
B. 平卧
C. 中凹卧位
D. 端坐位且双腿下垂
E. 侧卧位
- B型题**
- (60~62题共用备选答案)
- A. 杵状指 B. 匙状指
C. 关节梭状畸形 D. 膝内翻畸形
E. 肢端关节肥大
60. 慢性肺脓肿可见的体征为
61. 缺铁性贫血可见的体征为
62. 类风湿关节炎可见的体征为
- (63~65题共用备选答案)
- A. 交替脉 B. 水冲脉
C. 短绌脉 D. 奇脉
E. 重脉搏
63. 左心衰竭可出现的脉搏异常是
64. 房颤可出现的脉搏异常是
65. 主动脉瓣关闭不全可出现的脉搏异常是
- (66~68题共用备选答案)

- A. 嗜睡
- B. 意识模糊
- C. 昏睡
- D. 浅昏迷
- E. 深昏迷

66. 病人无意识,但瞳孔对光反应等仍存在属于
 67. 病人出现错觉、幻觉属于
 68. 病人不易唤醒,但压迫眶上神经可醒属于

X 型题

69. 做 X 线透视检查前,哪些物品必须除去

- A. 纽扣
- B. 膏药
- C. 金属物品
- D. 内衣
- E. 敷料

70. 气管向健侧移位常见于

- A. 气胸
- B. 胸腔积液
- C. 肺不张
- D. 胸膜粘连
- E. 纵隔肿瘤

71. 三凹征是指哪些部位明显凹陷

- A. 胸骨上窝
- B. 锁骨上窝
- C. 锁骨下窝
- D. 肋间隙
- E. 腹上角

72. 不属于健康肺部叩诊音的有

- A. 实音
- B. 鼓音
- C. 过清音
- D. 浊音
- E. 清音

73. 加强老年患者用药检测的护理措施是

- A. 减少常规用量
- B. 重视体征而非病人主诉
- C. 有轻微药物反应应立即停药
- D. 静脉滴药必须控制滴速
- E. 宜长期使用半衰期长的药物

74. 中性粒细胞增多见于

- A. 肺炎球菌性肺炎
- B. 败血症
- C. 放射线损害
- D. 脾功能亢进
- E. 粒细胞性白血病

75. 瞳孔散大可见于下列哪些情况

- A. 巴比妥类中毒
- B. 有机磷农药中毒
- C. 视神经萎缩
- D. 阿托品中毒
- E. 深度肝昏迷者

76. 下列哪些情况尿酮体检查可为阳性

- A. 高脂饮食
- B. 失眠
- C. 剧烈运动
- D. 老年人
- E. 妊娠剧吐

77. 腹部超声检查前的准备包括

- A. 前一天晚餐进清淡饮食

- B. 次日晨饮大量水或饮料

- C. 检查前应排便

- D. 便秘者前一天晚应服缓泻药

- E. 无须特殊准备

78. 颈静脉怒张常见于

- A. 心包积液
- B. 右心衰竭
- C. 左心衰竭
- D. 纵隔肿瘤
- E. 甲状腺肿大

79. 绝对性红细胞增多见于

- A. 肺源性心脏病
- B. 妊娠中期
- C. 剧烈体力活动
- D. 大面积烧伤
- E. 严重肺气肿

80. 肠鸣音亢进见于哪些疾病

- A. 急性肠炎
- B. 肠麻痹
- C. 胃肠道大出血
- D. 机械性肠梗阻
- E. 肝硬化

参考答案

- | | | |
|---------|---------|----------|
| 1. D | 2. A | 3. C |
| 4. B | 5. B | 6. C |
| 7. A | 8. B | 9. D |
| 10. C | 11. C | 12. A |
| 13. A | 14. D | 15. A |
| 16. B | 17. E | 18. E |
| 19. A | 20. E | 21. D |
| 22. E | 23. C | 24. C |
| 25. A | 26. C | 27. D |
| 28. A | 29. B | 30. A |
| 31. E | 32. D | 33. B |
| 34. E | 35. B | 36. D |
| 37. A | 38. B | 39. C |
| 40. C | 41. A | 42. A |
| 43. A | 44. A | 45. B |
| 46. B | 47. D | 48. B |
| 49. E | 50. B | 51. E |
| 52. D | 53. C | 54. C |
| 55. C | 56. B | 57. C |
| 58. D | 59. A | 60. A |
| 61. B | 62. C | 63. A |
| 64. C | 65. B | 66. D |
| 67. B | 68. C | 69. ABCE |
| 70. ABE | 71. ABD | 72. ABCD |
| 73. ACD | 74. ABE | 75. CDE |
| 76. ACE | 77. ACD | 78. ABD |
| 79. ACE | 80. ACD | |

第二单元 呼吸系统疾病病人的护理

A 型题

1. 痰液恶臭提示有
 - A. 病毒感染
 - B. 厌氧菌感染
 - C. 结核杆菌感染
 - D. 衣原体感染
 - E. 支原体感染
2. 吸气性呼吸困难病人典型体征是
 - A. 发绀
 - B. 肺部听诊湿啰音
 - C. 呼吸困难伴有三凹征
 - D. 桶状胸
 - E. 哮鸣音
3. 大量咯血是指 24h 咯血量超过
 - A. 200ml
 - B. 300ml
 - C. 400ml
 - D. 500ml
 - E. 700ml
4. 咯血直接的致死原因为
 - A. 肺不张
 - B. 肺部感染
 - C. 窒息
 - D. 情绪紧张
 - E. 左心衰竭
5. 声音嘶哑见于声带发炎或纵隔肿瘤压迫
 - A. 迷走神经
 - B. 喉返神经
 - C. 颈交感神经
 - D. 臂丛神经
 - E. 面神经
6. 支气管哮喘最典型的临床表现是
 - A. 流清鼻涕, 连打喷嚏
 - B. 发作性吸气性呼吸困难
 - C. 混合性呼吸困难
 - D. 端坐呼吸
 - E. 发作性呼气性呼吸困难
7. 控制哮喘急性发作的首选药物是
 - A. 茶碱类
 - B. 糖皮质激素
 - C. β_2 肾上腺素受体激动药
 - D. 抗胆碱药
 - E. 色苷酸钠
8. 应用茶碱类药物治疗支气管哮喘时, 每日剂量应不超过
 - A. 0.5g
 - B. 1.0g
 - C. 1.5g
 - D. 2.0g
 - E. 2.5g
9. 提示有严重呼吸困难的重症哮喘病人病情严重的体征是
 - A. 颈静脉怒张
 - B. 叩诊呈过清音
 - C. 发绀
 - D. 听诊哮鸣音减弱或消失
 - E. 奇脉
10. 哮喘发作时以下护理措施不妥当的是
 - A. 限制水摄入
 - B. 半坐位
 - C. 防止病人坠床
 - D. 禁用吗啡
 - E. 吸氧
11. 下列哪项是 COPD 发生和加重的主要原因
 - A. 吸烟
 - B. 感染
 - C. 粉尘刺激
 - D. 寒冷
 - E. 免疫功能减退
12. 关于缩唇腹式呼吸的作用机制最恰当的是
 - A. 增强吸气力量
 - B. 增强呼气力量
 - C. 降低气道内压, 延缓小气道的陷闭
 - D. 增加气道内压, 延缓小气道的陷闭
 - E. 增强膈肌收缩力
13. COPD 病人学习缩唇呼吸时, 护士指导错误的是
 - A. 经鼻腔缓慢吸气
 - B. 短暂屏气
 - C. 口唇缩拢的缓慢呼气
 - D. 呼与吸之比为 1:2
 - E. 避免大口吸气与屏气
14. COPD 最常见的并发症是
 - A. 肺气肿
 - B. 慢性肺源性心脏病
 - C. 呼吸衰竭
 - D. 自发性气胸
 - E. 肺不张
15. 慢性阻塞性肺疾病标志性的症状是
 - A. 长期反复咳嗽
 - B. 反复咳脓性痰
 - C. 间歇少量咯血
 - D. 气短或呼吸困难
 - E. 活动后喘
16. 慢性肺源性心脏病的发病机制是
 - A. 右心前负荷加重
 - B. 右心后负荷加重
 - C. 左心前负荷加重
 - D. 左心后负荷加重

- E. 以上都不是
17. 慢性肺源性心脏病肺、心功能失代偿期的护理中心环节是
 - A. 做呼吸操
 - B. 预防上呼吸道感染
 - C. 纠正缺氧和二氧化碳潴留
 - D. 低盐饮食
 - E. 注意神志变化
 18. 慢性肺心病早期可出现
 - A. 全心肥大
 - B. 右室肥大
 - C. 左室肥大
 - D. 左房肥大
 - E. 心包积液
 19. 气管内吸痰时, 每次插管吸痰时间不宜超过
 - A. 5s
 - B. 10s
 - C. 15s
 - D. 30s
 - E. 1min
 20. 心尖搏动在剑突下提示
 - A. 左室大
 - B. 肺气肿伴右室大
 - C. 心包积液
 - D. 右房大
 - E. 左房大
 21. 下列疾病一般无杵状指(趾)的是
 - A. 支气管扩张
 - B. 慢性风湿性心脏病
 - C. 肺脓肿
 - D. 支气管肺癌
 - E. 先天性心脏病
 22. 对于小量咯血的肺结核病人应该采取的体位是
 - A. 患侧卧位
 - B. 健侧卧位
 - C. 端坐卧位
 - D. 仰卧位
 - E. 俯卧位
 23. 支气管扩张病人最典型的临床表现为
 - A. 慢性咳嗽、大量脓痰、伴有喘息
 - B. 慢性咳嗽、大量脓痰、伴寒战高热
 - C. 慢性咳嗽、大量脓痰、反复咯血
 - D. 慢性咳嗽、大量脓痰、长期胸痛
 - E. 慢性咳嗽、大量脓痰、呼吸困难
 24. 支气管扩张孕妇出现咯血时应禁用
 - A. 巴曲酶(立止血)
 - B. 垂体后叶素
 - C. 凝血酶
 - D. 氨甲苯酸(止血芳酸)
 - E. 卡巴克洛(安络血)
 25. 肺炎球菌肺炎在红色肝样变期痰呈
 - A. 黑色
 - B. 黄色
 - C. 粉红色
 - D. 铁锈色
 - E. 绿色
 26. 细菌性肺炎最常见的病原菌是
 - A. 葡萄球菌
 - B. 大肠杆菌
 - C. 肺炎球菌
 - D. 铜绿假单胞菌
 - E. 克雷伯杆菌
 27. 按病因学分类, 临床上最常见的肺炎是
 - A. 细菌性肺炎
 - B. 病毒性肺炎
 - C. 支原体肺炎
 - D. 真菌性肺炎
 - E. 衣原体肺炎
 28. 不属于肺炎球菌肺炎表现的是
 - A. 寒战
 - B. 高热
 - C. 胸痛
 - D. 大量咯血
 - E. 气急
 29. 治疗肺炎球菌性肺炎, 首选的药物是
 - A. 青霉素
 - B. 卡那霉素
 - C. 庆大霉素
 - D. 红霉素
 - E. 四环素
 30. 肺炎球菌肺炎的病人热型常为
 - A. 稽留热
 - B. 弛张热
 - C. 间歇热
 - D. 波状热
 - E. 不规则热
 31. 结核杆菌最易被消灭的条件是
 - A. 直接阳光下
 - B. 暴露在空气中
 - C. 在胃分泌物中
 - D. 用青霉素
 - E. 煮沸
 32. 肺结核最主要的传染源是
 - A. 结核菌污染的食物
 - B. 结核菌污染的食具
 - C. 结核菌感染的猪
 - D. 排菌的肺结核患者
 - E. 痰菌阴性的肺结核患者
 33. 确诊肺结核最特异的方法是
 - A. X线检查
 - B. CT检查
 - C. 痰结核菌检查
 - D. PPD试验
 - E. B超
 34. 最常见的成人继发性肺结核类型是
 - A. 原发型肺结核
 - B. 浸润型肺结核
 - C. 血行播散型肺结核
 - D. 慢性纤维空洞型肺结核
 - E. 结核性胸膜炎
 35. 胸腔积液患者, 胸腔积液查出抗酸杆菌, 此患者最可能的诊断是
 - A. 原发型肺结核
 - B. 浸润型肺结核
 - C. 血行播散型肺结核

- D. 慢性纤维空洞型肺结核
E. 结核性胸膜炎
36. 早期诊断肺结核的主要方法和观察治疗效果的方法是
A. X线检查 B. CT检查
C. 痰结核菌检查 D. PPD试验
E. B超
37. 肺癌发病的重要危险因素是
A. 职业性致病因素 B. 长期吸烟
C. 免疫缺陷 D. 慢性肺部疾病
E. 遗传因素
38. 多见于老年男性, 且与吸烟关系最密切相关的肺癌类型是
A. 鳞状上皮细胞癌
B. 小细胞未分化癌
C. 大细胞未分化癌
D. 腺癌
E. 肺泡癌
39. 肺癌中恶性程度最高的一种组织类型是
A. 鳞状上皮细胞癌
B. 小细胞未分化癌
C. 大细胞未分化癌
D. 腺癌
E. 肺泡癌
40. 刺激性呛咳或带金属音的咳嗽应先考虑
A. 上呼吸道感染 B. 肺部病变早期
C. 左心功能不全 D. 支气管扩张
E. 支气管肺癌
41. 慢性呼吸衰竭最早出现的临床表现是
A. 发热 B. 咳嗽
C. 发绀 D. 呼吸困难
E. 神志恍惚
42. 缺氧伴二氧化碳潴留的呼吸衰竭病人宜采用
A. 高压给氧 B. 乙醇湿化给氧
C. 间歇给氧 D. 高浓度持续给氧
E. 低浓度持续给氧
43. 病人女性, 68岁。患 COPD 17年, 肺心病4年, 体质虚弱, 近日来因上感, 大量脓痰不易咳出, 神志恍惚, 昏睡。护士为其清理呼吸道最适宜的护理措施是
A. 指导有效咳嗽
B. 胸部叩击震颤
C. 湿化呼吸道
D. 体位引流
E. 机械吸痰
44. 夜班护士发现一个支气管扩张病人咯血约200ml后突然中断, 呼吸极度困难, 喉部有痰鸣音, 表情恐怖, 两手乱抓, 首先要做的是
A. 立即通知医师
B. 立即气管插管
C. 清除呼吸道积血
D. 给予高流量氧气吸入
E. 应用呼吸兴奋剂
45. 病人男性, 77岁。有 COPD 病史25年。近日受凉后咳嗽加重, 咳大量脓性黏痰, 不易咳出。护理查体体温 37.5°C , 气促, 听诊可闻痰鸣音, 伴喘息。此病人最主要的护理诊断是
A. 清理呼吸道无效
B. 气体交换受损
C. 体温过高
D. 低效性呼吸形态
E. 活动无耐力
46. 病人女性, 61岁。慢性阻塞性肺气肿缓解期。此时护士为其选择改善肺功能的最佳方法是
A. 有效咳嗽 B. 胸部理疗
C. 雾化吸入 D. 缩唇腹式呼吸
E. 氧疗
47. 病人男性, 35岁。中度哮喘患者, 就诊时下列指标中对于判断哮喘严重程度更为准确的是
A. 心率加快 (105次/分)
B. 房性早搏 (2次/分)
C. 血压升高 [$148/91\text{mmHg}$ ($1\text{mmHg} = 133.3\text{Pa}$)]
D. 奇脉 ($10 \sim 20\text{mmHg}$)
E. 房室传导阻滞
48. 病人男性, 28岁。因大叶性肺炎住院, 体温 40.5°C , 脉搏细弱, 血压 $90/60\text{mmHg}$, 在病情观察中应特别警惕发生
A. 晕厥 B. 昏迷
C. 心律失常 D. 休克
E. 惊厥
49. 病人男性, 58岁。因肺心病呼吸衰竭入院。入院查体神志清晰, 血气分析: PaO_2 30mmHg , PaCO_2 60mmHg 。吸氧后神志不清, 血气分析: PaO_2 70mmHg , PaCO_2 80mmHg 。该患者病情恶化的原因最可能是
A. 感染加重 B. 气道阻力增加

- C. 氧疗不当 D. 心力衰竭加重
E. 周围循环衰竭
50. 病人男性, 28岁。近1个月来劳累后出现乏力、盗汗、纳差, 无发热、咳嗽等。今天因突然大咯血而急诊就诊。禁忌进行的检查是
A. 外周血象 B. 心电图
C. 胸部平片 D. 支气管碘油造影
E. 血液生化检查
51. 病人男性, 40岁。喘息发作5h入院, 为鉴别是否为上呼吸道梗阻最为简便的方法是
A. 拍摄X线胸片
B. 支气管镜检查
C. 胸部CT检查
D. 判断哮鸣音发生于呼气相还是吸气相
E. 描绘最大呼气流量-容积曲线
52. 病人男性, 28岁。发热、胸痛, 痰中带血丝, 伴恶心、纳差, 吸烟6年; X线胸片示右上肺大片实密阴影; 血常规示的细胞为 $28 \times 10^9/L$, 中性: 89%, 下列治疗应首选哪项最适宜
A. 氯霉素 B. 庆大霉素
C. 红霉素 D. 青霉素
E. 异烟肼
53. 王女士, 26岁。患支气管扩张10年, 间断咳嗽、咳脓痰, 痰量40ml/d, 下列哪项治疗措施是错误的
A. 长期应用抗生素
B. 体位引流
C. 免疫治疗
D. 体育锻炼
E. 练习有效咳嗽
54. 某肺结核病人久治不愈, 近日头痛加重, 伴呕吐。查体有头向后仰、屈颈困难。这是因为
A. 肩关节炎 B. 颈肌痉挛
C. 颈椎病 D. 脑膜刺激征
E. 习惯
55. 某病人原有慢性阻塞性肺疾病, 呼吸困难、发绀, 近日咳嗽加剧, 突然发生右侧胸痛, 约30min后呼吸困难突然加剧, 患侧胸壁叩诊呈鼓音, 听诊呼吸音消失。该变化是
A. 自发性气胸 B. 肋间神经痛
C. 胸腔积液 D. 腹水
E. 肋骨骨折
56. 某老年呼吸衰竭患者, 因近日咳嗽、咳痰、气急明显, 又出现神志不清、发绀、多汗及皮肤湿润温暖, 做血气分析示 pH 7.3, PaO_2 45mmHg, $PaCO_2$ 80mmHg, 应给予
A. 高浓度、高流量持续吸氧
B. 高浓度、高流量间断吸氧
C. 低浓度、低流量持续吸氧
D. 低浓度、低流量间断吸氧
E. 乙醇(酒精)湿化吸氧
57. 一老年患者以 COPD、II型呼吸收入院, 入院第一天晚上, 因咳嗽、痰多、呼吸困难, 并对医院环境不适应而不能入睡, 不正确的护理措施是
A. 给镇咳镇静药, 帮助入睡
B. 减少夜间操作, 保证病人睡眠
C. 给低流量持续吸氧
D. 减少白天睡眠次数和时间
E. 和病人一同制订白天活动计划
58. 病人女性, 50岁。乏力, 盗汗, 咳嗽2个月入院, 痰涂片抗酸杆菌(+), 治疗过程中患者出现视物不清, 视力减退, 应立即停用下列哪种药物
A. 吡嗪酰胺 B. 乙胺丁醇
C. 链霉素 D. 异烟肼
E. 利福平
59. 病人女性, 69岁。因呼吸衰竭收入院。该患者应用辅助呼吸和呼吸兴奋药过程中, 出现恶心、呕吐、烦躁、面颊潮红、肌肉颤动等现象, 考虑为
A. 肺性脑病先兆
B. 呼吸兴奋药过量
C. 痰液阻塞
D. 通气量不足
E. 呼吸性碱中毒
60. 病人男性, 25岁。经常在春天哮喘发作, 护士指导其预防哮喘发作时宜使用的药物是
A. 氨茶碱
B. 色甘酸钠
C. 二丙酸倍氯米松气雾剂
D. 氯喘
E. 沙丁胺醇气雾剂
61. 病人男性, 26岁。淋雨后突然寒战高热、全身肌肉酸痛、干咳、胸痛。体检: 面色苍白、口唇微绀、表情淡漠。体温: $39.8^{\circ}C$, 呼吸: 28次/分, 血压: 90/60mmHg。为防止病情恶化护士应特别观察的是

- A. 体温变化 B. 心率改变
C. 血压改变 D. 肺部体征的改变
E. 呼吸系统症状变

62. 病人男性, 25 岁。因肺心病导致呼吸困难, 采用半坐卧位的原因是

- A. 减少局部出血
B. 使患者逐渐适应体位变化, 利于向站立过渡
C. 减轻腹部切口疼痛
D. 防止感染向上蔓延
E. 减轻心脏负担

63. 病人女性, 66 岁。患肺结核 10 余年, 近 2 周来痰中带血, 10min 前咯血 600ml, 突然咯血中断, 颜面青紫, 牙关紧闭, 此时应立即采取的抢救措施是

- A. 进行人工呼吸
B. 使用呼吸兴奋药
C. 行导管氧疗
D. 输血补液
E. 解除呼吸道梗阻

64. 李先生, 21 岁。咳嗽、咳脓痰 10 年, 间断咯血, 体检左下肺背部闻及湿啰音, 有杵状指, 诊断首先考虑

- A. 肺结核 B. 支气管扩张
C. 慢性肺脓肿 D. 慢性支气管炎
E. 肺癌

65. 病人男性, 49 岁。发热一月余, 体温: 37.2~38℃, 轻咳, 少许白痰, 带血丝。胸部 X 线检查见右上肺锁骨上下区有云雾状阴影, 密度不均, 诊断最可能为

- A. 浸润性肺结核
B. 金黄色葡萄球菌肺炎
C. 干酪性肺炎
D. 克雷伯杆菌肺炎
E. 肺脓肿

66. 病人男性, 50 岁。30 年吸烟史, 支气管镜活检可见鳞状上皮和支气管腺体, 此种病理变化属于

- A. 支气管黏膜化生
B. 支气管黏膜肥大
C. 支气管黏膜萎缩
D. 支气管鳞状细胞癌
E. 支气管腺癌

(67~69 题共用题干)

病人女性, 20 岁。近 1 个月来干咳伴有低

热, 自觉乏力。听诊右上锁骨下区有固定的湿啰音, 怀疑其肺结核。

67. 为进一步确诊, 最重要的检查是

- A. 胸部 CT 检查
B. 纤维支气管镜检查
C. 支气管碘油造影
D. 痰菌检查
E. 痰细胞学检查

68. 如病人已确诊, 下列护理措施中哪项不妥

- A. 给予高热量、高维生素、高蛋白饮食
B. 室内空气新鲜, 阳光充足
C. 向病人做有关疾病知识的宣教
D. 及时做好消毒隔离
E. 鼓励病人多做体育锻炼, 增强抗病能力

69. 病人在治疗过程中, 判断结核化疗效果最重要的指标是

- A. PPD 试验阴性
B. 体温恢复正常, 体重增加
C. ESR 恢复正常
D. 痰菌转阴
E. 病灶吸收好转

(70~72 题共用题干)

病人男性, 52 岁。患 COPD 15 年。近 3 天因急性上感病情加重, 体温 37.8℃, 神志恍惚、昼睡夜醒, 气促、不能平卧, 痰色黄、较稠、不易咳出。血气分析示 PaO_2 56mmHg, PaCO_2 67mmHg。

70. 考虑此病人发生了

- A. 电解质紊乱 B. 呼吸性酸中毒
C. 脑梗死先兆 D. 肺性脑病
E. 自发性气胸

71. 护理诊断不包括

- A. 气体交换受损
B. 活动无耐力
C. 体温过高
D. 清理呼吸道无效
E. 体液过多

72. 氧疗时的给氧浓度和氧流量应为

- A. 29%, 2L/min B. 33%, 3L/min
C. 37%, 4L/min D. 41%, 5L/min
E. 45%, 6L/min

(73~75 题共用题干)

病人女性 43 岁, 患支气管扩张, 反复间断咯血。近 1 周来咯血加重, 从痰中带血到小量咯血。