

高等院校数学教材同步辅导及考研复习用书

spark® 星火

概率论与数理统计 辅导及习题精解

(与浙江大学 **第三版** 教材配套)

主 编 张天德 教授

联系考研, 渗透精讲历年考研真题

- 知识图表 清晰梳理考点重点难点
- 典型例题 深入讲解思路方法技巧
- 习题答案 权威提供详尽准确解析
- 同步自测 快速升华应用应试能力

全新修订

第4版

赠《重要公式及性质》手册

天津人民出版社

spark® 星火

概率论与数理统计 辅导及习题精解

(与浙江大学 **第三版** 教材配套)

主 编 张天德

副主编 叶 宏 左进明 孙建武



天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

概率论与数理统计辅导及习题精解:浙大版/张天德编著.
天津:天津人民出版社,2008.6
ISBN 978-7-201-05982-2

I. 概... II. 张... III. ①概率论—高等学校—教学参考资料 ②数理统计—高等学校—教学参考资料 IV. 021

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 086616 号

天津人民出版社出版

出版人:刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码:300051)

邮购部电话:(022) 23332469

网址:<http://www.tjrmcbs.com.cn>

电子信箱:tjrmcbs@126.com

桓台县方正印务有限公司印刷 新华书店经销

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 13 印张

字 数:310 千字

定 价:16.80 元

前 言

《概率论与数理统计》是专门研究随机现象及其数量规律的一个数学分支,在生物、医学、金融以及其他技术领域存在着广泛的应用。这门课程是高等院校理工科专业和部分文科专业一门重要的基础课程,也是历年硕士研究生入学考试的重点科目。

浙江大学编写的《概率论与数理统计》是一套深受广大教师和学生欢迎的、被全国很多高校普遍采用的优秀教材。经过修订后的第三版,更是结构严谨、逻辑清晰、层次分明、行文流畅,在讲授基础知识的同时又注意提炼和渗透数学思想方法,质量、体例均臻于炉火纯青。

为了帮助广大高校在校生活和正在准备考研的学子学好、复习好这门课程,我们本着“选好教材、做好辅导”的宗旨,以上述的浙江大学盛骤、谢式千、潘承毅编写的《概率论与数理统计》(第三版)为针对教材,编写了这本与之章节、内容完全同步的《概率论与数理统计辅导及习题精解》配套辅导用书,为您系统梳理知识结构、清晰提炼重点考点、深入讲解思路技巧方法、权威提供课后习题答案,让您学深、吃透教材知识,打好基础。同时,又注意紧密联系考研、精讲历年真题,设计同步自测、提供高效练习,让您在学好教材的同时积极准备考研。

全书章节内容设置与教材完全同步,共分十二章,每一章又分为若干节,按照教材顺序对每个章节内容进行清晰梳理、深入讲解,每一章内容讲完后,再对整章内容重点进行回顾和加深,然后给出该章教材上的习题答案详解,设计该章同步自测题。全部十二章教材内容辅导完毕后,书的最后附上 2008 考研真题供读者自测。

每一章中每节内容讲解 这部分由两块组成:该节知识结构图表,该节重点考点提炼,该节题型例题方法。

一、内容解析 包括两部分:知识结构图表、重点考点提炼

1. 知识结构图表 这一部分用直观、形象的图表形式,将该节知识结构、相互联系、逻辑关系清晰地展示给读者,也便于读者对比各个概念、性

质和定理,在比较中加深理解,使知识更加系统化。

2. 重点考点提炼 这一部分将该节一些重要的知识点、考点清晰、准确地提炼出来,并用简洁的语言将这些重点、考点等需要注意的问题一一点明,让读者一下子抓住重点、针对复习。

二、题型例题方法 这一部分是每一节讲解中的核心内容,也是全书的核心内容。作者基于多年的教学经验和研究生入学考试试题研究经验,将该节教材内容中学生需要掌握的、考研中经常考到的重点、难点、考点,归纳为一个个在考试中可能出现的基本题型,然后针对每一个基本题型,举出大量的精选例题、考研真题,举一反三、深入讲解,务必使您对每一个考查点扎实掌握、悟透吃透,并能熟练运用在具体解题中,可谓基础知识梳理、重点考点深讲、真题考题透析三重互动、一举突破,从而使读者的实际应用应试能力全面提升。

每一例题讲解中穿插出现的“思路探索”、“方法点击”,更是巧妙点拨处处呵护,让您举一反三、触类旁通,在更高的层次上去领会和掌握数学思想。

每一章后教材习题答案 这一部分对该章教材上的全部习题给出详细、准确的答案解析,解析中同时给出思路点拨、方法点击,让您做好习题的同时,回顾、巩固、深化前面的内容讲解。

每一章后同步自测练习 这一部分是作者基于自己多年的教学经验并结合历年考研数学试题特点科学设计的,目的是在读者对各章内容有了全面了解之后,给读者提供进一步检测、巩固的机会,以使读者进一步消化知识、夯实考点、提高能力。本部分设有自测练习答案详解。同时提醒,许多读者觉得学习时一看就懂,但一做就错,实质上还是基础知识不扎实,练习少的表现。

书的最后,附上2008年考研数学一试题及概率统计部分的习题的详细解析,以便那些将来准备或正在准备考研的读者了解最新考研试题、检测自我能力水平,找出差距、调整复习。

全书内容编写系统、新颖、清晰、独到,充分体现了如下三大特色:

一、知识梳理清晰、简洁 直观、形象的图表总结,精炼、准确的考点

提炼,权威、独到的题型归纳,将教材内容抽丝剥茧、层层展开,呈现给读者简明扼要、层次分明的教材知识结构,以便于读者快速复习、高效掌握,形成稳固、扎实的知识网,从而为后面提高解题能力和数学思维水平夯实基础。

二、能力提升迅速、互动 所有重点、难点、考点,统统归纳为一个一个在考试中可能出现的基本题型,然后针对每一个基本题型,举出丰富的精选例题、考研真题,举一反三、深入讲解,真正将知识掌握和解题能力提升高效结合,一举完成。

三、联系考研密切、实用 本书是一本教材同步辅导,也是一本考研复习用书,书中处处联系考研:例题中有考研试题,同步自测题中也有考研试题,最后还附上2008年考研数学一试题及解析,更不用说讲解中处处渗透考研经常考到的考点、重点等,为的就是让同学们同步完成考研备考,达到考研要求的能力。

本书注意博采众家之长,参考了多本同类书籍,吸取了不少养分,在此向这些书籍的作者表示感谢。同时,由于我们水平所限,不足之处,在所难免,诚恳希望读者提出宝贵意见,以便再版时改进、修正。

编者

目 录

第一章 概率论的基本概念	(1)
第一节 随机试验 样本空间 随机事件	(1)
第二节 频率与概率	(3)
第三节 古典概型	(7)
第四节 条件概率	(13)
第五节 独立性	(18)
本章知识结构及内容小结	(24)
本章教材习题全解	(26)
同步自测题及参考答案	(38)
第二章 随机变量及其分布	(44)
第一节 随机变量与分布函数	(44)
第二节 离散型随机变量及其分布律	(46)
第三节 连续型随机变量及其概率密度	(54)
第四节 随机变量函数的分布	(64)
本章知识结构及内容小结	(71)
本章教材习题全解	(72)
同步自测题及参考答案	(88)
第三章 多维随机变量及其分布	(96)
第一节 二维随机变量	(96)
第二节 边缘分布	(100)
第三节 条件分布	(105)
第四节 随机变量的独立性	(109)
第五节 随机变量函数的分布	(116)
本章知识结构及内容小结	(125)
本章教材习题全解	(126)
同步自测题及参考答案	(145)
第四章 随机变量的数字特征	(154)
第一节 数学期望	(154)
第二节 方差	(164)
第三节 协方差及相关系数	(173)
第四节 矩、协方差矩阵	(183)
本章知识结构及内容小结	(185)

本章教材习题全解	(186)
同步自测题及参考答案	(200)
第五章 大数定律与中心极限定理	(208)
第一节 切比雪夫不等式	(208)
第二节 大数定律	(210)
第三节 中心极限定理	(212)
本章知识结构及内容小结	(216)
本章教材习题全解	(217)
同步自测题及参考答案	(221)
第六章 样本及抽样分布	(228)
第一节 随机样本	(228)
第二节 抽样分布	(229)
本章知识结构及内容小结	(240)
本章教材习题全解	(241)
同步自测题及参考答案	(245)
第七章 参数估计	(251)
第一节 点估计	(251)
第二节 估计量的评选标准	(259)
第三节 区间估计	(265)
本章知识结构及内容小结	(271)
本章教材习题全解	(272)
同步自测题及参考答案	(285)
第八章 假设检验	(292)
第一节 假设检验的概念	(292)
第二节 一个正态总体的假设检验	(294)
第三节 两个正态总体的假设检验	(297)
* 第四节 总体分布的假设检验	(300)
本章知识结构及内容小结	(301)
本章教材习题全解	(303)
同步自测题及参考答案	(319)
第九章 方差分析及回归分析	(323)
第一节 单因素方差分析、方差分析表及其应用举例	(323)
第二节 双因素方差分析	(326)
第三节 一元线性回归	(332)
第四节 多元线性回归方程	(336)
本章知识结构及内容小结	(339)

本章教材习题全解	(340)
同步自测题及参考答案	(356)
第十章 随机过程及其统计描述	(360)
本章教材习题全解	(361)
第十一章 马尔可夫链	(367)
本章知识结构及内容小结	(371)
本章教材习题全解	(372)
同步自测题及参考答案	(380)
第十二章 平稳随机过程	(383)
本章教材习题全解	(385)
2008 年考研真题及参考答案	(397)

第一章 概率论的基本概念


本章介绍了随机试验、随机事件的概念,事件间的关系及其运算,主要介绍了古典概率、条件概率的定义,概率的加法公式、乘法公式,全概率公式和贝叶斯公式,同时对独立性和伯努利概型进行了重点论述。

第一节

随机试验 样本空间 随机事件

一、内容简析

【知识结构】



【重要知识点和考点分析】

1. 正确理解随机事件的相关概念

(1) 随机试验:在概率论中将具备下列三个条件的试验称为随机试验,简称试验:

- ① 在相同条件下可重复进行;
- ② 每次试验的结果具有多种可能性;
- ③ 在每次试验之前不能准确预言该次试验将出现何种结果,但是所有结果明确可知。

(2) 样本空间:随机试验的所有可能结果构成的集合,常用 Ω 表示。

(3) 随机事件:大量随机试验中具有某种规律性的事件。

(4) 基本事件:不能分解为其他事件组合的最简单的随机事件。

(5) 必然事件:每次试验中一定发生的事件,常用 Ω 表示。

(6) 不可能事件:每次试验中一定不发生的事件,常用 \emptyset 表示。

2. 准确理解互斥事件与对立事件的区别与联系

(1) 互斥事件:在试验中,若事件 A 与 B 不能同时发生,即 $A \cap B = \emptyset$,则称 A, B 为互斥事件。显然,基本事件间是互斥的。

(2) 对立事件:每次试验中,“事件 A 不发生”的事件称为事件 A 的对立事件。 A 的对立事件常记为 \bar{A} 。

容易看出:对立事件一定是互斥事件,但互斥事件不一定是对立事件.

3. 事件的运算律:

(1) 交换律 $A \cup B = B \cup A, AB = BA.$

(2) 结合律 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C).$

(3) 分配律 $(A \cup B)C = (AC) \cup (BC), A \cup (BC) = (A \cup B)(A \cup C).$

(4) 摩根律 $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$

(5) 对减法运算满足 $A - B = A\overline{B}.$

上述五条运算规律非常重要,特别是(4),(5)两条,希望读者熟练掌握.对于较复杂的事件运算,可采用文氏图帮助分析和理解.

二、题型、例题、方法

基本题型:考查事件的关系与运算

【思路探索】充分利用事件的定义、事件的关系和运算律.

例1 在电炉上安装了4个温控器,其显示温度的误差是随机的.在使用过程中,只要有两个温控器显示的温度不低于临界温度 t_0 ,电炉就断电.以 E 表示事件“电炉断电”,而 $T_{(1)} \leq T_{(2)} \leq T_{(3)} \leq T_{(4)}$ 为4个温控器显示的按递增顺序排列的温度值,则事件 E 等于(). (2000年,研,数学三、四)

(A) $\{T_{(1)} \geq t_0\}$ (B) $\{T_{(2)} \geq t_0\}$ (C) $\{T_{(3)} \geq t_0\}$ (D) $\{T_{(4)} \geq t_0\}$

解: $\{T_{(1)} \geq t_0\}$ 表示四个温控器显示温度均不低于 t_0

$\{T_{(2)} \geq t_0\}$ 表示至少三个温控器显示温度均不低于 t_0

$\{T_{(3)} \geq t_0\}$ 表示至少二个温控器显示温度均不低于 t_0

$\{T_{(4)} \geq t_0\}$ 表示至少一个温控器显示温度均不低于 t_0

故应选(C).

例2 抛掷一颗骰子,观察其出现的点数.设事件 A = “掷出偶数点”, B = “掷出奇数点”, C = “掷出1点”, D = “掷出2点”,讨论这些事件的相容关系和对立关系.

解:两随机事件对立当且仅当它们有且仅有一个发生,所以 A 与 B 对立.两随机事件不相容(互斥)等价于它们不能同时发生,故 A 与 B, A 与 C, B 与 D, C 与 D 均互不相容.

【方法点击】从事件互斥与事件对立的定义出发来检验两事件的关系.从本题结论中可看出对立事件是互斥事件,而互斥事件不一定是对立事件.

例3 设 A, B, C 表示三个随机事件,试用其表示下列各事件:

(1) A 出现, B, C 都不出现; (2) 三个事件中至少有一个出现;

(3) 不多于一个事件出现; (4) A, B, C 中恰好有两个出现.

解:(1) $A\overline{B}\overline{C}$ 或 $A - B\overline{C}$ (2) $A + B + C$ 或 $\overline{A\overline{B}\overline{C}}$

(3) $\overline{A\overline{B}\overline{C}} + \overline{A\overline{B}C} + \overline{A\overline{B}C} + \overline{A\overline{B}C}$ 或 $\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{AC}$

(4) $A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C$

【方法点击】对于事件的表示,可直接求也可间接来求:即先求对立事件,再求原事件.

例 4 设任意两个随机事件 A 和 B 满足条件 $AB = \bar{A}\bar{B}$, 则().

- (A) $A \cup B = \emptyset$ (B) $A \cup B = \Omega$ (C) $A \cup B = A$ (D) $A \cup B = B$

解: 方法一: 排除法

注意到 $AB = \bar{A}\bar{B}$, 那么 A, B 的地位是“对等”的, 从而(C), (D)均不成立. (A)不正确是显然的. 故(B)正确.

方法二: 直接法

运用摩根律, $AB = \bar{A}\bar{B} = \overline{A \cup B}$, 那么

$$A \cup B = (A \cup B) \cup AB = (A \cup B) \cup \overline{A \cup B} = \Omega.$$

故应选(B).

例 5 事件 A, B 为任意两个事件, 则()不成立.

- (A) $(A+B) - B \subset A$ (B) $(A-B) + B = A$
(C) $(A+B) - B = A - B$ (D) $(A-B) + B = A + B$


解: 由事件的运算律得: $(A+B) - B = (A \cup B) \cap \bar{B} = (A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{B}) = (A \cap \bar{B}) \cup \emptyset = A \cap \bar{B}$, 所以选项(A)、(C)均成立. 同样地: $(A-B) + B = (A \cap \bar{B}) \cup B = (A \cup B) \cap (\bar{B} \cup B) = (A \cup B) \cap \Omega = A \cup B$, 所以选项(D)成立, (B)不成立. 故应选(B).

第二节

频率与概率

一、内容简析

【知识结构】



【重要知识点和考点分析】

1. 概率的统计定义: 在相同的条件下, 重复进行 n 次试验, 事件 A 发生的频率稳定地在某一常数 p 附近摆动. 且一般说来, n 越大, 摆动幅度越小, 则称常数 p 为事件 A 的概率, 记作 $P(A)$.

概率的统计定义仅仅指出了事件的概率是客观存在的, 但这个定义不能用来计算 $P(A)$. 事实上, 人们往往采用一次大量试验的频率或一系列频率的均值作为 $P(A)$ 的近似值.

2. 概率的公理化定义: 设 Ω 是一样本空间, 称满足下列三条公理的集函数 $P(\cdot)$ 为定义在 Ω 上的概率:

- (1) 非负性 对任意事件 $A, P(A) \geq 0$;
- (2) 规范性 $P(\Omega) = 1$;
- (3) 可列可加性 若两两互不相容的事件列 $\{A_n\}$ 是可列的, 则

$$P\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

2. 概率的性质

(1) $P(\emptyset) = 0$

(2) 有限可加性 若 n 个事件 A_1, \dots, A_n 两两互不相容, 则

$$P(A_1 + \dots + A_n) = P(A_1) + \dots + P(A_n).$$

(3) 相互对立两事件概率之和为 1, 即

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1.$$

大家应该注意上式的一个变形 $P(A) = 1 - P(\bar{A})$, 这是一个非常重要的表达形式, 在今后的解题中经常被用到.

(4) 若 $A \subset B$, 则有 $P(B - A) = P(B) - P(A)$.(5) 若 A, B 是任意两个事件, 则

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB),$$

此式又被称为广义加法法则.

上式还能推广到多个事件的情况. 例如, 设 A_1, A_2, A_3 为任意三个事件, 则有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 A_2) - P(A_1 A_3) - P(A_2 A_3) + P(A_1 A_2 A_3)$$

一般, 对于任意 n 个事件 A_1, A_2, \dots, A_n , 可以用归纳法证得

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n).$$

二、题型、例题、方法

基本题型: 与概率基本性质、加法公式有关的问题

例 1 设当事件 A 与 B 同时发生时, 事件 C 必发生, 则 ().

(A) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$

(B) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$

(C) $P(C) = P(AB)$

(D) $P(C) = P(A \cup B)$

解: 由题意“当 A, B 发生时, C 必然发生”, 从而 $AB \subset C$, 所以 $P(AB) \leq P(C)$,

那么

$$P(C) \geq P(AB) = P(A) + P(B) - P(A+B) \geq P(A) + P(B) - 1$$

$$P(A \cup B) \leq 1$$

故应选(B).

【方法点击】 此题考查概率的“单调性”, 即若 $A \subset B$ 是两个随机事件, 则

$$0 \leq P(A) \leq P(B) \leq 1$$

事实上, 因为 $A \subset B$, 所以 $B - A$ 与 A 互不相容, 并且满足 $B = (B - A) + A$, 由概率的非负性和加法公式得

$$P(B) = P(B - A) + P(A)$$

从而 $0 \leq P(A) \leq P(B)$.

例2 设 A, B 为随机事件, $P(A) = 0.7, P(A - B) = 0.3$, 则 $P(\overline{AB}) =$

解: 先求 \overline{AB} 的对立事件 AB 发生的概率 $P(AB)$.

由题意,

$$P(A - B) = P(A - AB) = P(A) - P(AB) = 0.3$$

则

$$P(AB) = P(A) - 0.3 = 0.7 - 0.3 = 0.4$$

那么

$$P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1 - 0.4 = 0.6$$

例3 设随机事件 A, B 及其和事件 $A \cup B$ 的概率分别是 $0.4, 0.3, 0.6$. 若 \overline{B} 表示 B 的对立事件, 那么积事件 $A\overline{B}$ 的概率 $P(A\overline{B}) =$ _____.

解: 因为 $A\overline{B} = A(\Omega - B) = A - AB$,

$$\text{所以 } P(A\overline{B}) = P(A - AB) = P(A) - P(AB)$$

$$= P(A \cup B) - P(B) = 0.6 - 0.3 = 0.3$$

【方法点击】 充分运用加法公式的各种变形. 特别注意以下方法在解决此类问题中的应用.

设 A, B 是任意两个随机事件, $A - B = A - AB = A(\Omega - B) = A\overline{B}$. 事实上, 这是一个很容易理解的变形, 不妨按下列方式理解: $A - B$ 表示事件“ A 发生 B 不发生”, $A - AB$ 表示事件“在 A 发生的事件中除掉 AB 一起发生的事件”, $A\overline{B}$ 表示事件“ A 发生 B 不发生”, 很明显这三个事件是一样的.

例4 已知事件 A, B 仅发生一个的概率为 0.4 , 且 $P(A) + P(B) = 0.6$, 则 A, B 至少有一个不发生的概率为 _____.

【思路探索】 由摩根律, 要求 $P(\overline{A+B})$, 只需求 $P(\overline{AB})$.

解: 由题意知, $P(A\overline{B} + \overline{A}B) = 0.4$, 且 $A\overline{B}$ 与 $\overline{A}B$ 是互斥的, 所以

$$P(A\overline{B} + \overline{A}B) = P(A\overline{B}) + P(\overline{A}B) = P(A - AB) + P(B - AB)$$

$$= P(A) - P(AB) + P(B) - P(AB)$$

$$= P(A) + P(B) - 2P(AB) = 0.4,$$

则 $P(AB) = 0.1$, 那么

$$P(\overline{A+B}) = P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1 - 0.1 = 0.9.$$

例5 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}, P(AB) = 0, P(AC) = P(BC) = \frac{1}{6}$, 则事件 A, B, C 全不发生的概率为 _____.

【思路探索】 应用摩根律、加法法则, 对立事件的概念.

解: 因为 $P(AB) = 0$, 所以 $P(ABC) = 0$.

$$P(\overline{A}\overline{B}\overline{C}) = P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C)$$

$$= 1 - [P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)]$$

$$= 1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - 0 - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} + 0 \right) = \frac{7}{12}.$$

例6 设 A, B 是任意两个随机事件, 则

$$P\{(\bar{A}+B)(A+B)(\bar{A}+\bar{B})(A+\bar{B})\} = \underline{\hspace{2cm}}$$

解: 注意到

$$(A+B)(\bar{A}+\bar{B}) = A(\bar{A}+\bar{B}) + B(\bar{A}+\bar{B}) = \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$$

$$(\bar{A}+B)(A+\bar{B}) = \bar{A}(A+\bar{B}) + B(A+\bar{B}) = \bar{A}\bar{B} + AB$$

那么

$$(\bar{A}+B)(A+B)(\bar{A}+\bar{B})(A+\bar{B}) = (\bar{A}B + \bar{A}\bar{B})(\bar{A}\bar{B} + AB) = \emptyset$$

则

$$P\{(\bar{A}+B)(A+B)(\bar{A}+\bar{B})(A+\bar{B})\} = P(\emptyset) = 0.$$

【方法点击】 在有关事件运算或者是化简的问题中, 要学会熟练应用事件的运算法则. 尤其是关系式 $A = AB + A\bar{B}$, $A\bar{A} = \emptyset$.

例7 某奶厂生产 A, B, C 三种奶, 经过调查, 一城市居民中订购 A 奶的占 45%, 订购 B 奶的占 35%, 订购 C 奶的占 30%, 同时订购 A, B 两种奶的占 10%, 同时订购 A, C 两种奶的占 8%, 同时订购 B, C 两种奶的占 5%, 同时订购 A, B, C 三种的占 3%. 试计算下列各事件的概率:

- (1) 仅订购 A 奶的;
- (2) 仅订购 A, B 奶的;
- (3) 仅订购一种奶的;
- (4) 恰好订购两种奶的;
- (5) 至少订购一种奶的;
- (6) 不订购任何奶的;
- (7) 最多订购一种奶的.

解: 由题意知 $P(A) = 0.45$, $P(B) = 0.35$, $P(C) = 0.30$, $P(AB) = 0.10$,

$$P(AC) = 0.08, \quad P(BC) = 0.05, \quad P(ABC) = 0.03.$$

$$(1) P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = P(A - A(B+C))$$

$$= P(A) - P(A(B+C)) = P(A) - P(AB+AC)$$

$$= P(A) - P(AB) - P(AC) + P(ABC)$$

$$= 0.45 - 0.10 - 0.08 + 0.03 = 0.30.$$

$$(2) P(\bar{A}BC) = P(AB - C) = P(AB - ABC) = P(AB) - P(ABC)$$

$$= 0.10 - 0.03 = 0.07.$$

$$(3) P(\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C)$$

$$= P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) + P(\bar{A}B\bar{C}) + P(\bar{A}\bar{B}C)$$

$$= 0.30 + P(B - B(A+C)) + P(C - C(A+B))$$

$$= 0.30 + P(B) - P(AB) - P(BC) + P(ABC) + P(C) - P(AC)$$

$$- P(BC) + P(ABC)$$

$$= 0.30 + 0.35 - 0.10 - 0.05 + 0.03 + 0.30 - 0.08 - 0.05 + 0.03$$

$$= 0.73.$$

$$(4) P(\bar{A}BC + ABC + \bar{A}BC) = P(\bar{A}BC) + P(ABC) + P(\bar{A}BC)$$

$$= P(AB) + P(AC) + P(BC) - 3P(ABC)$$

$$= 0.10 + 0.08 + 0.05 - 3 \times 0.03 = 0.14.$$

$$(5) P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

$$=0.45+0.35+0.30-0.10-0.08-0.05+0.03 \\ =0.90.$$

(6) 注意(5), 不难想到运用对立事件的概念, 从而

$$P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C) = 1 - 0.90 = 0.10.$$

(7) $P(\overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} B \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B C)$

$$= P(\overline{A} \overline{B} \overline{C}) + P(\overline{A} B \overline{C}) + P(\overline{A} \overline{B} C) + P(\overline{A} B C)$$


$$= 0.10 + 0.73 = 0.83.$$

【方法点击】 注意到事件间的互不相容性, 并充分应用加法公式.

第三节 古典概型

一、内容简析

【知识结构】



【重要知识点和考点分析】

1. 古典概型试验: 具有下列两个特点的试验称为古典概型试验.

- (1) 每次试验只有有限种可能的试验结果;
- (2) 每次试验中, 各基本事件出现的可能性完全相同.

对于古典概型试验, 事件 A 发生的概率为

$$P(A) = \frac{A \text{ 中基本事件数}}{\Omega \text{ 中基本事件数}} = \frac{m}{n}.$$

2. 几何概型

如果随机试验的样本空间是一个区域(例如直线上的区间、平面或空间中的区域), 而且样本空间中每个试验结果的出现具有等可能性, 那么规定事件 A 的概率为

$$P(A) = \frac{A \text{ 的测度(长度、面积、体积)}}{\text{样本空间的测度(长度、面积、体积)}}$$

3. 计算古典型概率是本节的重点内容, 也是考研的基本内容之一. 计算古典型概率 $P(A)$ 的关键是找出 A 中的基本事件数, 在计算过程中常常用到排列组合的知识, 有时也需要用列举法逐一分析 A 中的基本事件.

二、题型、例题、方法

基本题型 I: 整除、非整除问题

例 1

从所有 3 位数(100~999)中随机取一个数, 求它能被 5 或 8 整除的概率.

解: 设 $A =$ “从所有 3 位数中随机取一个数, 它能被 5 或 8 整除”. 在 100~999 中,

能被5整除的数共有180个,能被8整除的数共有112个,能同时被5和8整除的数共有22个,所以在100-999中能被5或8整除的数共有 $180+112-22=240$ 个,所以 $P(A)=\frac{A中基本事件数}{\Omega中基本事件数}=\frac{240}{900}=0.27$.

基本题型II:分房问题

例2 有 n 个人,每人都有同等的机会被分配到 $N(n \leq N)$ 间房中的任一间去,试求下列各事件的概率.

- (1) A ="某指定的 n 间房中各有一人";
 (2) B ="恰有 n 间房各有一人";
 (3) C ="某指定的一间房中恰有 $m(m \leq n)$ 人".

解:(1)基本事件总数为 N^n .将 n 个人分到某指定的 n 间房中,相当于 n 个元素的全排列,所以事件 A 包含的基本事件数为 $n!$,故

$$P(A)=\frac{n!}{N^n}$$

(2) n 间房中各有1人是指任意的 n 间房中各有1人,这共有 C_N^n 种情况,所以事件 B 包含的基本事件数为 $C_N^n n!$,故

$$P(B)=\frac{C_N^n n!}{N^n}=\frac{N!}{N^n(N-n)!}$$

(3)从 n 个人中选 m 个分配到指定的一间房中,有 C_n^m 种选法;而其余的 $n-m$ 个人分到其余 $N-1$ 间房,有 $(N-1)^{n-m}$ 种方法,所以事件 C 包含的基本事件数为 $C_n^m(N-1)^{n-m}$,故

$$P(C)=\frac{C_n^m(N-1)^{n-m}}{N^n}=C_n^m\left(\frac{1}{N}\right)^m\left(\frac{N-1}{N}\right)^{n-m}$$

这实际上是第二章将要介绍的二项分布的特殊情形.

基本题型III:配对问题

例3 从 n 双不同的手套中任取 $2r(2r < n)$ 只,求下列事件发生的概率:

- (1)没有成双的手套; (2)只有一双手套;
 (3)恰有两双手套; (4)有 r 双手套.

解:试验的基本事件总数为 C_{2n}^{2r} .

(1)有利事件中的基本事件数是,先从 n 双中取 $2r$ 双,再从每双中取出一只,即 $C_n^{2r} C_2^1 \cdots C_2^1 = C_n^{2r} (C_2^1)^{2r}$.则所求的概率为

$$p = \frac{C_n^{2r} (C_2^1)^{2r}}{C_{2n}^{2r}}$$

此类问题的关键是如何确定有利事件中的基本事件数.

(2)有利事件中的基本事件数量,先从 n 双中取1双,再从剩下的 $n-1$ 双中取 $2r-2$ 双,并从每双中取出一只,即 $C_n^1 C_{n-1}^{2r-2} (C_2^1)^{2r-2}$,则所求概率为

$$p = \frac{C_n^1 C_{n-1}^{2r-2} (C_2^1)^{2r-2}}{C_{2n}^{2r}}$$

(3)有利事件中的基本事件数为,先从 n 双中任取2双,再从剩余的 $n-2$ 双中