

全国卫生专业技术资格考试丛书

北京大学护理学院 编写

护理学专业[护师] 资格考试全真模拟及精解

2008年

- 紧扣全国卫生专业技术资格考试大纲
- 内容涵盖资格考试主要考点
- 专家解析，全真模拟

免费赠送20元
上网学习充值卡



北京大学医学出版社

全国卫生专业技术资格考试丛书

护理学专业（护师）
资格考试全真模拟及精解

北京大学护理学院 编写

R47-44/BDH2.3=2



北京大学医学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

护理学专业 (护师) 资格考试全真模拟及精解/北京
大学护理学院编与. —2 版. —北京: 北京大学医学出版社,
2008. 1

ISBN 978-7-81116-276-9

I. 护… II. 北… III. 护理学—资格考核—解题 IV.
R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 197054 号

护理学专业 (护师) 资格考试全真模拟及精解

编 写: 北京大学护理学院

出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010-82802230)

地 址: (100083) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

网 址: <http://www.pumppress.com.cn>

E-mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 莱芜市圣龙印务有限责任公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 许 立 药 蓉 责任校对: 金彤文 责任印制: 张京生

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 16.25 字数: 389 千字

版 次: 2008 年 2 月第 2 版 2008 年 2 月第 1 次印刷 印数: 1-15000 册

书 号: ISBN 978-7-81116-276-9

定 价: 28.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

前 言

为配合全国卫生专业技术护理学专业（护师）资格考试，帮助考生在有限的时间内掌握考试要点，提高复习效率，北京大学护理学院组织相关学科专家，根据护理学专业（护师）考试大纲，共同编写了这套考试辅导丛书。本套书共分三本：

《护理学专业（护师）资格考试应试指导》

内容精练，重点突出，可以帮助考生在考前高效快速地掌握考试重点和难点。

《护理学专业（护师）资格考试习题集》

题量大，内容丰富，涵盖资格考试主要考点，是考前强化训练的必备用书。

《护理学专业（护师）资格考试全真模拟及精解》

全方位模拟考试真题，题后由专家解析，是考前冲刺的最佳选择。

编 者

目 录

护理学专业（护师）资格考试全真模拟试卷（一）	(1)
全真模拟试卷（一）答案及精解	(49)
护理学专业（护师）资格考试全真模拟试卷（二）	(85)
全真模拟试卷（二）答案及精解	(133)
护理学专业（护师）资格考试全真模拟试卷（三）	(169)
全真模拟试卷（三）答案及精解	(217)

护理学专业 (护师)

资格考试全真模拟试卷 (一)

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 镜下血尿是指离心沉淀的尿沉渣中，每高倍镜视野的红细胞数超过

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

2. 引起呼气性呼吸困难最常见的病因是

- A. 气管异物
- B. 大支气管肿瘤
- C. 大片肺组织实变
- D. 大量胸腔积液
- E. 小支气管痉挛

3. 肺炎球菌肺炎在红色肝变期内痰呈

- A. 黑色
- B. 黄色
- C. 粉红色
- D. 铁锈色
- E. 绿色

4. 慢性支气管炎最常见的并发症是

- A. 支气管扩张症
- B. 支气管哮喘
- C. 支气管肺炎
- D. 阻塞性肺气肿
- E. 肺脓肿

5. 患者，男性，70 岁，反复咳嗽、咳痰，伴喘息 30 余年，查体发现其心尖搏动在剑突下，提示该病人出现

- A. 左室肥大

B. 右室肥大

C. 心包积液

D. 右房肥大

E. 左房肥大

6. 患者，男性，20 岁，淋雨受凉后高热，查血：WBC $19 \times 10^9/L$ ，拍胸片示大叶性肺炎。请问大叶性肺炎常见的致病菌是

- A. 葡萄球菌
- B. 肺炎球菌
- C. 大肠杆菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 克雷白杆菌

7. 下列引起心力衰竭的病因中属于心脏容量负荷过重的因素是

- A. 心肌梗死
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 糖尿病心肌病
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 肺动脉高压

8. 心绞痛疼痛发作时的典型心电图表现是

- A. 心肌缺血改变，ST 段抬高
- B. ST 段压低 $>0.1mV$ ，T 波低平或倒置
- C. T 波高尖
- D. 出现宽大畸形的病理性 Q 波
- E. PR 间期延长

9. 右心功能不全时常见

- A. 胸痛
- B. 心悸
- C. 咳泡沫样痰
- D. 呼吸困难
- E. 心源性水肿

10. 急性心肌梗死出现下列哪种心律失常时最需要紧急处理

- A. 窦性心动过缓
B. 第二度Ⅰ型房室传导阻滞
C. 房性期前收缩
D. 心房颤动
E. 多源性室性期前收缩
11. 患者, 男性, 69岁, 高血压心脏病10年, 近一年来病人明显感觉体力活动受限, 洗脸、刷牙即可引起呼吸困难、心悸, 此病人目前心功能处于
A. 代偿期
B. Ⅰ级
C. Ⅱ级
D. Ⅲ级
E. Ⅳ级
12. 患者, 女性, 69岁, 因4小时来持续心前区痛, 确诊为急性心肌梗死收入监护室, 监测中发现患者出现心室颤动, 此时责任护士应采取的首要措施是
A. 心内注射利多卡因
B. 气管插管
C. 高压吸氧
D. 非同步直流电除颤
E. 同步直流电除颤
13. 患者, 男性, 51岁, 上腹部烧灼痛2个月, 多于进餐后半小时发生, 持续1小时左右, 两天前无明显诱因排柏油样黑便, 经胃镜检查诊断为胃溃疡。目前认为该病的发生与何种病原菌感染有关
A. 链球菌
B. 肺炎球菌
C. 幽门螺杆菌
D. 金黄色葡萄球菌
E. 大肠杆菌
14. 下列引起上消化道出血的上消化道疾病中, 最为常见的是
A. 食管胃底静脉曲张破裂
B. 急性胃炎
C. 消化性溃疡
D. 胃癌
E. 食管癌
15. 下列哪项肯定是原发性肝癌的促进因素
A. 大量饮酒
B. 乙型肝炎病毒
C. 亚硝胺类化学物质
D. 肝硬化
E. 饮用水污染
16. 下列关于肾性高血压的发生机制的描述不妥的是
A. 按发生机制分为容量依赖性高血压和肾素依赖性高血压
B. 容量依赖性高血压是由水钠潴留导致血容量增加引起
C. 肾素依赖性高血压是由于肾素-血管紧张素-醛固酮系统被激活引起
D. 肾性高血压绝大多数是肾素依赖性的
E. 限制水钠摄入或增加水钠排泄可改善容量依赖性高血压
17. 关于血尿的描述不妥的是
A. 新鲜尿离心后沉渣每高倍镜视野红细胞 >3 个为镜下血尿
B. 尿沉渣 Addis 计数12小时排泄的红细胞数 >50 万为镜下血尿
C. 尿液外观为洗肉水样、血样或有血凝块时, 称为肉眼血尿
D. 1L尿含10ml血液即呈现肉眼血尿
E. 血尿发生原因多为肾小球肾炎、肾盂肾炎、结石、肿瘤等
18. 急性白血病病人易感染的最主要原因是
A. 缺少白蛋白
B. 缺少红细胞
C. 白血病细胞浸润
D. 缺乏成熟中性粒细胞
E. 缺乏血小板
19. 患者, 女性, 30岁, 常年月经量过多, 近来出现头晕、乏力、面色苍白, 医院诊断为贫血, 贫血是指单位容积的外周血液中
A. 红细胞数或血红蛋白量低于正常
B. 红细胞数和血红蛋白量低于正常

- C. 红细胞数和红细胞比容低于正常
D. 红细胞数和网织红细胞数低于正常
E. 红细胞数、血红蛋白浓度和/或红细胞比容低于正常
20. 1 型糖尿病的发生主要是由于
A. 老年人肾小球排糖少
B. 吃糖过多, 短期内无法排出
C. 胰岛素分泌绝对不足
D. 肝糖原快速分解释放大量糖入血
E. 老年人肾小管重吸收糖多
21. 患者, 女性, 50 岁, 身高 160cm, 体重 70kg, 乏力、多尿、口渴半年, 体重下降 5kg, 诊断为 2 型糖尿病, 护士指导该病人时, 下列哪项不妥
A. 要严格进行饮食控制
B. 适当增加运动量
C. 尽量少饮水
D. 学习自己监测血糖
E. 减肥
22. 类风湿性关节炎活动期的标志是
A. 自发痛
B. 梭状指
C. 晨僵
D. 压痛
E. 畸形
23. 某女病人因关节痛, 面部有蝶形红斑, 查血抗 Sm 抗体 (+), 确诊为系统性红斑狼疮。医嘱避免日光直射, 病室紫外线消毒时应回避, 外出穿长袖上衣及长裤, 戴帽或撑伞遮阳。原因是
A. 紫外线可致雌激素作用增强
B. 紫外线是本病重要诱因
C. 紫外线直接破坏细胞
D. 紫外线加重关节滑膜炎
E. 紫外线直接损害骨髓
24. 一氧化碳中毒后较为典型的临床症状是
A. 恶心、呕吐
B. 血压降低、心率加快
C. 口唇呈樱桃红色
D. 疲乏、无力
E. 呼吸困难
25. 患者, 男, 40 岁, 因误服有机磷中毒, 给予抗胆碱药阿托品后出现瞳孔较前扩大, 颜面潮红, 口干, 皮肤干燥, 心率加快。此时症状称为
A. 毒蕈碱样症状
B. 烟碱样症状
C. 中间综合征
D. 阿托品中毒
E. 阿托品化
26. 蛛网膜下腔出血最常见的病因是
A. 高血压脑动脉硬化
B. 脑动脉炎性管壁坏死
C. 动脉粥样硬化
D. 动静脉畸形
E. 先天性脑动脉瘤
27. 患者出现一侧肢体深感觉障碍, 而痛觉、温度觉正常, 称为
A. 交叉型感觉障碍
B. 分离型感觉障碍
C. 阶段型感觉障碍
D. 末梢型感觉障碍
E. 完全型感觉障碍
28. 要素膳是指
A. 将多种自然食物混合成半液体状膳食
B. 包括各种氨基酸、脂肪、糖类、无机盐类、矿物质和维生素等各种分子水平的营养成分的混合物
C. 含支链氨基酸的浓度较高, 而芳香族氨基酸浓度较低的制剂
D. 各类营养素以独立形式出现, 应用时可互相混合或以单独形式提供, 也可加入其他配方中
E. 含有足够的能量和必需氨基酸, 含有少量脂肪和电解质的制剂
29. 低渗性脱水病人的尿比重特点是
A. 增高
B. 基本不变
C. 降低
D. 先升高后降低

- E. 先降低后升高
30. 正常成人若要将体内每日的固体代谢产物经肾排出,至少需要保证每日排尿
- 100~200ml
 - 300~400ml
 - 500~600ml
 - 800~1000ml
 - 1000~1500ml
31. 各型休克最基本的病理生理变化是
- 组织缺氧
 - 代谢改变
 - 血压下降
 - 重要脏器受损
 - 微循环灌流不足
32. 急性肾功能衰竭少尿期病人早期死亡的最常见原因是
- 感染
 - 水中毒
 - 尿毒症
 - 高钾血症
 - 代谢性酸中毒
33. 吸入麻醉与静脉麻醉相比,其优点有
- 诱导迅速
 - 操作方便
 - 药物安全、无爆炸性
 - 对呼吸道无刺激
 - 容易调节麻醉深度
34. 手术后病人出现腹胀的最主要原因是
- 细菌代谢产生气体
 - 血液内的气体弥散到肠腔内
 - 胃肠功能受到抑制
 - 组织代谢产生气体
 - 术后咽下大量空气
35. 关于病人自控镇痛方法的叙述中正确的是
- 镇痛效果不佳
 - 无法防止用药过量
 - 不需要在处方下使用
 - 操作复杂
 - 力求以最小剂量达到有效效果
36. 以下最容易引起急性肾功能衰竭的外伤是
- 挫伤
 - 扭伤
 - 贯通伤
 - 挤压伤
 - 切割伤
37. 胰腺癌好发的部位是
- 胰尾部
 - 全胰腺
 - 胰体、尾部
 - 胰头部
 - 胰体部
38. 国际 TNM 分期法中的 M 是指
- 原发肿瘤
 - 肿瘤部位
 - 远处转移
 - 区域淋巴结
 - 肿瘤的恶性程度
39. 成活率高但愈后不耐磨的皮片是
- 极薄皮片
 - 表层皮片
 - 中厚皮片
 - 全厚皮片
 - 点状皮片
40. 某颅脑损伤病人,唤之睁眼,回答问题错误,躲避刺痛,其格拉斯哥昏迷计分为
- 15 分
 - 12 分
 - 11 分
 - 8 分
 - 5 分
41. 判断甲亢病情严重程度和治疗效果的重要标志是
- 突眼程度
 - 甲状腺大小
 - 体重是否增加
 - 睡眠是否好转
 - 脉率快慢和脉压大小
42. 乳房皮内、皮下淋巴管被癌细胞阻塞

- 时,可出现
- 乳头湿疹样变
 - 乳房炎性表现
 - 乳头凹陷
 - 乳房皮肤橘皮样变
 - 乳房皮肤酒窝征
43. 最易骨折的肋骨是
- 第1、2肋
 - 第2、3肋
 - 第4~7肋
 - 第8~10肋
 - 第11、12肋
44. 食管癌最常见的病理类型是
- 髓质型
 - 蕈伞型
 - 溃疡型
 - 缩窄型
 - 腔内型
45. 原发性腹膜炎最常见的病原菌感染途径是
- 经血液循环
 - 经女性生殖道逆行
 - 外伤导致腹腔开放
 - 腹腔脏器破裂
 - 经急性阑尾炎穿孔部位
46. 继发性腹膜炎的感染多为
- 大肠杆菌感染
 - 肺炎链球菌感染
 - 溶血性链球菌感染
 - 铜绿假单胞菌感染
 - 金黄色葡萄球菌感染
47. 实质性脏器破裂,腹腔内积血不凝的主要原因
- 出血量大
 - 凝血酶原降低
 - 凝血因子被破坏
 - 腹膜脱纤维作用
 - 血液被腹膜渗液稀释
48. 胃癌最好发的部位是
- 胃小弯
 - 贲门部
 - 胃窦部
 - 胃底部
 - 胃体部
49. 急性阑尾炎易发生坏死、穿孔的主要原因是
- 阑尾开口小
 - 阑尾淋巴丰富
 - 阑尾蠕动慢而弱
 - 阑尾动脉为终末动脉
 - 阑尾系膜短
50. 肛裂常发生于截石位的
- 3点处
 - 6点处
 - 8点处
 - 10点处
 - 12点处
51. 门静脉高压症形成后首先出现的病理改变是
- 腹水
 - 肝肿大
 - 脾肿大
 - 交通支扩张
 - 食管胃底静脉曲张出血
52. 原发性肝癌最常见的大体类型是
- 小癌型
 - 结节型
 - 溃疡型
 - 巨块型
 - 弥漫型
53. 急性梗阻性化脓性胆管炎的最常见的梗阻因素是
- 胆道肿瘤
 - 胆管结石
 - 胆道蛔虫
 - 胆管扭转
 - 胆管狭窄
54. 血栓闭塞性脉管炎病变主要位于
- 大、中动脉
 - 大、小静脉
 - 中、小动静脉,而以动脉为主

- D. 中、小动静脉, 而以静脉为主
E. 小动静脉, 而不发生于中动静脉
55. 以下情况标志女性青春期开始的是
A. 骨盆变宽
B. 乳房丰满
C. 月经初潮
D. 阴毛出现
E. 音调变高
56. 临产观察胎先露下降程度的标志是
A. 耻骨弓
B. 骶尾关节
C. 坐骨结节水平
D. 坐骨棘水平
E. 骶骨岬
57. 关于妊娠合并心脏病的叙述不正确的是
A. 妊娠 32~34 周时血容量达到最高峰
B. 第二产程心脏的负担最重
C. 产后 2~3 天心脏负担减轻
D. 是孕产妇死亡的主要原因之一
E. 心功能不良可以发生早产儿、胎儿宫内窘迫
58. 淋病的潜伏期为
A. 24 小时
B. 1~2 天
C. 3~7 天
D. 10~15 天
E. 1~2 个月
59. 在女性不孕因素中, 最常见的是
A. 无排卵
B. 宫颈狭窄
C. 输卵管因素
D. 慢性宫颈炎
E. 子宫黏膜下肌瘤
60. 卵子从卵巢排出后, 正常情况下受精的部位是在
A. 子宫腔
B. 子宫颈
C. 输卵管峡部
D. 输卵管壶腹部
E. 输卵管伞部
61. 功能失调性子宫出血是指
A. 生育期妇女的异常子宫出血
B. 青春期的异常子宫出血
C. 更年期妇女的异常子宫出血
D. 由于神经内分泌功能失调引起的异常子宫出血
E. 子宫肌瘤引起的子宫出血
62. 慢性宫颈炎的病程变化不包括
A. 宫颈糜烂
B. 宫颈肌瘤
C. 宫颈肥大
D. 宫颈腺囊肿
E. 宫颈息肉
63. 请用 Apgar 评分法, 评定以下新生儿的分数: 新生儿出生后, 四肢青紫, 吸痰器清理呼吸道时患儿有恶心表现, 四肢稍屈, 心率 90 次/分, 呼吸浅慢、不规则
A. 0 分
B. 2 分
C. 4 分
D. 6 分
E. 8 分
64. 李女士, 34 岁, 第一胎足月, 因胎儿过大, 经产钳助产分娩一个男婴。胎盘娩出后阴道持续流血, 色鲜红。检查子宫体收缩良好。分析其出血的最可能原因是
A. 子宫收缩乏力
B. 软产道损伤
C. 胎盘部分残留
D. 凝血功能障碍
E. 胎膜残留
65. 某妇女, 28 岁, 平素月经规律, 26~28 天一次, 每次持续 4 天, 其上一次月经是 10 月 1 日。那么在 10 月 7 日, 她的子宫内膜应处于
A. 月经期
B. 增生期
C. 分泌期

- D. 月经前期 (干藤里共藤 48~18)
- E. 初潮期 (急因 02, 人藤封文)
66. 患者葡萄胎刮宫术后 4 个月, 仍有少量阴道流血, 血 HCG 明显高于正常, 胸部 X 线片显示片状阴影, 病理报告: 未见绒毛结构。最可能的诊断是
- A. 再次葡萄胎
- B. 结核
- C. 侵蚀性葡萄胎
- D. 宫外孕
- E. 绒毛膜癌
67. 围产期是指
- A. 从孕期满 27 周至产后 7 天
- B. 从孕期满 37 周至产后 7 天
- C. 从孕期满 28 周至产后 7 天
- D. 从孕期满 28 周至产后 1 个月
- E. 从孕期满 37 周至产后 1 个月
68. 婴儿期每日每公斤体重所需能量为
- A. 170kcal
- B. 150kcal
- C. 130kcal
- D. 110kcal
- E. 90kcal
69. 小儿先会控制腿的活动, 再控制脚的活动, 是遵循了下列哪项发育顺序
- A. 由上到下的顺序
- B. 由近到远的顺序
- C. 由粗到细的顺序
- D. 由低级到高级的顺序
- E. 由简单到复杂的顺序
70. 乙肝第二次接种的年龄是
- A. 出生时
- B. 1 个月
- C. 2 个月
- D. 3 个月
- E. 4 个月
71. 急性肾小球肾炎前驱感染最常见的病原体是
- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 大肠杆菌
- C. 肺炎链球菌
- D. 柯萨奇病毒
- E. A 组 β 溶血性链球菌
72. 正常小儿前囟闭合的时间是
- A. 出生时
- B. 生后 6~8 周
- C. 生后 6~8 个月
- D. 1~1.5 岁
- E. 1.5~2 岁
73. 新生儿易发生黄疸是由于
- A. 免疫功能不成熟
- B. 体温调节功能差
- C. 肝功能不成熟
- D. 红细胞寿命比成人长
- E. 肠肝循环减少
74. 正常小儿, 1 周岁, 出生体重 3kg, 现在体重约为
- A. 5kg
- B. 6kg
- C. 7kg
- D. 8kg
- E. 9kg
75. 健康男婴, 8 个月, 来医院做健康体检, 预计该婴儿可以完成的动作是
- A. 会坐
- B. 会滚
- C. 会爬
- D. 会站
- E. 会走
76. 健康女婴, 年龄 2 个月, 来门诊接受预防接种, 她应当接种的是
- A. 卡介苗
- B. 百白破第一次
- C. 脊髓灰质炎第一次
- D. 麻疹第一次
- E. 乙肝第二次

二、以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每道题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑

(77~80 题共用题干)

患者,女,23 岁。12 周前发热, T: 38℃, 伴恶心、呕吐、腹泻, 校医院按肠炎治疗好转。近 3 天来稍活动即感胸闷、憋气、头晕、乏力。查体: BP: 120/60 mmHg, HR: 100 次/分, 律整, T: 36℃。双肺(一)。心电图示: 第一度房室传导阻滞, 普遍导联 T 波倒置。

77. 导致该患者上述症状可能的原因是

- A. 非 Q 波心肌梗死
- B. 扩张型心肌病
- C. 病毒性心肌炎
- D. 植物神经功能紊乱
- E. 缩窄性心包炎

78. 有助于该病诊断的检查结果是

- A. 心肌酶增高, C 反应蛋白增加
- B. 类风湿因子滴度增高
- C. 抗核抗体荧光试验阳性
- D. 抗链“O”阳性
- E. 白细胞增多, 血沉减慢

79. 导致该病的病因是

- A. 病毒感染
- B. 冠状动脉粥样硬化
- C. 遗传因素
- D. 免疫反应
- E. 细菌感染

80. 有关该病的治疗措施, 不妥的是

- A. 急性期卧床休息
- B. 使用改善心肌营养与代谢的药物
- C. 如发生心衰可使用利尿剂
- D. 给予易消化、富维生素、优质蛋白饮食
- E. 好转出院后, 即可从事轻体力劳动

(81~84 题共用题干)

女性病人, 30 岁。因急性肠梗阻频繁呕吐, 出现口渴、尿少、口唇黏膜干燥、眼窝凹陷、血压偏低。

81. 初步判断该病人出现了

- A. 高渗性脱水
- B. 原发性脱水
- C. 低渗性脱水
- D. 继发性脱水
- E. 等渗性脱水

82. 如进行液体疗法, 应首选的液体是

- A. 5% 葡萄糖液
- B. 生理盐水
- C. 10% 葡萄糖液
- D. 复方氯化钠
- E. 5% 葡萄糖盐水

83. 在纠正脱水的过程中, 尤其应注意出现

- A. 高钙血症
- B. 低钾血症
- C. 高钠血症
- D. 高氯血症
- E. 低镁血症

84. 医嘱每日补充 10% 氯化钾溶液 30ml, 在配好的溶液中, 氯化钾浓度不可大于

- A. 0.2%
- B. 0.3%
- C. 0.5%
- D. 1%
- E. 3%

(85~86 题共用题干)

健康男婴, 出生体重为 3.5kg, 身长为 50cm、头围 34cm, 现在年龄为 6 个月, 来医院做健康体检。

85. 预计该婴儿的体重应当为

- A. 5.5kg
- B. 6.0kg
- C. 6.6kg
- D. 7.0kg
- E. 7.7kg

86. 目前该婴儿处于语言准备阶段, 预计他刚刚能够

A. 发出“爸爸”、“妈妈”的音节

B. 发出元音

C. 发出辅音

D. 发出喉音

E. 用哭叫表达意思

三、以下提供若干组考题, 每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择

(87~89 题共用备选答案)

A. 苯妥英钠

B. 维拉帕米

C. 安装人工心脏起搏器

D. 非同步直流电复律

E. 同步直流电复律

87. 一旦发生心室颤动应立即给予的处理是

88. 洋地黄中毒引起的室性期前收缩可使用

89. 房颤急性期首选治疗为

(90~92 题共用备选答案)

A. 肾上腺素

B. 利多卡因

C. 阿托品

D. 碳酸氢钠

E. 洛贝林

90. 用于纠正酸中毒、增加心肌应激性的药物是

91. 用于解除迷走神经对心脏作用的药物是

92. 用于抑制室性心律失常的药物是

(93~94 题共用备选答案)

A. 枕骨

B. 颞骨

C. 骶骨

D. 臀部

E. 肩胛骨

93. 臀先露的指示点是

94. 面先露的指示点是

(95~97 题共用备选答案)

A. 70%~75%

B. 30%~35%

C. 60%

D. 45%

E. 10%~15%

95. 婴儿每日需要脂肪量应占总需能量的

96. 年长儿每日由碳水化合物所提供能量应占总需能量的

97. 蛋白质所供能量占小儿每日所需总能量的

四、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择所有正确答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑

98. 与胃癌的发生有关的饮食因素是

A. 进食过烫食物

B. 腌制食品

C. 粗糙食物

D. 霉变食品

E. 烟熏食物

99. 用于通气力学监测的指标包括

A. 潮气量

B. 呼吸类型

C. 呼吸道压力

D. 每分通气量

E. 吸气/呼气时间比

100. 导致产褥病率的原因包括

A. 乳腺炎

B. 产褥感染

C. 泌尿系感染

D. 手术切口感染

E. 上呼吸道感染

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑

- 扁桃体超过咽腭弓，但不超过咽后壁中线，应为
 - 扁桃体高度肿大
 - 扁桃体 I 度肿大
 - 扁桃体 II 度肿大
 - 扁桃体 III 度肿大
 - 扁桃体轻度肿大
- 下列组织中，ALT 含量最高的是
 - 肝
 - 骨骼肌
 - 肾
 - 心肌
 - 胰腺
- 肺炎球菌肺炎的病人首选治疗药物为
 - 青霉素 G
 - 链霉素
 - 氯霉素
 - 庆大霉素
 - 四环素
- 对哮喘， β_2 受体激动剂首选的给药方式为
 - 口服
 - 吸入
 - 肌内注射
 - 静脉滴入
 - 直肠给药
- 支气管哮喘发作时，控制症状首选
 - β_2 受体激动剂
 - 糖皮质激素
 - 抗胆碱能药物
 - 茶碱类
 - 肥大细胞膜稳定剂
- 静脉推注氨茶碱速度要缓慢，否则可出现
 - 口干、皮疹
 - 心律失常、血压下降等
 - 红斑和视物模糊
 - 腹绞痛和腹泻
 - 耳鸣和高血压
- 患者，男性，28 岁，检查发现气管向左侧移位，右侧胸廓饱满，触觉语颤减弱，叩诊浊音，应考虑最可能的原因是
 - 肺气肿
 - 气胸
 - 胸腔积液
 - 肺炎
 - 肺脓肿
- 心源性呼吸困难最先出现的是
 - 端坐呼吸
 - 阵发性夜间呼吸困难
 - 劳力性呼吸困难
 - 心源性哮喘
 - 急性肺水肿
- 慢性心衰病人应用 β 受体阻滞剂的作用是
 - 减轻心脏前负荷
 - 减轻心脏后负荷
 - 降低死亡率、住院率
 - 增强心肌收缩力
 - 改善呼吸困难
- 不属于高血压病人应限制的含钠高的饮食是
 - 腌制品
 - 食醋
 - 发酵面食
 - 啤酒
 - 罐头
- 患者，男，65 岁，高血压病史 12 年，未规律服降压药治疗，血压时高时低，多在 160/105mmHg，近 3 小时来胸前区持续疼痛、出冷汗来院急诊，入院后经检查确诊为急性心肌梗死，入 CCU 病房，半小时后患者出现呼吸困难伴喘息，两肺满布湿啰音和哮鸣音，心率 108 次/分，律整，主管护士首先考虑病人的病情变化是

- A. 肺部感染
B. 肺栓塞
C. 急性左心衰竭
D. 严重心肌缺血、缺氧
E. 再次心肌梗死
12. 患者, 女性, 41岁, 患高血压 20 余年, 今日突发头痛、视物模糊、失语, 测血压 210/130mmHg。急诊入院, 对该患者应首选的降压药物是
A. 硝普钠
B. 呋塞米
C. 硝酸甘油
D. 维拉帕米
E. 卡托普利
13. 消化性溃疡最常见的并发症是
A. 穿孔
B. 出血
C. 幽门梗阻
D. 癌变
E. 营养不良
14. 患者, 男性, 76岁, 有胃溃疡病史 8 年, 突然呕血 1000ml, 血压 50/20mmHg, 心率 120 次/分, 此时首先应采取的措施是
A. 准备给予止血药物
B. 立即开放静脉补充血容量
C. 嘱病人禁食
D. 准备急查 B 超
E. 准备急诊胃镜
15. 镜下血尿是指新鲜尿离心沉渣后 Addis 计数 12 小时排泄的红细胞数
A. 0~30 万
B. 超过 30 万
C. 超过 50 万
D. 超过 80 万
E. 超过 100 万
16. 慢性肾炎治疗的主要目的为
A. 消除蛋白尿
B. 消除血尿
C. 防止或延缓肾功能进行性减退
D. 改善消化道症状
E. 消除水肿
17. 下列关于清洁中段尿标本的采集方法中不妥的是
A. 用清晨第一次清尿、新鲜中段尿液送检
B. 宜在使用抗菌药物前或停药当天收集标本
C. 留取标本时要严格无菌操作
D. 留取标本后 1 小时内做细菌培养, 或冷藏保存
E. 尿标本中勿混入消毒药液
18. 容易引起出血性膀胱炎而导致血尿的治疗药物是
A. 甲氨蝶呤
B. 长春新碱
C. 环磷酰胺
D. 阿糖胞苷
E. 柔红霉素
19. 患者, 女性, 40 岁, 不明原因牙龈渗血 3 个月, 月经量增多, 诊断为特发性血小板减少性紫癜, 下列实验室检查哪项不支持该诊断
A. 血小板计数减少
B. 血小板相关免疫球蛋白增高
C. 出血时间正常
D. 血小板寿命缩短
E. 血块回缩不良
20. 王先生, 38 岁, 患 1 型糖尿病已 10 年, 中断胰岛素治疗 1 周后发生酮症酸中毒, 经治疗后意识恢复, 短时间内又突感心悸、饥饿、出汗, 随即又意识不清, 应立即
A. 加大胰岛素剂量
B. 加用格列本脲
C. 静脉滴注碳酸氢钠
D. 静脉注射 50% 葡萄糖液
E. 应用呼吸兴奋剂
21. 放射性¹³¹I 治疗甲亢的最主要并发症是
A. 甲状腺癌变

- B. 诱发甲亢危象
C. 粒细胞减少
D. 突眼恶化
E. 永久性甲状腺功能减退
22. 下列哪项指标常提示狼疮活动
A. 总补体增高
B. C_3 降低
C. IgG 降低
D. α_2 球蛋白降低
E. γ 球蛋白增高
23. 钱女士, 28 岁, 近半年来全身乏力, 低热, 关节疼痛。免疫学检查: 抗 Sm 抗体阳性, 应考虑是
A. 类风湿性关节炎
B. 皮炎
C. 系统性红斑狼疮
D. 慢性关节炎
E. 风湿性关节炎
24. 患者, 男, 40 岁, 因误服有机磷中毒, 给予抗胆碱药阿托品后达到阿托品化, 以下哪项不是阿托品化的表现
A. 瞳孔扩大
B. 颜面潮红
C. 口干
D. 皮肤湿冷
E. 心率加快
25. 一氧化碳中毒患者最佳的氧疗方式是
A. 持续低流量给氧
B. 间歇高流量给氧
C. 高压氧舱治疗
D. 持续高流量给氧
E. 经 20%~30% 酒精湿化后给氧
26. 脑血栓形成的“超早期”治疗时间一般是指发病后的
A. 1 小时内
B. 3 小时内
C. 6 小时内
D. 12 小时内
E. 24 小时内
27. 下列关于腰椎穿刺术的描述, 哪项错误
A. 一般选择腰 3~4 椎间隙
B. 穿刺部位皮肤软组织或脊柱有感染者, 禁忌腰穿
C. 患者术后应去枕平卧 8~12 小时
D. 术后常见不良反应为头痛、恶心、呕吐或眩晕等
E. 术中患者采取侧卧位, 背部齐床沿, 头向前屈, 膝关节屈曲, 双手抱紧膝部的姿势
28. 女性, 54 岁, 因乳腺癌收入院, 护士判断其有营养不良的依据是
A. 身高 163cm, 体重 55kg
B. 三头肌皮褶厚度为 15.3mm
C. 臂肌围为 24cm
D. 血清白蛋白为 27g/L
E. 氮平衡试验为 +1g
29. 高钾血症病人出现心律失常时, 首先应给予
A. 5% NaHCO_3 溶液
B. 5% 葡萄糖加胰岛素
C. 10% 葡萄糖酸钙
D. 高渗盐水
E. 透析疗法
30. 需要用肠外营养支持的病人是
A. 昏迷病人
B. 拒绝进食者
C. 低位肠痿病人
D. 化疗期间严重呕吐病人
E. 急性胰腺炎病人病情稳定后
31. 男性病人, 外伤后出血、烦躁, 肢端湿冷, 脉搏 105 次/分, 脉压 20mmHg。应考虑为
A. 无休克
B. 休克早期
C. 休克中期
D. 休克晚期
E. DIC 形成期
32. 对 DIC 病人早期进行抗凝治疗时, 首选的药物是
A. 肝素