

葉氏
批評

景岳全書

上海廣益書局
印行

加批
詳評

景岳全書

目錄

目序 共計二十四集 六十四卷 每集俱列字號

入集

卷一 傳忠錄上

卷二 傳忠錄中

道集

卷三 傳忠錄下

卷四 脈神章上 有目

卷五 脈神章中

卷六 脈神章下

須集

卷七 傷寒典上 有目

卷八 傷寒典下

從集

卷九 雜證謨

目錄

卷十 雜證謨

諸風

卷十一 雜證謨

非風

卷十二 雜證謨

風痺

性集

卷十三 雜證謨

瘟疫

卷十四 雜證謨

瘧疾

卷十五 雜證謨

寒熱

理集

卷十六 雜證謨

厥逆

傷風

汗證

癰證

瘴氣

暑證

火證

虛損

卷十七 雜證謨

飲食

卷十八 雜證謨

怔忡

不寐

三消

脾胃

眩運

明集

卷十九 雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

卷二十 雜證謨

嘔吐

霍亂

惡心

卷二十一 雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

餽雜

心集

卷二十二 雜證謨

腫脹

卷二十三 雜證謨

積聚

卷二十四

雜證謨

痞滿

泄瀉

痢疾

卷二十五

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

必集

卷二十六

雜證謨

頭痛

面痛

口舌

卷二十七

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

卷二十八

雜證謨

遺精

咽喉

齒牙

卷二十九

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

卷三十

雜證謨

血證

卷三十一

雜證謨

痰飲

卷三十二

雜證謨

脚氣

卷三十三

雜證謨

疝氣

天集

卷三十四

雜證謨

癲狂癡

卷三十五

雜證謨

諸蟲

卷三十六

雜證謨

諸氣

卷三十七

雜證謨

死生

溼證

黃痺

痿證

陽痿

脫肛

癰閉

秘結

柞病

癰風

諸毒
附蟲毒

人集

卷三十八

婦人規上

有目

卷三十九

婦人規下

謨集

卷四十

小兒則上

有目

卷四十一

小兒則下

卷四十二

痘疹詮

麻疹全

有目

烈集

卷四十三

痘疹詮

痘瘡上

有目

卷四十四

痘疹詮

痘瘡中

卷四十五

痘疹詮

痘瘡下

聖集

卷四十六 外科鈐上 有目

賢集

卷四十七 外科鈐下

大集

卷四十八 本草正上 有目

卷四十九 本草正下

德集

卷五十 新方八略 有目

卷五十一 新方八陣全

圖集

卷五十二 古方八陣

目錄 總列以下
共十三卷

卷五十三 古方補陣

書集

卷五十四 古方和陣

字集

卷五十五 古方攻陣

卷五十六 古方散陣

卷五十七 古方寒陣

宙集

卷五十八 古方熱陣

卷五十九 古方固陣

卷六十 古方因陣

長集

卷六十一 婦人

卷六十二 小兒

卷六十三 痘疹

春集

卷六十四 外科

加批
詳評
景岳全書

卷四十七

賢集外科鈐下

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評
古吳江家慎忍庵訂

(三) 發背

發背屬督脉膀胱經。凡陰虛火盛。或醇酒厚味。或鬱怒房勞。或丹石熱毒。皆能致之。右種背痛甚。脈洪數而有力者。熱毒之證也。為易治。若漫腫微痛。色暗。在陽氣虛甚也。尤為難治。大抵發背之證。其名證也。為難治。若不腫不痛。或漫腫色暗。脉微細者。陽氣虛甚也。尤為難治。大抵發背之證。其名雖多。總惟陰陽二證為要。若發一頭或二頭。其形炊赤腫高。發熱疼痛。頭起者為癰。屬陽。易治。若初起一頭如粟。不腫不赤。悶痛煩躁。大渴便秘。睡語咬牙。四五日間。瘡頭不計其數。瘡口各含如粟形如蓮蓬。故名蓮蓬發。積日不潰。按之流血至數日。或八九日。其頭成片。所含之物俱出通結。一衣揭去。又結其口。共爛為一瘡。其膿內攻。其色紫暗者為疽。屬陰。難治。且此證不可大痛。又不可不痛。若見煩悶者多不治。總之瘡瘍雖云屬火。然未有不由陰虛而致者。故經云。督脉經虛。從腦而出。膀胱經虛。從背而出。故不可專泥於火。

陳良甫曰。背疽之源有五。一天行。二瘦弱氣滯。三怒氣。四腎氣虛。五飲冷酒。食炙煇。服丹藥。立齋曰。大抵發背之症。雖發熱疼痛。形勢高大。煩渴不寧。但得脉息有力。飲食頗進。可保無虞。

其膿一潰。諸證悉退。多有因膿不得外泄。以致疼痛。若用敗毒寒藥攻之。反致誤事。若有膿即針之。膿一出。苦楚即止。膿未成而熱毒作痛者。可用解毒之藥。亦有腐潰尺餘者。若無惡證。則投以大補之劑。肉最易生。亦無所忌。惟忌腫不高。色不赤。不亦不焮痛。脉無力。不飲食。腫不潰。腐不爛。膿水清。或膿多不止。皆屬元氣虛也。為難治。宜峻補之。其或膿血既泄。腫痛尤甚。膿水臭。敗煩躁時。喉腹痛渴甚。瀉痢無度。水便如淋。乃惡證也。皆不可治。○又灸法曰。予常治發背。不問日期。陰陽腫痛。或不痛。或痛甚。但未成膿。或不潰者。即與灸之。隨手取效。或麻木者。明灸之。毒氣自然隨火而散。或瘡頭如黍者。灸之不效。亦有數日。色尚微赤。腫尚不起。痛不甚。膿不作者。尤宜多灸。勿拘日期。更服甘溫托裏藥。切忌寒涼之劑。其有勢未定者。或先用箍藥圍之。若用烏金膏點患處。尤妙。凡人初覺發背。赤熱腫痛。莫辨其頭者。但以濕紙覆其上。立候視之。其紙有先乾處者。即是結頭也。取大蒜切成片。如二三錢厚薄。安于頭上。用大艾炷灸之。三壯換一蒜片。痛者灸之不痛。不痛灸之痛時方止。最要早覺。早灸為上。一日二日。十灸十活。三日四日。六七活。五日六日。三四活。過七日則難為力矣。若有十數頭作一處生者。即用大蒜研成膏。作薄餅鋪頭上。聚艾於蒜餅上燒之。亦能活也。若背上初發。亦腫一片。中間有一片黃粟米頭。子使用獨蒜切去兩頭。取中者半寸厚者。正安于瘡上。灸十四壯。多至四十九壯。蓋如此惡證。惟隔蒜灸及塗烏金膏有效。又治法曰。腫硬痛深。脉實者。邪在內也。可下之。○腫高焮痛。脉浮者。邪在表也。宜托之。○焮痛煩躁。或咽乾。火在上也。宜瀉之。○腫高或不作膿者。邪氣凝結也。宜

解之。○腫痛飲冷。發熱睡語者火也。宜清之。○不作膿。或不潰不斂者。陽氣虛也。宜補之。○瘡肉不腐。或積毒不解者。陽氣虛也。宜助陽氣。○膿多或清者。氣血俱虛也。宜峻補之。○脉浮大。或濇而肌肉遲生者。氣血俱虛也。宜補之。○右關脉弱而肌肉遲生者。宜補脾胃。○又諸毒治法曰。如頭痛有表證者。宜服人參敗毒散一二劑。○如喉痛發熱脉數者。用金銀花散。槐花酒神功托裏散。○如疼痛腫硬脉寔者。以清涼飲。仙方活命飲。苦參丸。○腫硬木悶疼痛。發熱煩躁。飲冷便秘。脉沈寔者。內疎黃連湯。或清涼散。○大便已通。欲其作膿。宜仙方活命飲。托裏散。蠟礬丸。外用神異膏。○如飲食少思。或不甘美。用六君子湯。如藿香連進三五劑。更用雄黃解毒散。洗患處。每日用烏金膏塗瘡口處。俟有瘡口。即用紙作撚。蘸烏金膏。絛入瘡內。○若有膿為脂膜。間隔不出。或作脹痛者。宜用針引之。腐肉堵塞者去之。若瘡肉腐動。用猪蹄湯洗之。○如膿稠或痛。飲食如常。瘡肉自腐。用消毒與托裏藥相兼服之。仍用前二膏塗貼。○若腐肉已離好肉者。宜速去之。○如膿不稠不稀。微有疼痛。飲食不甘。瘡肉腐遲。更用桑柴灸之。亦用托裏藥。○若瘡肉不腐。或膿清稀。不斂痛者。急服大補之劑。亦用桑木灸之。以補接陽氣。解散鬱毒。○嘗觀患處稍重。未成膿者。不用灸之法。及膿熟不開。或待腐肉自去。則多致不救。○大抵氣血壯寔。或毒少輕者。可假藥力。或自腐潰。若怯弱之人。熱毒中隔。內外不通。不行針灸。藥無全功矣。○此證若膿已成。急宜開之。否則重者潰通臟腑。腐爛筋骨。若使透隔。則不可治。輕者延潰良肉。難於收功。因而不斂者多矣。○又諸補治法曰。若腫焮作痛。寒熱作渴。飲食如常。

此形氣病氣俱有餘也。先用仙方活命飲。後用托裏消毒散解之。○漫腫微痛。或色不赤。飲食少思。此形氣病氣俱不足也。用托裏散調補之。○不作膿。或膿成不潰。陽氣虛也。托裏散倍加肉桂參芪。○膿出而反痛。或膿水清稀。氣血俱虛也。八珍湯。○惡寒形寒。或不收斂。陽氣虛也。十全大補湯。○熱內熱。或不收斂。陰血虛也。四物加參朮。作嘔欲嘔。或不收斂。胃氣虛也。六君加炮姜。○食少體倦。或不收斂。脾氣虛也。補中益氣湯。加茯苓半夏。○肉赤而不斂。血熱也。四物加山梔連翹。○肉白而不斂。脾虛也。四君加酒炒芍藥木香。○小便頻數者。腎陰虧損也。加減八味丸。○大抵瘡毒勢甚。若妄用攻劑。怯弱之人。必損元氣。因而變證者衆矣。○又三證治法曰。若初患未發出。而寒熱疼痛。作渴飲冷。此邪氣內蘊也。仙方活命飲。若口乾飲熱。漫腫微痛。此元氣內虛也。托裏消毒散。若飲食少思。肢體倦怠。此脾胃虛弱也。六君子湯。如未應。加姜桂。其有死者。乃邪氣盛。正氣虛。而不能發出也。在於旬餘之間見之。○若已發出。用托裏消毒散。不腐潰。用托裏消毒散。如不應。急宜溫補脾胃。其有死者。乃真氣虛。而不能腐潰也。在於二旬之間見之。○若已腐潰。用托裏散。以生肌。如不應。急宜溫補脾胃。其有死者。乃脾氣虛。而不能收斂也。在於月餘見之。此三證雖不見於經籍。余嘗治而歷驗者。

千金方。灸法治發背。已潰未潰者。用淡豆豉。以水和搗成硬泥。依腫大小。作餅三四分厚。如已有瘡孔。勿置瘡孔上。但四布豆餅。列艾其上。灸之。使微熱。勿令破肉。如熱痛急。少起之。日灸二度。如先有瘡孔。孔出汁即瘳。

一驗透膈法。凡背疽大潰。欲驗穿透內膜者。不可用皂角散噯法。但以紙封患處。令病者用意呼吸。如紙不動者。未穿透也。倘用取嚏法。鼓動內膜。則反致穿透。慎之慎之。

都憲周弘岡。背患疽腫而不潰。脉大而浮。此陽氣虛弱。而邪氣壅滯也。用托裏散倍加參芪。反內熱作渴。脉洪大鼓指。此虛火也。用前散急加肉桂。脉證頓退。仍用托裏而愈。若以為熱毒而用寒藥。則誤矣。○上舍張克恭患此。內服外傳皆寒涼敗毒。遍身作痛。欲嘔少食。晡熱內熱。惡寒畏寒。余曰。遍身作痛。營衛虛而不能營於肉裏也。欲嘔少食。脾胃虛寒。而不能消化飲食也。內熱晡熱。陰血內虛也。而陽氣陷於陰分也。惡寒畏寒。陽氣虛弱。而不能衛於肌肉也。此皆由脾胃之氣不足所致。遂用補中益氣湯。諸證漸退。更以十全大補湯。腐肉漸潰。又以六君子湯。加芍歸。肌肉頓生而愈。○府庠彭碧溪患腰疽。服寒涼敗毒之藥。色暗不痛。瘡頭如鋪黍。背重不能安寢。耳聾目白。面色無神。小便頻澇作渴。迷悶氣粗短促。脉浮數。重按如無。余先用滋水之藥一劑。少頃便利渴止。背即輕爽。乃砭出瘀血。以艾半觔許。明灸患處。外傳烏金膏。內服參芪歸朮肉桂等藥。至數劑。元氣稍復。自疑肉桂辛溫。一日不用。手足並冷。大便不禁。仍用肉桂及補骨脂二錢。肉豆蔻一錢。大便復常。其肉漸潰。更用當歸膏。以生肌肉。八珍湯。以補氣血而愈。○上舍蔡東之患此。余用托裏之藥而潰。瘡口尚未全斂。時值仲冬。且兼咳嗽。余曰。瘡口未斂。脾氣虛也。咳嗽不止。肺氣虛也。法當補其母。一日與之同宴。見忌羊肉之類。余曰。補可以去弱。人參羊肉之類是也。最宜食之。遂每日不徹旬餘。而瘡斂。嗽亦頓愈矣。○一男子年逾五十。

患發背。色紫腫痛。外皮將潰。寢食不安。神思甚疲。用桑柴灸患處。出黑血。即睡覺。而諸證如失。服仙方活命飲二劑。又灸一次。膿血皆出。更進二劑。腫痛大退。又服托裏消毒散數劑。而斂。夫瘡勢熾甚。本宜峻劑攻之。但年老血氣衰弱。况又發在肌肉。若專於攻毒。則胃氣先損。必反誤事。俱薛按

予長男於二週患背疽。治按在腫瘍條中。新按

一論外通用方 神仙薰照法外一二三

(三) 腦疽

立齋曰。腦疽屬膀胱經積熱。或溼毒上壅。或陰虛火熾。或腎水虧損。陰精消涸所致。○若腫痛未作膿者。宜除濕消毒。○大痛或不痛。或麻木者。毒甚也。隔蒜灸之。更用解毒藥。○腫痛便秘。者邪在內也。宜泄之。○不甚痛。或不作膿者。虛也。托裏為主。○膿成脹痛者。針之。更宜托裏。○上部脉數寔而痛者。宜降火。○上部脉數虛而痛者。宜滋陰降火為主。○尺部脉數而作渴者。滋陰降火。○脉數而虛細無力。或膿清。或不斂。或膿多者。大補血氣。○不作膿。或不潰者。托裏藥主之。○煩躁飲冷。脉寔而痛者。宜瀉火。○又治法曰。初起腫赤痛甚。煩渴飲冷。脉洪數而有。力。乃濕熱上壅。當用黃連消毒散。並隔蒜灸。以除濕熱。○若漫腫微痛。渴不飲冷。脉洪數而無力。乃陰虛火熾。當用六味丸。及補中益氣湯。以滋化源。○若口舌乾燥。小便頻數。或淋漓作痛。乃腎水虧損。急用加減八味丸。及前湯。以固根本。而引火歸經。○若不成膿。不腐潰。陽氣虛也。

四君加歸芪。○若不生肌不收斂。脾氣虛也。十全大補湯。○若色暗不潰。或潰而不斂。乃陰精消涸。名曰腦爛。為不治。若攻補得宜。亦有可愈。○大凡腫焮痛甚。宜活命飲。隔蒜灸之。以解散瘀血。拔引鬱毒。但艾炷宜小而少。若欲其成膿腐潰。生肌收斂。並用托裏為主。

李氏曰。腦疽及頸項有疽。不可用隔蒜灸。恐引毒上攻。宜灸三里穴五壯。氣海穴五壯。仍服涼血化毒之藥。或以騎馬穴法灸之。凡頭項咽喉生疽。古法皆為不治。若用此法。多有生者。如五香連翹漏蘆等湯。國老膏。萬全散。皆可選用。見外科精要

一老人患此。色赤腫痛。脉數而有力。與黃連消毒散二劑。少退。更與清心蓮子飲四劑。而消。

一男子腫痛。脉數。以荆防敗毒散二劑而痛止。更以托裏消毒散而消。○一男子焮腫疼痛。發熱飲冷。脉洪數。與涼膈散二劑而痛止。以金銀花散四劑而潰。更以托裏藥而愈。○一老婦稟壯實。潰而痛不止。脉寔便秘。以清涼飲二劑而痛止。更以托裏消毒藥而愈。○一婦人冬間患此。腫痛熱渴。余用清涼消毒潰之而愈。次年三月。其舌腫大。遍身發疔如葡萄。不計其數。手足尤多。乃脾胃受毒也。先各刺出黑血。隨服奪命丹七粒。出鼻汗。瘡熱益甚。便秘二日。與大黃苓連各三錢。升麻白芷山梔薄荷連翹各二錢。生甘草一錢。水煎三五沸服之。大小便出臭血甚多。下體稍退。乃磨入犀角汁。再服。舌本及齒縫出臭血。諸毒乃消。更以犀角地黃湯而愈。○一婦人患前證。口乾舌燥。內服清熱。外敷寒涼。色暗不覺。胸中氣噎。此內真寒而外假熱也。彼疑素有痰火。不欲溫補。余以參芪各五錢。姜桂各二錢。一劑頓潰。又用大補藥而愈。○一男子頭

項俱腫。雖大潰。腫痛益深。兼作瀉。煩躁不睡。飲食少思。其勢可畏。診其脉則毒尚在。與仙方活命飲二劑。腫痛退半。與二神丸及六君子湯。加五味子。酸棗仁。四劑。諸證少退。飲食少進。睡亦少得。又與參苓白朮散數劑。飲食頓進。再與十全大補湯。加金銀花。白芷。月餘而瘡。薛按

(四) 耳瘡

立齋曰。耳瘡屬少陽三焦經。或足厥陰肝經。血虛風熱。或肝經燥火風熱。或腎經虛火等因。○若發熱。焮痛。屬少陽厥陰風熱。用柴胡清肝散。○若內熱。痒痛。屬二經血虛。用當歸川芎散。○若寒熱。作痛。屬肝經風熱。用小柴胡湯。加山梔。川芎。○若內熱。口乾。屬腎經虛火。用加味地黃丸。如不應。用加減八味丸。餘當隨證治之。

愚按薛氏所治耳證。凡氣虛者。以補中益氣湯。加山梔。黃芩。血虛者。用八珍湯。加柴胡。丹皮。肝火血虛者。用梔子清肝散。怒動肝火者。用加味逍遙散。肝脾受傷者。朝用加味歸脾湯。暮用加味逍遙散。此其治之大約也。○子嘗治一儒者。年近三旬。素有耳病。每年當發。發必腫潰。至乙亥二月。其發則甚。自耳根下連頸項。上連頭角。耳前耳後。莫不腫痛。如舊之治。無非散風降火。至一月後。稠膿鮮血。自耳迭出。每二三日。必出一酒鍾許。然膿出而腫全不消。痛全不減。枕不可近。食不可加。氣體俱困。自分甚危。延余治之。察其形氣。已大不足。察其病體。則腫痛如舊。仍若有餘。察其脉息。則或見弦急。或見緩弱。此非實熱可知。然脉不甚緊。而或時緩弱。亦得潰瘍之體。尚屬可治。遂先以六味湯。二三劑。而元氣稍振。繼以一陰煎。加牛蒡子。茯苓。澤瀉。仍倍加。