

葉氏
批評

景岳全書

上海廣益書局
印行

加批
詳評

景岳全書

目錄

目序 共計二十四集 六十四卷 每集俱列字號

入集

卷一 傳忠錄上

卷二 傳忠錄中

道集

卷三 傳忠錄下

卷四 脈神章上 有目

卷五 脈神章中

卷六 脈神章下

須集

卷七 傷寒典上 有目

卷八 傷寒典下

從集

卷九 雜證謨

目錄

卷十

雜證謨

諸風

卷十一

雜證謨

非風

卷十二

雜證謨

風痺

性集

卷十三

雜證謨

瘟疫

卷十四

雜證謨

瘧疾

卷十五

雜證謨

寒熱

理集

卷十六

雜證謨

厥逆

傷風

汗證

癰證

瘴氣

暑證

火證

虛損

卷十七 雜證謨

飲食

卷十八 雜證謨

怔忡

不寐

三消

脾胃

眩暈

明集

卷十九 雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

卷二十 雜證謨

嘔吐

霍亂

惡心

卷二十一 雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

餒雜

心集

卷二十二 雜證謨

腫脹

卷二十三 雜證謨

積聚

卷二十四

雜證謨

痞滿

泄瀉

痢疾

卷二十五

雜證謨

心腹痛

脇痛

必集

卷二十六

雜證謨

頭痛

面痛

卷二十七

雜證謨

眼目

耳證

卷二十八

雜證謨

遺精

咽喉

卷二十九

雜證謨

遺精

淋濁

貫集

卷三十

雜證謨

腰痛

口舌

鼻病

齒牙

遺溺

血證

卷三十一

雜證謨

痰飲

卷三十二

雜證謨

脚氣

卷三十三

雜證謨

疝氣

天集

卷三十四

雜證謨

癲狂癡

卷三十五

雜證謨

諸蟲

卷三十六

雜證謨

諸氣

卷三十七

雜證謨

死生

溼證

黃痺

痿證

陽痿

脫肛

癰閉

秘結

柞病

癰風

諸毒
附蟲毒

人集

卷三十八

婦人規上

有目

卷三十九

婦人規下

謨集

卷四十

小兒則上

有目

卷四十一

小兒則下

卷四十二

痘疹詮

麻疹全

有目

烈集

卷四十三

痘疹詮

痘瘡上

有目

卷四十四

痘疹詮

痘瘡中

卷四十五

痘疹詮

痘瘡下

聖集

卷四十六 外科鈐上 有目

賢集

卷四十七 外科鈐下

大集

卷四十八 本草正上 有目

卷四十九 本草正下

德集

卷五十 新方八略 有目

卷五十一 新方八陣全

圖集

卷五十二 古方八陣

目錄 總列以下
共十三卷

卷五十三 古方補陣

書集

卷五十四 古方和陣

字集

卷五十五

古方攻陣

卷五十六

古方散陣

卷五十七

古方寒陣

宙集

卷五十八

古方熱陣

卷五十九

古方固陣

卷六十

古方因陣

長集

卷六十一

婦人

卷六十二

小兒

卷六十三

痘疹

春集

卷六十四

外科

加批
詳評
景岳全書

卷三十九

人集婦人下

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評
古吳江家楨忍庵訂

產育類

(三) 滑胎

妊娠滑胎之法。惟欲其坐草之期。易而且速。而難易之由。則在血之盈虛。不在藥之滑利。蓋血多則潤。而產必易。血虧則澀。而產必難。故於未產之前。但宜以培養氣血為主。而預禁之地。如西物湯。滑胎煎。五福飲。小營煎。八珍湯之類。即皆滑胎之要藥。葉氏謂胎不必滑。養血補藥。反能凝滯胃口。不快飲食。不進矣。惟以飲食調。若不知此。而過用滑利等物。或產期未近。無火無滯。而妄用清火。行滯。沉降。若之戒。七情為要。寒等藥。必皆暗殘榮氣。走泄真陰。多致血虧氣陷。反為臨期大害。若果肥盛氣實者。則紫蘇飲。保生無憂散。滑胎枳壳散之類。皆可擇用。

(三) 催生

凡妊娠胎元完足。彌月而產。熟落有期。非可催也。所謂催生者。亦不過助其氣血而利導之耳。直待臨期。乃可用脫花煎。或滑胎煎。隨證加減主之。或經日久。產母困倦難生。俱宜服滑胎煎。以助其氣血。令兒速生。其有氣虛無力。艱於傳送者。必用獨參湯。隨多隨少。接濟其力。皆為催

生要法。若期未至。而妄用行氣奪血等劑。以為催生。亦是獨摘方苞之弊。據宋人之苗耳。

一臨盆將產。腹痛已甚。凡催生之藥。無如脫花煎。少用肉桂五七分。為最穩最妙。若氣虛無力者。加人參二三錢。虛甚者。任意用之。【葉氏】人參亦不必用。常見貧窮勞苦之婦。易產而無病。所以不必用藥。○女科書惟女科經綸最好。有論無方。

圖活○一催生若水血下多。子道乾澀難出者。宜用滑利之物。如猪脂油。蜜酥油。葱白。葵子。牛乳。滑石。榆白皮之類。以潤之。亦濟急之法也。

滑胎催生論外方

達生散婦四 生化湯婦四 加味川芎湯婦四 良方當歸湯婦五 經驗滑石散

婦五二
胎乾難產 佛手散婦四

穩婆

產婦臨盆。必須聽其自然。不宜催逼。要先安其神志。勿使驚慌。直待花熟蒂圓。自當落矣。所以凡用穩婆。必先擇老成忠厚者。預先囑之。及至臨盆。務令從容鎮靜。不得用法催逼。余嘗見有穩婆。忙冗性急者。恐顧此失彼。因而勉強試湯。分之極之。逼之使下。多致頭身未順。而手足先出。或橫或倒。為害不小。若未有緊陣。不可令其動手。切記切記。又或有生息不順。及雙胎未下之類。但宜穩密安慰。不可使產母聞知。恐驚則氣散。愈難生育。又嘗見有奸詭之婦。故為呼訝之聲。或輕事重報。以顯已能。以圖酬謝。因致驚疑。產婦為害尤非細故。極當慎也。立齋醫按。載一穩婆云。止有一女。於分娩時。適當巡街御侍行牌。取我視其內室分娩。女為此

驚赫未產而死。後見侍御。更以威顏吩咐。迨視產母。胎雖順而頭偏在一邊。此時若以手入推。正可保順生。因畏其威。不敢施手。但回稟云。此是天生天化。非人力所能。因是子母俱不能救。由此觀之。可見產時當用靜鎮自然。有一毫驚恐疑畏。切不可使混於其間者。

(五) 產要

凡孕婦臨月。忽然腹痛。或作或止。或一二日。或三五日。胎水少來。但腹痛不密者。名曰弄胎。非當產也。又有一月前。或半月前。忽然腹痛。如欲產而不產者。名曰試月。亦非產也。凡此腹痛。無論胎水來與不來。俱不妨事。但當寬心待時可也。若果欲生。則痛極連腰。乃將產也。蓋腎係於腰。胞係於腎。故耳。又試搗產母手中指。本節跳動。即當產也。此時兜逼產門。穀道挺進。水血俱下。方可坐草試湯。瓜熟蒂落。此乃正產之候也。

一產婦腹痛未甚。且須寬心行動。以便兜身舒轉。如腰腹甚痛。有產之兆。即當正身仰臥。或起坐舒伸。務宜安靜從容。待兜轉身向下。其產必順。而且最易。不宜預為驚擾。入手以致產婦氣怯。胞破漿乾。使兜轉身不易。則必有難產之患。一產婦初覺欲生。使宜惜力調養。不可用力妄施。恐致臨產之力。若兜方轉身而用力太早。則多致橫逆。須待順而臨門。一逼自下。若時候未到。用力徒然。一臨產房中。不宜多人喧嚷驚慌。宜閉戶靜以待生。一將產時。宜食稠軟白粥。勿令飢渴。以乏氣力。亦不宜食硬冷難化之物。恐產時乏力。以致脾虛不能消化。則產後有傷食之病。一產婦產室。當使溫涼得宜。若產在春夏。宜避陽邪風。是也。產在秋冬。宜避陰

邪寒是也。故於盛暑之時。亦不可當風取涼。以犯外邪。又不宜熱甚。致令產母頭疼面赤。亦不宜人眾。若熱氣薰蒸。亦致前患。其或有熱極煩渴。而血暈血溢者。亦可少與涼水。暫以解之。然亦不可多用。若冬末春初。餘寒尚盛。產室不可無火。務令下體和暖。衣被亦當溫厚。庶不為寒氣所侵。可免胎寒血滯難產之患。且產後胎元既落。氣血俱去。乘虛感邪。此時極易。故不可不慎。○一凡富貴之家。過於安逸者。每多氣血壅滯。常致胎元不能轉動。此於未產之先。亦須常為運動。庶使血氣流暢。胎易轉側。產亦易矣。葉氏富貴之家。每為人所誤。因氣滯也。是所當預為留意者。○一妊娠將產。不可占卜問神。如巫覡之徒。哄嚇謀利。妄言凶險。禱神祈保。產婦聞之。致生疑懼。夫憂慮則氣結。滯而不順。多致難產。所宜戒也。○一產時胞漿未下。但只穩守無妨。若胞漿破後。一二時辰不生。即服催生等藥。如脫花煎。滑胎煎。或益母丸之類。益漿乃養兒之生。漿乾不產。必其胎元無力。愈遲則愈乾。力必愈乏。所以速宜催之。○一產婦與酒不可多而致醉。凡產前醉則乏力。而四肢不用。產後酒多。恐引入血分。四肢致後日有動。血及四肢無力。髓骨痠痛之患也。

(六) 六逆產

一橫產者。以兒方轉身。產母用力逼之太早。故致兒身未順。而先露手臂。但令母安然仰臥。穩婆以手徐推兒臂。下體令其正直。復以中指摸其肩。弗使臍帶板條。即生。○二倒生者。因兒未及轉身。產母努力。故致兒先露足。令母正臥。以手徐推足入。良久。仍推兒身。徐俟轉正。近門即生。

葉批胞

水破而不
產未可便
為難產如
水來而血
亦來方為
難產然必
以腰痛為

○三、偏生者。因兒未順生路。產母努力。逼兒頭偏一邊。雖然露頂。實額角也。亦照前法。推正即生。若兒頂後骨。偏柱轅道旁。以手從外後旁。輕輕托正。即生。○四、礙產者。兒身雖順。門路雖正。但不能下。乃因胎轉時。臍帶絆肩。而然令產母仰臥。以手輕推兒向上。乃用中指按兩肩。理順臍帶。即生。○五、坐產者。因兒將產。其母疲倦。久坐椅褥。抵其生路。而然須用手巾一條。拴係高處。令產母以手足扳之。輕輕屈足舒伸。以開生路。兒即順生。○六、盤腸產者。臨產母腸先出。子產而腸未收。故曰盤腸產。古法以醋水各半。盪熱。然喚產母面背則收。一法以草麻子四十九粒。研爛。塗母頭頂。待腸收上。急洗去。俗以水喚面背驚之。而腸亦收。但恐驚則氣散。反致他疾。戒之。○一方。治橫逆難產。令產母仰臥。以小針刺兒手脚心三五次。用鹽擦之。手脚即縮上。轉身即生。○一方。治盤腸產。以半夏為末。用少許搐鼻中。則腸自上。○又方。用大紙燃以麻油潤。滲點著吹滅。以烟薰產婦鼻中。腸即上。○又方。腸出盛以潔淨漆器。濃煎黃芪湯浸之。腸即上。

(三) 胞破難產

凡產婦胎未順而胞先破者。其因有二。蓋一有母質薄弱。胞衣不固。因而轉動。隨觸而破者。此氣血之虛也。一有兒身未轉。坐草太早。用力太過。而胞先破者。此舉動之傷也。而胞破已久。若水血乾。產路澀。則兒難下。宜急用大料四物湯。或五物煎。脫花煎。滑胎煎。五福飲。當歸湯之類。助其氣血。并濃煎葱湯。薰洗產戶。使其暖而氣達。則自當順下。若持久力乏。血已耗固。則危甚矣。當用八珍湯料一斤。益母草四兩。水數碗。煎熟。不時飲之。亦有得生者。或以黃芪芍歸數斤。

正產者無腹痛腰痛而竟有水來此胞外之水不必驚惶聽其自然有停數日而產者亦無難意此余所歷過昔劉類千夫人曾有此。即有血水併來而難產者亦不必服藥安心靜養切勿驚惶以駭產婦亦

以大釜煎藥氣氤氳滿室使產母口鼻俱受其氣亦良法也○大抵產難之證多患於鬱悶安佚富貴之家治法雖云胎前清氣產後補血然不可拘泥若胃脾不健氣血不充必當預為調補不然臨產必多患難

一產難經日不下別無危證者宜用脫花煎催之極妥極妙○一醫宿客店治店婦臨產數日不生下體俱冷用藥甚窘令取椒橙葉菜莢共煎湯一盆令產婦以小凳坐盆內薰洗良久小腹皆煖氣溫血行遂產○一方以紫蘇煎湯薰洗大抵遇嚴寒時月產久傷冷氣血必凝此薰洗之法亦要法也外以淋湯內以羊肉湯必效○一方令產婦以自己髮梢含於口內令其惡心作嘔即下亦治胞衣不出

(三) 胞衣不出

胞衣不出有以氣血疲弱不能轉送而停閣不出者其證但見無力而別無痛脹治當補氣助血宜速用決津煎或滑胎煎保生無憂散局方黑神散之類主之○有以惡露流入胞中脹滯不出者蓋既脫胞帶必下墜故胞在腹中形如仰葉仰則盛聚血水而脹碍難出惟老成穩婆多有識者但以手指頂其胞底以使血散或以指摸上口扳開一角使惡露傾瀉則腹空自落矣○又一法以本婦頭髮攪入喉中使之作嘔則氣升血散腹軟亦自落矣葉門此法最妙凡胎胞不出者多死授以此法甚效○若血滲胞中停蓄既久而為脹為痛或喘或急則非逐血破血不可也宜速用奪命丹或用失笑散以熱酒調服使血散脹消其衣自下若氣血兼虛者亦

不必用力
竟說產時
未到以安
其心有遲
四五日而
生者余亦
坐過多婦

惟決津為善。○一方用單麻子仁一兩。碾爛貼母右足心。衣下。速洗去。臍則腸易出。如腸不收。即以此膏塗臍頂。則腸自入。○一方用紅花一兩。酒煮汁服。○一法用產婦鞋底炙熱。熨小腹上下。即出。○一方用皂角刺燒為末。每服一錢。溫酒調服。

胞衣論外方

牛膝散

續四九

胎衣不下腹脹

（元）氣脫血暈

產時胎胞既下。氣血俱去。忽爾眼黑頭眩。神昏口噤。昏不知人。古人多云。惡露乘虛上攻。故致血暈。不知此證有二。曰血暈。曰氣脫也。若以氣脫作血暈。而用辛香逐血化痰等劑。則立刻斃矣。（案）當歸補血湯亦可。如有汗黃底。建中湯亦妙。此血脫益氣之法也。不可不慎也。○一氣脫證。產時血既大行。則血去氣亦去。多致昏暈不省。微虛者少頃即甦。大虛者脫竭即死。但察其面白。眼閉口開。手冷。六脈細微之甚。是即氣脫證也。速用人參一二兩。急煎濃湯。徐徐灌之。但得下咽。即可救活。若少遲延。則無及矣。余嘗救此數人。無不隨手而愈。此最要法也。又嘗見有禁參而斃者。云新產後不可用參。用參則補住惡血。必致為害。即勸之亦不肯用。直待斃而後悔者。亦數人矣。又有云。產後必過七日方可用參。此等愚昧訛傳。不知始自何人。誤人不淺。萬萬不可信也。○一血暈之證。本由氣虛。所以一時昏暈。然血壅痰盛者。亦或有之。如果形氣脈氣俱有餘。胸腹脹痛上衝。此血逆證也。宜失笑散。若痰盛氣粗。宜二陳湯。如無脹痛氣粗之類。悉屬氣虛。宜大劑芍歸湯。八

珍湯之類主之。當補氣虛非芳歸所能治即血脫亦○一卒時昏暈。約有未及。宜燒秤錘令
 亦用器盛至床前以醋沃之。或以醋塗口鼻。令鼻聞酸氣。收神即醒。或以破舊漆器。或用乾漆
 燒烟薰之。使鼻受其氣。皆可。但此法雖輕而暴暈者所宜。若氣虛之甚而昏厥者。非用大補之
 劑終無益也。

(早) 兒初生初誕法詳小兒門

凡嬰兒初生。當隨手包裹。切不可為風寒所侵。蓋兒在腹中。遮護最密。及其初脫胞胎。肌膚脆
 嫩。極易感邪。若在夏令。自無所慮。但覺稍寒。即須慎之。嘗見兒生未久。多有驚風發熱抽搐等
 病者。率由乎此。○一小兒初生。天氣微涼。即大忌洗沐。恐腠理不密。元氣發泄。而外邪乘之也。
 ○凡產母分娩艱難。勞傷胎氣。多有兒雖脫胞。而乏力垂危。或已死者。切不可便斷臍帶。當急
 用大紙蘸醪香油。於臍帶上。往來燒斷之。取其陽氣以續胎元。俄頃兒得啼聲。即已活矣。且可
 免胃寒泄瀉之病。凡見此者。若以刀斷臍帶。則子母皆多難保。此出立齋醫按。○一凡燒臍帶
 之法。惟素多陽虛。及產時氣脫者。最宜用之。以助陽氣。若母氣陽強。或兒聲洪亮者。皆不宜用。
 恐火從臍入。日後致生熱毒。則反為害不小。

(四) 子死腹中

凡子死腹中者。多以觸傷。或犯禁忌。或以胎氣薄弱。不成而殞。或以胞破血乾。持久困敗。但察
 產母腹脹舌黑者。其子已死。若非產期而覺腹中陰冷重墜。或為嘔惡。或穢氣上衝。而舌見青