

全国卫生专业技术资格考试丛书

北京大学护理学院 编写

护理学专业[主管护师] 资格考试习题集

2008年

- 紧扣全国卫生专业技术资格考试大纲
- 以题库形式涵盖资格考试主要考点
- 专家编写，考前强化训练

免费赠送20元
上网学习充值卡



北京大学医学出版社

全国卫生专业技术资格考试丛书

护理学专业（主管护师） 资格考试习题集

北京大学护理学院 编写

R47-44/BDH-2



北京大学医学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

护理学专业 (主管护师) 资格考试习题集/北京大学
护理学院编写. —2 版. —北京: 北京大学医学出版社, 2008. 1
ISBN 978-7-81116-278-3

·I. 护… II. 北… III. 护理学—资格考核—习题 IV.
R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 203358 号

护理学专业 (主管护师) 资格考试习题集

编 写: 北京大学护理学院

出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010—82802230)

地 址: (100083) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

网 址: <http://www.pumpress.com.cn>

E-mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 莱芜市圣龙印务有限责任公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 许立 药蓉 曹霞 王智敏 责任校对: 金彤文 责任印制: 张京生

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 33.75 字数: 816 千字

版 次: 2008 年 1 月第 2 版 2008 年 1 月第 1 次印刷 印数: 1—10000 册

书 号: ISBN 978-7-81116-278-3

定 价: 56.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

前 言

为配合全国卫生专业技术护理学专业（主管护师）资格考试，帮助考生在有限的时间内掌握考试要点，提高复习效率，北京大学护理学院组织相关学科专家，根据护理学专业（主管护师）最新考试大纲，共同编写了这套考试辅导丛书。本套丛书共分三本：

《护理学专业（主管护师）资格考试应试指导》

内容精练，重点突出，可以帮助考生在考前高效快速地掌握考试重点和难点。

《护理学专业（主管护师）资格考试习题集》

题量大，内容丰富，涵盖资格考试主要考点，是考前强化训练的必备用书。

《护理学专业（主管护师）资格考试全真模拟及精解》

全方位模拟考试真题，答案由专家解析，是考前冲刺的最佳选择。

编 者

答题说明

A1 型题：每道考题有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

A2 型题：每道考题是以一个小案例出现的，其下有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

A3 型题：提供一个案例，下设若干道考题。在每道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

A4 型题：提供一个案例，下设若干道考题。每道考题会逐步增加新的信息，根据题干及新增信息，在考题下的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

B 型题：提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案。某个备选答案可以被选择一次、多次或不被选择。

X 型题：每道考题有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择所有正确答案。

目 录

第一篇 内科护理学

第一章	呼吸系统疾病病人的护理	(1)
第二章	循环系统疾病病人的护理	(18)
第三章	消化系统疾病病人的护理	(42)
第四章	泌尿系统疾病病人的护理	(56)
第五章	血液及造血系统疾病病人的 护理	(64)
第六章	内分泌与代谢性疾病病人的 护理	(76)
第七章	风湿性疾病病人的护理	(84)
第八章	理化因素所致疾病病人的 护理	(88)
第九章	传染病病人的护理	(96)
第十章	神经系统疾病病人的护理	(115)

第二篇 外科护理学

第一章	水、电解质、酸碱代谢失调 病人的护理	(125)
第二章	外科休克病人的护理	(129)
第三章	多器官功能障碍综合征	(132)
第四章	麻醉病人的护理	(135)
第五章	复苏	(138)
第六章	重症病人的监护	(140)
第七章	外科围手术期护理	(142)
第八章	疼痛病人的护理	(149)
第九章	营养支持病人的护理	(150)
第十章	外科感染病人的护理	(153)
第十一章	损伤病人的护理	(156)
第十二章	器官移植病人的护理	(161)
第十三章	肿瘤病人的护理	(163)
第十四章	颈部疾病病人的护理	(165)
第十五章	乳房疾病病人的护理	(168)

第十六章	腹外疝病人的护理	(171)
第十七章	急性化脓性腹膜炎病人的 护理	(175)
第十八章	腹部损伤病人的护理	(178)
第十九章	胃、十二指肠疾病病人的 护理	(180)
第二十章	肠疾病病人的护理	(183)
第二十一章	直肠肛管疾病病人的 护理	(192)
第二十二章	门静脉高压症病人的 护理	(195)
第二十三章	肝脏疾病病人的护理	(197)
第二十四章	胆道疾病病人的护理	(199)
第二十五章	胰腺疾病病人的护理	(202)
第二十六章	外科急腹症病人的护理	(205)
第二十七章	周围血管疾病病人的 护理	(206)
第二十八章	颅内压增高病人的护理	(209)
第二十九章	颅脑损伤病人的护理	(211)
第三十章	常见颅脑疾病病人的护理	(213)
第三十一章	胸部损伤病人的护理	(216)
第三十二章	脓胸病人的护理	(219)
第三十三章	肺部疾病外科治疗病人 的护理	(220)
第三十四章	食管癌病人的护理	(222)
第三十五章	心脏疾病病人的护理	(224)
第三十六章	泌尿、男性生殖系统疾	

病的主要症状和检查 …	(225)
第三十七章 泌尿系损伤病人的护理	(227)
第三十八章 泌尿系结石病人的护理	(231)
第三十九章 泌尿、男生殖系结核病人的护理	(233)
第四十章 泌尿系梗阻病人的护理	(236)
第四十一章 泌尿、男生殖系肿瘤病人的护理	(238)
第四十二章 男性性功能障碍、节育者的护理	(240)
第四十三章 肾上腺疾病外科治疗病人的护理	(241)
第四十四章 骨科病人的一般护理	(243)
第四十五章 骨与关节损伤病人的护理	(247)
第四十六章 骨与关节感染病人的护理	(255)
第四十七章 腰腿痛及颈肩痛病人的护理	(259)
第四十八章 骨肿瘤病人的护理	(263)

第三篇 妇产科护理学

第一章 女性生殖系统的解剖与生理	(267)
第二章 妊娠期妇女的护理	(271)
第三章 分娩期妇女的护理	(276)
第四章 产褥期妇女的护理	(280)
第五章 新生儿保健	(282)
第六章 高危妊娠妇女的护理	(283)
第七章 妊娠期并发症妇女的护理	(284)
第八章 妊娠合并症妇女的护理	(292)
第九章 异常分娩的护理	(296)
第十章 分娩期并发症妇女的护理	(299)

第十一章 产后并发症妇女的护理	(303)
第十二章 遗传咨询与产前诊断	(306)
第十三章 妇科护理病历	(306)
第十四章 女性生殖系统炎症病人的护理	(307)
第十五章 月经失调病人的护理	(312)
第十六章 妊娠滋养细胞疾病病人的护理	(320)
第十七章 妇科恶性肿瘤化疗病人的护理	(323)
第十八章 妇科腹部手术病人的护理	(325)
第十九章 外阴、阴道手术病人的护理	(331)
第二十章 不孕症妇女的护理	(337)
第二十一章 计划生育妇女的护理	(340)
第二十二章 妇女保健	(347)
第二十三章 妇产科常用护理技术	(349)
第二十四章 妇产科诊疗及手术病人的护理	(352)

第四篇 儿科护理学

第一章 绪论	(357)
第二章 生长发育	(357)
第三章 小儿保健	(362)
第四章 小儿营养与喂养	(364)
第五章 小儿心理、用药护理及护理技术	(368)
第六章 新生儿和新生儿疾病患儿的护理	(371)
第七章 营养性疾病患儿的护理	(376)
第八章 消化系统疾病患儿的护理	(380)
第九章 呼吸系统疾病患儿的护理	(385)
第十章 循环系统疾病患儿的护理	(385)

.....	(389)
第十一章 血液系统疾病患儿的护理	(393)
第十二章 泌尿系统疾病患儿的护理	(397)
第十三章 内分泌系统疾病患儿的护理	(401)
第十四章 神经系统疾病患儿的护理	(405)
第十五章 免疫缺陷病和结缔组织病患儿的护理	(407)
第十六章 遗传性疾病患儿的护理	(410)
第十七章 常见传染病患儿的护理	(412)
第十八章 结核病患儿的护理	(417)
第十九章 寄生虫病患儿的护理	(420)
第二十章 急性中毒和常见急症患儿的护理	(421)

第五篇 护理健康教育学

第一章 健康教育与健康促进	(427)
第二章 人类行为与健康相关行为	(428)
第三章 健康传播的方法与技巧	(431)
第四章 健康教育的步骤	(435)
第五章 医院健康教育	(439)

第六篇 医院感染护理学

第一章 绪论	(445)
第二章 医院感染的微生物学原理	(446)
第三章 医院感染监测	(448)
第四章 消毒与灭菌	(450)
第五章 手、皮肤的清洁和消毒	(453)
第六章 医院环境的消毒	(456)
第七章 隔离	(457)

第八章 合理使用抗感染药物	(459)
第九章 医院感染与护理管理	(461)
第十章 特殊病原菌的感染途径及消毒	(463)

第七篇 护理管理学

第一章 绪论	(465)
第二章 管理理论在护理管理中的应用	(465)
第三章 计划工作	(466)
第四章 组织工作	(468)
第五章 护理人力资源管理	(470)
第六章 领导工作	(471)
第七章 组织沟通	(474)
第八章 冲突与协调	(475)
第九章 控制工作	(476)
第十章 护理质量管理	(477)

第八篇 社区护理学

第一章 社区与社区护理	(479)
第二章 社区护理基本理论与方法	(481)
第三章 社区家庭护理	(485)
第四章 社区健康教育	(488)
第五章 社区重点人群保健与护理	(491)
第六章 社区传染病的预防与管理	(494)
第七章 社区急救与护理	(501)
第八章 社区常见慢性病的护理和管理	(510)
第九章 社区常见精神疾病的护理与管理	(518)
第十章 社区康复护理	(522)
第十一章 临终护理	(525)
第十二章 社区护理管理	(527)
第十三章 社区护理研究	(529)

第一篇 内科护理学

第一章 呼吸系统疾病病人的护理

一、A1/A2 型题

1. 下列关于呼吸道的结构和功能的叙述错误的是
 - A. 呼吸道以环状软骨为界分为上、下呼吸道
 - B. 上呼吸道的主要功能是对吸入气体进行加温、湿化和机械阻拦
 - C. 下呼吸道终止于终末细支气管
 - D. 气管于隆凸处分为左、右主支气管
 - E. 黏液纤毛运载系统和咳嗽反射均为上呼吸道的重要防御机制
2. 下列关于左、右主支气管的描述中错误的是
 - A. 气管在隆凸处分为左、右主支气管
 - B. 右主支气管较左主支气管粗、短、直
 - C. 进行气管插管时,若插入过深时易误插入右主支气管
 - D. 异物易吸入左主支气管
 - E. 肺脓肿好发于右肺与右主支气管的结构特点有关
3. 关于肺的功能的描述中错误的是
 - A. 肺的主要功能是进行肺通气和肺换气
 - B. 肺内气体交换主要在肺泡内通过气-血屏障进行
 - C. 浅而快的呼吸效率优于深而慢的呼吸效率
 - D. 呼吸膜面积是影响肺换气的重要因素之一
 - E. 肺通气/血流比值是影响肺换气的重要因素之一
4. 下列关于肺血管的描述错误的是
 - A. 肺有双重血流供应,即肺循环和支气管循环
 - B. 肺循环是一个高压、高阻力循环系统
 - C. 各级支气管和肺营养主要由支气管循环供应
 - D. 肺气体交换功能主要由肺循环执行
 - E. 肺动脉携带静脉血,肺静脉输送动脉血
5. 下列关于胸膜腔的描述错误的是
 - A. 胸膜腔是一个潜在的开放腔隙
 - B. 胸膜腔内持续为负压
 - C. 吸气时胸膜腔内负压增大
 - D. 正常人胸膜腔内也有少量液体起润滑作用
 - E. 胸膜腔内压力是促进胸腔内静脉血和淋巴液回流的重要因素
6. 剧烈咳嗽后突然发生胸痛的原因最可能是
 - A. 肺结核
 - B. 肺脓肿
 - C. 肺癌
 - D. 自发性气胸
 - E. 肺心病
7. 造成急性上呼吸道感染的病原体临床最常见
 - A. 细菌
 - B. 病毒
 - C. 衣原体
 - D. 支原体
 - E. 立克次体
8. 下列关于急性上呼吸道感染的描述错误的是
 - A. 肺有双重血流供应,即肺循环和支气管循环
 - B. 肺循环是一个高压、高阻力循环系统
 - C. 各级支气管和肺营养主要由支气管循环供应
 - D. 肺气体交换功能主要由肺循环执行
 - E. 肺动脉携带静脉血,肺静脉输送动脉血

- A. 成人普通感冒多由细菌感染引起
 - B. 普通感冒主要表现为咽干、喉痒、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞, 一般肺部无干、湿啰音
 - C. 急性细菌性扁桃体炎患者可有高热, 咽部明显充血, 扁桃体肿大、充血, 表面常有黄色点状渗出物
 - D. 感冒患者如出现耳痛、耳鸣、听力减退、外耳道流脓等常提示并发中耳炎
 - E. 受凉、淋浴、过度疲劳常为急性上呼吸道感染的诱因
9. 下列哪项是慢性支气管炎急性发作的最常见原因
 - A. 吸烟
 - B. 感染
 - C. 大气污染
 - D. 气温下降
 - E. 过敏
 10. 支气管哮喘发作时常出现
 - A. 进行性呼吸困难
 - B. 吸气性呼吸困难
 - C. 呼气性呼吸困难
 - D. 夜间阵发性呼吸困难
 - E. 混合性呼吸困难
 11. 引起细菌性咽-扁桃体炎最主要的致病菌为
 - A. 葡萄球菌
 - B. 溶血性链球菌
 - C. 肺炎球菌
 - D. 肺炎杆菌
 - E. 大肠杆菌
 12. 治疗上呼吸道感染的措施, 下列哪项不妥
 - A. 适当休息
 - B. 体温超过 39°C 时物理降温
 - C. 呼吸道隔离, 防止交叉感染
 - D. 多饮水
 - E. 常规应用抗生素治疗
 13. 对于患有消化性溃疡的上呼吸道感染病人, 应禁用
 - A. 感冒清热冲剂
 - B. 阿司匹林
 - C. 金刚烷胺
 - D. 氯苯那敏
 - E. 吗啉胍
 14. 慢性支气管炎最突出的症状是
 - A. 长期反复咳嗽、咳痰
 - B. 反复发热
 - C. 咳大量脓痰
 - D. 反复咯血
 - E. 时有喘息
 15. 慢性支气管炎急性发作期病人的主要治疗是
 - A. 吸氧
 - B. 控制感染
 - C. 解痉、平喘
 - D. 祛痰
 - E. 镇咳
 16. 慢性支气管炎并发阻塞性肺气肿患者, 主要表现为在原有症状基础上又出现
 - A. 反复感染发热
 - B. 反复发绀
 - C. 咳多量脓痰
 - D. 逐渐加重的呼吸困难
 - E. 剧烈咳嗽
 17. 下列关于排痰的措施, 不妥的是
 - A. 多饮水以利于痰液稀释
 - B. 痰多且无力咳痰者应以祛痰为主
 - C. 咳嗽反射减弱或消失的病人应给予机械吸痰
 - D. 为了增加病人的耐受能力, 体位引流应在餐后半小时内进行
 - E. 勤翻身拍背可促进排痰
 18. 下列哪项是 COPD 诊断及病情严重程度评价的客观指标
 - A. 肺功能检查
 - B. 胸部 X 线检查
 - C. 胸部 CT
 - D. 动脉血气分析
 - E. 血常规

19. 阻塞性肺气肿患者胸廓呈
 - A. 漏斗胸
 - B. 鸡胸
 - C. 桶状胸
 - D. 扁平胸
 - E. 一侧胸廓局限性膨隆
20. 肺气肿的主要症状是
 - A. 突然出现的呼吸困难
 - B. 夜间阵发性呼吸困难
 - C. 逐渐加重的呼吸困难, 尤以活动后为著
 - D. 发绀
 - E. 心悸
21. 慢性支气管炎最常见的并发症是
 - A. 支气管扩张
 - B. 阻塞性肺气肿
 - C. 肺脓肿
 - D. 慢性呼吸衰竭
 - E. 支气管肺炎
22. 慢性阻塞性肺气肿最重要的慢性并发症是
 - A. 肺结核
 - B. 自发性气胸
 - C. 肺不张
 - D. 慢性肺源性心脏病
 - E. 肺炎
23. 慢性阻塞性肺气肿最常见的病因是
 - A. 支气管扩张
 - B. 慢性支气管炎
 - C. 支气管哮喘
 - D. 肺尘埃沉着症
 - E. 肺纤维化
24. 慢性阻塞性肺气肿病人最常见的酸碱失衡是
 - A. 代谢性酸中毒
 - B. 呼吸性酸中毒
 - C. 代谢性碱中毒
 - D. 呼吸性碱中毒
 - E. 其他
25. 呼气性呼吸困难的病因最常见的是
 - A. 气管异物
 - B. 大支气管肿瘤
 - C. 大片肺组织实变
 - D. 大量胸腔积液
 - E. 小支气管痉挛
26. 少量咯血, 尤其是持续痰中带血, 常提示
 - A. 支气管哮喘
 - B. 慢性支气管炎
 - C. 肺气肿
 - D. 肺癌
 - E. 心脏病
27. 支气管扩张及肺脓肿病人痰液的典型表现是
 - A. 只有少量黏痰
 - B. 草绿色
 - C. 红棕色胶冻状
 - D. 灰黑色
 - E. 痰液静置后分层现象
28. 大咯血病人发生窒息时, 首要的护理措施是
 - A. 维持气道通畅
 - B. 输血
 - C. 吸氧
 - D. 安慰病人
 - E. 补液
29. 大量咯血是指
 - A. 一次咯血量小于 100ml
 - B. 一次咯血量大于 100ml
 - C. 一次咯血量大于 200ml
 - D. 一次咯血量大于 300ml
 - E. 24 小时咯血量大于 300ml
30. 对于痰液过多且无力咳痰者, 为防止窒息, 护士在翻身前首先应
 - A. 给病人吸氧
 - B. 给病人吸痰
 - C. 指导病人有效咳嗽
 - D. 给病人雾化吸入
 - E. 慢慢移动病人
31. 病人出现下列哪种情况时常提示有厌氧

菌感染

A. 大量脓痰

B. 咳出痰液有恶臭

C. 痰中带血

D. 有持续存在的湿性啰音

E. 咳嗽伴有高热

32. 支气管哮喘长期反复发作, 最常见的并发症是

A. 肺结核

B. 肺癌

C. 阻塞性肺气肿

D. 上呼吸道感染

E. 呼吸衰竭

33. 哮喘的典型症状是

A. 反复发作的吸气性呼吸困难

B. 反复发作的呼气性呼吸困难

C. 一过性混合性呼吸困难

D. 逐渐加重的咳嗽、咳痰

E. 逐渐加重的呼吸困难

34. 对年老、体弱的慢性阻塞性肺气肿患者的治疗不恰当的是

A. 急性发作期以抗感染为主

B. 痰液黏稠者可雾化吸入

C. 剧烈咳嗽者可用强镇咳剂缓解痛苦

D. 病情缓解期可作全身锻炼和呼吸肌锻炼

E. 应给予高蛋白、高维生素饮食

35. 进行腹式呼吸锻炼时, 下列动作中应以纠正的是

A. 吸气时腹部用力挺出

B. 呼气时腹部尽力收缩

C. 深吸快呼

D. 鼻吸口呼

E. 深吸慢呼

36. 慢性支气管炎的特征性临床表现不包括

A. 咳嗽

B. 咳痰

C. 喘息

D. 炎症

E. 呼吸困难

37. 关于支气管哮喘的临床表现特征, 下列哪项不妥

A. 典型发作属呼气性呼吸困难

B. 为发作性疾病, 可自行或用药缓解

C. 发作时伴哮鸣音

D. 常在午间发作或加重

E. 每次发作, 可历时数小时至数天

38. β_2 受体激动剂治疗哮喘时首选的给药方式为

A. 口服

B. 吸入

C. 肌肉注射

D. 静脉滴入

E. 直肠给药

39. 控制哮喘急性发作首选的药物是

A. β_2 受体激动剂

B. 糖皮质激素

C. 抗胆碱能药物

D. 茶碱类

E. 肥大细胞膜稳定剂

40. 当前防治哮喘最有效的抗炎药物是

A. β_2 受体激动剂

B. 糖皮质激素

C. 抗胆碱能药物

D. 茶碱类

E. 肥大细胞膜稳定剂

41. 下列关于氨茶碱的应用描述不正确的是

A. 是中效支气管舒张剂

B. 常用给药途径为肌肉注射

C. 静脉注射应使用葡萄糖液稀释后慢推

D. 速度过快可引起心律失常、头晕、血压下降

E. 浓度过高可引起心脏骤停

42. 下列最适用于慢性支气管炎缓解期的是

A. 口服抗生素预防感染

B. 应用平喘药物

C. 间断吸氧

D. 增强体质, 进行缩唇腹式呼吸

E. 使用祛痰药物

43. 支气管扩张病人咳嗽、咳痰加重时

- 间是
- 早晨起床和晚上卧床时
 - 白天
 - 傍晚
 - 深夜
 - 进餐时
44. 治疗肺炎球菌肺炎, 停用抗生素的指标一般是
- 体温降至正常后 3 天
 - 咳嗽、咳痰症状完全消失
 - 听诊湿啰音完全消失
 - 血白细胞计数恢复正常
 - X 线示炎症阴影完全消失
45. 肺炎最常见的病原体是
- 细菌
 - 病毒
 - 支原体
 - 衣原体
 - 军团菌
46. 治疗肺炎球菌肺炎首选的药物为
- 头孢菌素
 - 林可霉素
 - 链霉素
 - 庆大霉素
 - 青霉素
47. 下列关于肺脓肿的描述, 错误的是
- 吸入性肺脓肿的好发部位与支气管解剖、重力作用有关
 - 典型临床表现为高热、咳嗽, 脓肿破溃后可咳出大量脓痰或脓臭痰
 - 吸入性肺脓肿最常见致病菌为金黄色葡萄球菌, 而血源性肺脓肿则为厌氧菌
 - 抗菌和痰液引流是关键治疗
 - 肺脓肿病人反复感染、大咯血者应考虑手术治疗
48. 除使用抗生素外, 肺脓肿治疗的另一关键措施是
- 卧床休息
 - 补充营养
 - 呼吸功能训练
 - 痰液引流
 - 手术治疗
49. 最有助于诊断肺脓肿的症状是
- 畏寒、高热
 - 呼吸困难
 - 咳嗽、咯血
 - 咳大量脓臭痰
 - 剧烈胸痛
50. 结核病最主要的传播途径是
- 飞沫
 - 尘埃
 - 食物和水
 - 皮肤接触
 - 毛巾或餐具
51. 肺功能检查中哪项是评价气流受限的敏感指标
- 第一秒用力呼气容积占用力肺活量的比值 (FEV_1/FVC)
 - 第一秒用力呼气容积占预计值的百分比 ($FEV_1\%$)
 - 肺活量 (VC)
 - 功能残气量 (FRC)
 - 肺总量
52. 下列关于机械吸引, 错误的是
- 适用于意识不清或排痰困难者
 - 可经口、鼻或人工气道进行负压吸引
 - 每次吸引时间不超过 15 分钟
 - 两次抽吸间隔时间大于 3 分钟
 - 吸痰前、后应提高吸入氧浓度
53. 下列关于气道湿化的描述错误的是
- 适用于痰液黏稠、不易咳出的病人
 - 温度不可过高, 一般在 $35\sim 37^\circ\text{C}$
 - 应尽可能延长湿化时间, 以达到良好的湿化效果
 - 湿化装置应定期消毒
 - 湿化后应帮助病人及时排痰
54. 下列关于哮喘的临床表现错误的是
- 为呼气性呼吸困难

- B. 呈发作性
C. 用支气管舒张药或自行缓解
D. 在夜间及凌晨发作或加重
E. 发作时均伴有哮鸣音
55. 支气管哮喘发作伴窦性心动过速, 哪项治疗是错误的
A. 鼻导管吸氧
B. 普萘洛尔口服
C. 沙丁胺醇吸入
D. 异丙托溴铵吸入
E. 地塞米松静脉注射
56. 支气管扩张症最有意义的体征是
A. 贫血貌
B. 杵状指
C. 局限性哮鸣音
D. 局限性湿啰音
E. 消瘦
57. 慢性肺心病机制中, 导致肺动脉高压形成的最主要因素
A. 缺氧
B. 毛细血管网损毁或闭塞
C. 水钠潴留, 血容量增多
D. 继发性红细胞增多, 血液黏稠度增加
E. 肺小动脉炎
58. 肺心病心力衰竭可出现以下常见症状和体征, 除了
A. 水肿
B. 尿少
C. 颈静脉充盈
D. 咳粉红色泡沫痰
E. 肝肿大及压痛
59. 下列何种血气分析变化属于 I 型呼吸衰竭
A. $\text{PaO}_2 65\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 40\text{mmHg}$
B. $\text{PaO}_2 55\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 45\text{mmHg}$
C. $\text{PaO}_2 50\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 60\text{mmHg}$
D. $\text{PaO}_2 85\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 55\text{mmHg}$
E. $\text{PaO}_2 75\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 30\text{mmHg}$
60. 夜班护士发现一个支气管扩张症病人咯血约 200ml 后突然中断, 呼吸极度困难, 喉部有痰鸣音, 表情恐怖, 两手乱抓, 首先要做的是
A. 立即通知医师
B. 立即气管插管
C. 清除呼吸道积血
D. 给予氧气吸入
E. 应用呼吸兴奋剂
61. 应用体位引流时, 护士应该根据受侵的部位安置病人体位。引流左上叶尖端时, 应指示病人
A. 向左侧卧位, 在枕上稍向前方
B. 仰卧, 枕垫放在髋部下
C. 向右侧卧位, 枕垫放在髋部下, 头部充分伸展
D. 坐在椅子上, 靠向右侧
E. 坐在椅子上, 背靠枕垫
62. 王女士, 26 岁, 患支气管扩张症 10 年, 间断咳嗽、咳脓痰, 痰量 40ml/d, 下列哪项治疗措施错误
A. 长期应用抗生素
B. 体位引流
C. 免疫治疗
D. 体育锻炼
E. 生理盐水雾化吸入
63. 李先生, 41 岁, 反复咳脓痰伴间断少量咯血 20 年, 大咯血 3 天来诊。体检: 右下肺可闻及固定湿啰音, 有杵状指。胸片示右下肺纹理增粗, 可见卷发影。诊断首先考虑
A. 肺结核
B. 支气管扩张症
C. 慢性肺脓肿
D. 慢性支气管炎
E. 肺气肿
64. 某肺炎患者, 71 岁, 体质较弱, 虽经抗感染及一般对症治疗, 但没有明显好转, 为防止病情恶化, 应特别注意观察
A. 体温变化
B. 血压变化
C. 呼吸系统症状变化

- D. 肺部体征变化
E. 血液白细胞变化
65. 患者, 女性, 40岁, 诊断哮喘5年, 近来每当给爱犬洗澡后即出现咳嗽、咳痰伴喘息发作, 护士为其进行健康教育时应指出其可能的过敏原是
- A. 花粉
B. 尘螨
C. 狗毛
D. 病毒感染
E. 细菌感染
66. 患者, 女性, 68岁, 有慢性咳嗽史15年, 今日感冒后病情加重, 夜间咳嗽频繁, 痰量多。查体: 神清, 口唇轻度发绀, 桶状胸, 双肺叩诊过清音, 呼吸音低, 动脉血气分析: PaO_2 85mmHg, PaCO_2 45mmHg, 经治疗后病情缓解, 此病人在家休息时最重要的措施是
- A. 做腹式呼吸, 加强膈肌运动
B. 避免吸入有害气体
C. 保持室内清洁无尘
D. 长期家庭氧疗
E. 长期服用抗生素以预防感染
67. 一老年患者以肺气肿、Ⅱ型呼吸衰竭收入院, 入院第一天晚上, 因咳嗽、痰多、呼吸困难, 并对医院环境不适应而不能入睡, 不正确的护理措施是
- A. 给镇咳和镇静药, 帮助入睡
B. 减少夜间操作, 保证病人睡眠
C. 给低流量持续吸氧
D. 减少白天睡眠时间和次数
E. 和病人一同制定白天活动计划
68. 男性, 50岁, 发热, 咳嗽, 胸痛, 呼吸急促, 可疑急性脓胸, 最有确诊意义的是
- A. 胸痛
B. 肋间饱满
C. 呼吸音减弱
D. 胸片大片阴影
E. 胸穿抽出脓液
69. 王女士因肺结核在家疗养, 但痰中有结核菌, 最简便有效的处理痰的方法是
- A. 煮沸
B. 深埋
C. 焚烧
D. 酒精浸泡
E. 消毒灵浸泡
70. 男性, 40岁, 因寒战、高热、咳嗽、胸痛, 来院急诊。胸透右上肺有云絮状阴影。查痰肺炎球菌(十), 该病人血象最可能的改变是
- A. 嗜酸性粒细胞增加
B. 淋巴细胞增加
C. 中性粒细胞增加
D. 大单核细胞增加
E. 嗜碱性粒细胞增加
71. 患者, 男性, 60岁, 诊断慢性支气管炎并发肺气肿10余年, 近1周来咳嗽加剧, 咳黄黏痰, 有明显呼吸困难, 发绀明显, 护士为病人进行氧疗时, 以下给氧方式正确的是
- A. 鼻导管间断给氧 5L/min 以上
B. 鼻导管持续给氧 1L/min
C. 30%酒精湿化给氧
D. 持续面罩给氧 4L/min
E. 鼻导管间歇给氧 1L/min
72. 某人原有慢性阻塞性肺疾病, 呼吸困难, 发绀, 近日咳嗽加剧, 突然发生右侧胸痛, 约30分钟后呼吸困难突然加剧, 患侧胸壁叩呈鼓音, 听诊呼吸音消失。该变化是
- A. 自发性气胸
B. 肋间神经痛
C. 膈下脓肿
D. 腹水
E. 肋骨骨折
73. 某肺心病患者近3日来呼吸困难加重, 血气分析示 PaO_2 52mmHg, PaCO_2 67mmHg, 此时给氧宜采用
- A. 间歇给氧

- B. 酒精湿化给氧
C. 低浓度持续给氧
D. 高压给氧
E. 高浓度持续给氧
74. 王女士, 29岁, 患支气管扩张症10年, 咳嗽, 咳脓性痰, 痰量50ml/d, 下列处理不当的是
A. 体位引流
B. 加强营养
C. 长期应用抗生素
D. 给予祛痰剂
E. 给予雾化吸入
75. 周女士, 诊为慢性呼吸衰竭, 近日咳嗽、咳痰、气促明显, 又出现神志不清、发绀、多汗, 血气分析 PaO_2 50mmHg, PaCO_2 62mmHg, 应给予患者
A. 高浓度、高流量持续吸氧
B. 高浓度、高流量间歇给氧
C. 低浓度、低流量持续吸氧
D. 低浓度、低流量间歇吸氧
E. 酒精湿化给氧
76. 患者, 男性, 68岁, 因近日咳嗽、咳痰、气促明显, 后又出现神志不清、发绀而入院。既往有肺气肿病史。动脉血气分析 pH 7.31, PaO_2 52mmHg, PaCO_2 61mmHg, 该病人目前最可能出现的是
A. 肺心病
B. 肺炎
C. 左心衰竭 (简称左心衰)
D. 呼吸衰竭
E. 肺癌
77. 患者, 女性, 25岁, 近2个月来轻度咳嗽, 咳白色黏痰, 内带血丝; 午后低热, 面颊潮红, 疲乏无力, 常有心悸、盗汗, 较前消瘦。经X线摄片检查, 发现右上肺第2肋部位有云雾状阴影, 无透光区。痰菌3次检验阴性, 你认为下列哪项护理措施不必要
A. 住院隔离治疗
B. 给予高热量、高维生素、高蛋白饮食
C. 按医嘱给予抗结核药物治疗, 观察药物不良反应
D. 室内开窗通风
E. 做好保健指导
78. 男性, 35岁, 平素体健。4天前淋雨, 2天前突然高热 40°C , 伴寒战, 咳铁锈色痰伴呼吸困难, 胸片示右下肺大片密度均匀的实变影。该患者最可能的诊断是
A. 结核性胸膜炎
B. 大肠杆菌肺炎
C. 支原体肺炎
D. 肺炎球菌肺炎
E. 军团菌肺炎
79. 患者, 女性, 15岁, 学生。发热 37.5°C , 伴干咳4天来诊。冷凝集试验1:64。胸片示左下肺片状影。治疗首选的抗生素为
A. 青霉素
B. 红霉素
C. 阿米卡星
D. 头孢唑啉
E. 氯霉素
80. 赵女士, 36岁, 低热、乏力、盗汗2个月, 加重伴咳嗽、咳痰1周。胸片示左肺上叶尖段片状模糊影伴空洞形成。体检: 左锁骨上咳嗽后闻及湿啰音。以下最有意义的检查是
A. 末梢血细胞计数
B. 痰抗酸染色
C. 肺功能检查
D. 纤维支气管镜检
E. 血气分析
81. 患者, 女性, 72岁, 间断咳嗽、咳痰20年, 活动后气短4年, 加重1周入院。查体: 神清, 双肺散在湿啰音, HR 120次/分, 律齐。肝肋下3cm, 双下肢水肿。血常规示 WBC $12 \times 10^9/\text{L}$,

中性粒细胞 80%。对该患者最重要的治疗措施是

- A. 给利尿剂, 消除水肿
- B. 给呼吸兴奋剂, 改善呼吸功能
- C. 止咳、祛痰
- D. 积极抗感染
- E. 给支气管扩张剂

二、A3/A4 型题

(1~2 题共用题干)

患者, 男性, 28 岁, 自感低热、乏力、食欲不振, 有盗汗、体重下降、呼吸困难、胸痛等表现, 就医诊断为浸润型肺结核, 收入院抗结核治疗。

1. 入院后应采用的隔离种类为
 - A. 严密隔离
 - B. 消化道隔离
 - C. 保护性隔离
 - D. 接触性隔离
 - E. 呼吸道隔离
2. 关于疾病防治及护理措施不妥的是
 - A. 病人痰液用 20% 漂白粉溶液搅拌静置 2 小时后倒掉
 - B. 护士在病室里不密切接触病人时, 可不戴口罩
 - C. 病室每日用紫外线照射进行空气消毒
 - D. 病室通向走廊的窗子需关闭
 - E. 给予异烟肼、链霉素治疗

(3~5 题共用题干)

患者, 男性, 70 岁, 有慢性阻塞性肺气肿病史。咳嗽、脓痰伴气急加重 2 周, 今晨神志恍惚, 体检: 嗜睡, 口唇发绀, 两肺湿啰音, 心率 116 次/分, 血压 185/105mmHg。

3. 最可能的诊断是
 - A. 急性左心衰
 - B. 脑血管意外
 - C. 右心衰竭
 - D. 呼吸衰竭
 - E. 高血压危象

4. 为明确诊断还需作哪项检查

- A. CT
- B. 心电图
- C. 动脉血气分析
- D. 脑电图
- E. 肾动脉造影

5. 此时最主要的治疗在于

- A. 用降压药
- B. 使用抗生素
- C. 去除诱因
- D. 纠正缺氧和二氧化碳潴留
- E. 用利尿剂

(6~9 题共用题干)

患者, 女性, 28 岁, 咳嗽两个月, 干咳为主, 有午后低热, 月经不规律。胸片示右上肺淡片状阴影。为进行诊断, 进行了 PPD 试验。

6. 关于 PPD 结果的判断, 下列哪项是正确的
 - A. 硬结直径 $\leq 5\text{mm}$ 为阳性
 - B. 硬结直径 $\geq 5\text{mm}$ 为阳性
 - C. 硬结直径 $\leq 10\text{mm}$ 为阳性
 - D. 硬结直径 $\geq 10\text{mm}$ 为阳性
 - E. 局部有水泡为阳性
7. 患者今上午突然咯鲜血 400ml, 该患者目前危及生命的护理问题是
 - A. 气体交换受损
 - B. 营养失调
 - C. 知识缺乏
 - D. 潜在并发症: 窒息
 - E. 潜在并发症: 休克
8. 首要的抢救措施
 - A. 高流量吸氧
 - B. 输血
 - C. 清理呼吸道, 保持呼吸道通畅
 - D. 给予镇静药
 - E. 使用止血药物
9. 一般情况下, 大咯血时首选的药物是
 - A. 可待因