

周氏醫學鼓書

周氏醫學鼓書

PDG

評點葉案存眞類編卷下

古吳葉桂天士甫著 皖南建德周學海澂之類評

元孫萬青輯錄

溫熱

冬溫春溫伏氣
新感挾虛挾飲

冬溫爲病。乃正氣不能藏固。熱氣自裏而發。齒板舌乾。脣燥。目微紅。面油亮。語言不爽。呼吸似喘。邪伏少陰。病發三焦。皆受。仲景謂發熱而渴者爲溫病。明示後人。寒外鬱。則不渴。飲熱內發。斯必渴耳。治法清熱存陰。勿令邪熱焚劫津液。致癰癰厥。神昏譫狂。諸症。故仲景復申治療法云。一逆尙引日。再逆促命期。且忌汗。忌下。忌辛溫。九日不解。議清膈熱。

飛滑石 連翹 淡黃芩 鬱金汁 竹葉心

天花粉 橘紅 苦杏仁

朱先生勞倦嗔怒。是七情內傷。而溫邪感觸。氣從口鼻。直自膜原中道。蓋傷寒陽症。邪自太陽。次第傳及。至于春溫夏熱。則鼻受氣。肺受病。口入之氣。竟由脛中。所以原有手經見症。不比傷寒足六經之病也。其原不同。治法亦異。仲景論溫邪不可發汗。汗則劫津傷陽。身必灼熱。一逆尙引日。再逆促命期。又云。鼻息鼾。語言難出。劇則驚癇癰癰。無非重劫津液所致。今病發熱。原不是太陽客邪見症。所投羌防辛溫表汗。此誤。卽爲逆矣。上竅不納。下竅不便。亦屬常事。必以攻

鮮不見此。張皇失措。

下希圖泄熱。

時醫通弊。亦或暫效。病家信之。遂致於死。○攻下原可泄熱。必須邪熱入在腸

胃。堅實有形。不得但據下竅不便。便

謂陽明已實。蓋氣結津傷。有如此者。殊不知強汗劫

津而傷陽。妄下劫液。更亡陰。頃診脉。兩手如搖而戰。

舌乾燥而無胎。前板齒乾。目欲瞑。口欲開。周身燈照。

而淡晦。斑紋隱隱約約。幾日來。時有呃逆。傷寒絕穀

俗例可。振。作。備。者。其。無。後。乎。

氣而中空。肝陽衝突上冒。肆虐耳。爲今返正。先與糜

粥。使胃中得濡。厥陽不致上冒。而神昏之累可已。進

藥之理。甘溫可以生津除熱。卽斑疹亦不足慮。觀仲

景論中。邪少虛多。陰液陽津並涸者。復脉湯主之。謹

倣此義。

風寒久鬱化熱。皆爲癰疹。況本溫病。誤用辛溫耗津。但生津開鬱。逐穢透表。邪得宣泄。疹

自退矣。斑疹不足慮。眞卓識也。

炙甘草 人參 生地 白芍 阿膠 麥冬 方

宜加龍蟬。仿救逆意。爲有瘕也。

五十七歲。豐腴體質。適值過勞。陽氣受傷。嘔吐食物。無

無。表。證。

頭痛身熱。已非外感風寒。而間日煩躁渴飲。唇焦舌

黑。是內伏熱氣。由募原以流布三焦。亦如瘧邪分爭

營衛者然。然有年積勞既久。伏邪客病本輕。脉小緩

按之不爲鼓擊。可爲徵驗。且二便頗通。略能納穀焉。

未。入。下。焦。

有停滯積聚。仲景於瘧熱無寒之條。不出藥方。但曰

以飲食消息。後賢參聖意。甘寒以養胃陰。其熱自解。

要知表散之辛溫。消滯之苦溫。以及苦寒沈降。多犯

聖訓戒律矣。

此卽溫瘧。

鮮生地 甜杏仁 麥冬 花粉 竹葉心

青蔗汁

連翹

據證是有瘀血凝痰。停於胃中。方味少活血之品。恐未能效。可加桃

仁茜草焦查青皮。

勞倦伏邪。初起卽用柴胡紫蘇三陽混散。津液被劫。熱邪上結。胸中懊懣。神煩譫語。渴欲冷飲。診得脉無神。舌色白。病在上焦。氣分。閱醫藥不分上下氣血。況冬溫氣泄。老人積勞。七日未見病退機關。此屬重症。豈可藐視輕談。

○瓜萸皮 黑梔子 白杏仁 鬱金 香豉

枳殼汁

生津通表。疏泄胸中結氣。恐力小未能勝任。然方却甚靈巧。老人真氣虛。最怕中焦

實結。攻補棘手。遂成不治。是以病在上焦。方中已兼清中焦矣。

汪天植 脉數如浮。重按無力。發熱自利。神識煩倦。咳
嗆痰聲如嘶。渴喜熱飲。此非足三陽實熱之症。乃體
屬陰虛。冬月失藏。久伏寒邪。已經蘊遏化熱。春令陽
升。伏邪隨氣發泄而病未及。一旬即現虛靡不振之
象。因津液先暗耗於未病時也。今宗春溫下利治。

淡黃芩

杏仁

枳壳

白芍

鬱金汁

橘紅

積勞伏熱。值初冬溫暖。天地氣不收降。伏邪因之而發。
是為冬溫。實非暴感。表散無謂。其痰喘氣促。左脇刺
痛。係身中左升不已。右降失職。高年五液已衰。炎上
之威莫制。脉現左細右搏。尤屬陰氣先傷。煩勞兼以
嗔怒。亦主七情動陽。從來內傷兼症。不與外感同法。

苦辛劫燥胃津。陰液日就枯槁。故仲景凡於老人虛

體。必以甘藥調之。夫喘咳之來。固是肺熱。以診脉面

肺管更窒矣

凡咳多是新感

若清肺熱

色論之。爲下虛。正氣不主攝納。腎病何疑。卽初起熱

氣妄泄少陰不合

利。亦是陰不固。擬用復脉湯。

此用復脉不及朱案貼切

炙甘草 細生地 炒麥冬 生白芍 麻仁

蔗漿

溫邪兼勞倦。從內傷治。已獲小效。獨左脇痛難轉側。咳

前方少疏飲之品

嗽。氣觸必加閃痛。想因平素操持。肝陽易熾。營陰暗

耗。非肝陽也。乃肝陰鬱結也。陽熾者必頭顱眩暈。腦

額空脹。孔竅乾搶也。近日皆誤以肝陰爲肝陽。桑

菊芩膽。日日澆灌。愈澆愈鬱。將眞火悶熄而死。仍諉

肝陽莫制。可慨也。凡飲食勞倦所傷。中樞不運。則清

陽不升。濁陰上逆。內經以肝爲將軍之官。謀慮出焉。

東垣眞識高千古。

故身中左升之氣屬肝主之。右降之氣屬肺主之。今面微赤而咳頻。前此上焦畏熱煩燥。其左升之令不已。右降之氣失司。已經洞悉。經以左右爲陰陽之道。路升降周行。一日夜行五十度。平旦交會於氣口。旣爲拂逆情志而裏氣鬱遏。冷熱外加。營衛因之窒阻。此陰陽道路流行。或遲或速。無平旦清明之氣。是以發散消導清火利痰之品。昧於身中轉旋。有若天地也。再論平昔精力頗健。今已大年。下焦先虛。夫下虛者。上必實眩暈神昏。自利可見矣。以冬令藏聚返根之候。見症若是。爲忽然中厥。亦屬常有。此投藥之難。此亦痰、閉、若氣、離、根、非、常有矣自宜瞻前顧後。議用錢氏地黃湯意。栽培三陰臟陰。

疎其三陽腑陽。俾臟主藏。府主通。佐以鹹降理逆。穀味有加。再爲進商可也。

○熟地 白芍 山藥 澤瀉 丹皮 茯苓

牡蠣 阿膠

山塘 七十五 立冬未冷。溫熱之氣外入。引動宿飲。始而

狀如傷風。稀痰數日。繼則痰濃咽乾。是少陰脉中。乏

津上承。五液盡化痰涎。皆因下虛。易受冷熱。是以飲

邪上泛。老年咳嗽。大要宜調脾腎。最忌發散。泄肺理

嗽。暫用越婢法。

麻黃 石膏 甘草 芍藥 生薑 大棗

章 暴冷。外加熱氣。內鬱肺室不降。脘悶如饑。水飲欲

嘔頭痛寒熱當治上焦

案語簡切。

桔梗 象貝 橘紅 兜鈴 北沙參 杏仁

吳風溫上受飲邪上泛臥枕則欬甚飲陰類也。先以輕揚肅上再議理飲。

桔梗 兜鈴 米仁 茯苓 通草 象貝

急火煎服一次

又案 輕可去實。恰當上受風溫。但左脇引動而咳甚。經言左升太過。右降不及。然非肝木之有餘。雨水春木萌動氣升上衝。皆血液之少。不主配偶之義。

甜杏仁 玉竹 甘草 桃仁 炒麻仁

冬溫咳嗽。忽值暴冷。外寒內熱。引動宿痰。伏飲。夜臥氣

沖欲坐。喉咽氣息有聲。宜煖護安居。從痰飲門越婢法。

○麻黃。甘草。石膏。生薑。大棗。外寒內熱治法

王廷佑 寒包鬱熱亦屬溫邪。

○桔梗。大力。連翹。蘇子。滑石。枳殼。

赤芍。木通。

溫邪有升無降。經腑氣機交逆。營衛失其常度。為寒熱。是有△新△感△

津液日耗。渴飲不饑。陽氣獨行。則頭痛面赤。是皆冬

春驟煖。天地失藏。人身應之。患此者最多。攷古人治

溫病忌表散誤投。即謂劫津逆傳。心包最怕神昏譫

語妄狂。治法以辛甘涼潤為主。蓋傷寒入足經。溫邪

入手經也。上潤則肺降。不致膈鬱。胃熱下移。知饑渴解矣。

嫩竹葉 桑葉 杏仁 蔗汁 麥冬 生甘草

石膏

水淨
糖炒

陳診脉左帶微數。右關微弦。胸脘痞悶。右眼角赤。皆是肝木乘坤土。經旨有腎藏志。脾藏意。今夢寐驚惕。是見不藏之象。倘調養失宜。內有七情之擾。外有六淫之侮。再經反覆。藥餌無過樹根草皮。焉能有濟。故重言以申其說。脉證皆痰氣固結之象。但燥痰是虛燥。滯結宜生津以滑之。不宜辛熱。淡滲以燥之。

人參 半夏 枳實 茯苓 乾薑 小川連

第二案 六脉略和。舌胎已退。胸脘稍寬。渴飲至胃。微覺呆滯。大便乾燥。勢見陰枯。陽結通陽之中。佐以潤燥。亦屬至理。至於調養靜攝工夫。不必再贅。

柏子仁 菰蓉 歸鬚 炒桃仁 塊苓 桂心

菰蓉大礙通陽。下四方不離此味。只因腎燥便艱。何不選用甘滑辛潤。而必須鹹潤耶。

第三案 立夏日診。脉氣和。病情減。清晨微覺氣悶。陽氣尙未全振。再論人身中陰陽二氣。每相眷顧。陽病久必傷陰。陰病久必傷陽。故病久之體。調養失慎。必至反覆。諄諄至囑。進苓桂朮甘湯。以宣上。鬲之陽。

第四案 年過五旬。腎氣本弱。病纏日久。脾土亦餒。腎惡燥。脾惡濕。經旨昭昭。若欲平穩。宜乎分治爲安。是

將來調補九藥章旨。今上帛已寬。且進下焦調補爲法。

蓰蓉 歸身 杞子 茯神 小茴 柏仁

歸身

杞子

茯神

小茴

柏仁

天冬 巴戟 牛膝 菴蓉 最傷心陽最助脾溼。歷驗之矣。

巴戟

牛膝

從蓉最傷心陽最助脾溼。歷驗之矣。

第五案 病減六七。惟納食不易運化。飲湯不易下趨。口中味淡時。或作酸。大便秘艱。乃脾陽不振。腎陰未復。故潤劑之中。佐以辛香。有合經旨。辛甘化風之意。

病減

六七惟

食不

運動化

飲湯不

下趨

口中味淡時或作酸大便燥艱乃脾陽不振腎陰未復故潤劑之中佐以辛香有合經旨辛甘化風之意

柏仁 小茴 蕤蓉 車前 茯苓 牛膝

小荷

從蓉

車前

茯苓

牛膝

歸身桂心

桂心

第六案

脉神

大安大

艱澇

爽臍

隱隱

痛高

年腎陰暗虧血液不能灌溉四旁腸中枯燥更衣頗

覺費力擬進通幽湯方法以潤之

臍間隱痛是痰凝是上前酸潤藥所

致方中宜加桃仁山查。

歸鬚 紅花 郁李仁 柏仁 麻仁 生地

升麻

去。賊。潤。反。更。衣。矣。其。理。顯。然。

第七案 兩日連次更衣臍間疼痛已止胸膈之間略

覺不和則知病纏日久不獨血液受虧氣分亦爲之不振擬溫填藥餌佐以通陽庶幾中下兩顧

菴蓉 塊苓 杞子 小茴 柏仁 牛膝

人參 巴戟

范升九 四肢作冷自利未已目黃稍退而神倦不語

濕邪內伏足太陰之氣不運經言脾竅在舌邪滯竅

必少靈以致語言欲蹇法當分利佐辛香以默運坤

陽是太陰裏症治法

是溼溫治法

生於朮 草果仁 厚樸 木瓜 茯苓 澤瀉

第二案 身體稍稍轉動語蹇神呆猶氣機未爲靈轉色脉非是有餘而濕爲陰邪不徒偏寒偏熱已也

生於朮 石菖蒲汁 鬱金 茯苓 遠志

米仁

第三案 濕滯於中氣蒸於上失降不得寐口起白疳仍不渴飲開上鬱佐中運利腸間亦是宣通三焦也

生於朮 寒水石 米仁 桔梗 廣皮 猪苓

澤瀉

滲藥宜少用不渴飲者溼之結也運中開上便可祛之起白疳者熱之結也滲利太過