

第三册

類中風病案  
霍亂病案

虛勞病案  
神經病案

全圖

名醫驗案類編

正編

上海大東書局印行

當國全代

# 名醫驗案類編續編目錄

## 二集 雜病案

### 第七卷 類中風病案

痰厥危症案.....尹性初

中風脫症案.....尹性初

傷風變爲陽厥案.....尹性初

風瘡案.....蘇致堅

中風案.....朱阜山

孕婦瘡厥案.....尹性初

食厥壞證案.....顧振呼

瘡病案.....莊雲廬

痰癬痼疾案	尹性初
痰厥案	尹性初
眩暈案	尹性初
熱夾驚痙案	李達三
燥痙案	錢存濟
暴中風痰案	吳介誠
時疫霍亂案	劉厚崑
產後血虧案	蔡世信
勞傷過度案	蔡世信
卒中痿厥案	李子郁
寒痙案	李達三
濕痰驚搐案	陳保安

暑厥案.....王玉玲

風痙案.....蔡菊農

剛痙案.....葛蔚堂

暑溫夾積中毒案.....錢存濟

停食痛厥案.....龔正修

此为试读,需要完整PDF请访问: [www.ertongbo.com](http://www.ertongbo.com)

當代

# 全國名醫驗案類編續編

## 一集 雜病案

### 第七卷 類中風

#### ○痰厥危症案

尹性初湖北武昌

【病者】坊者魏祥泰之弟年近三十住大朝街南

【病名】痰厥危症

【原因】清晨解衣做工傷風而發。

【症候】僵臥不省人事痰築聲吼手足厥冷。

【診斷】六脈緊數有力審係飽食傷風痰氣卒閉之實症也。

【療法】閉者通之高者越之先用麝香通關等藥開其壅閉再用麻桂發表以

祛腠理之邪。硝黃降逆。以通下焦之氣。南星礞石。半夏。生薑。以墜壅滯之痰。乾薑。蒼朮。以行上泛之水。用細辛引導諸藥。而速奏其效也。  
【處方】先用生薑切破。醮沸水。將肺腧二穴。尺澤委中穴。推現紫色。以疏通氣血。

麝香

二釐

牙皂末

五分

細辛末

五分

明礬

五分

生薑汁少許。微煎灌之。須臾吐痰碗許。病勢大減。

麻黃

一錢

桂枝

一錢

膽南星

二錢

青礞石

二錢

半夏

三錢

細辛

五分

生薑

一錢

蒼朮

三錢

乾薑

五分

大黃

三錢

芒硝

四錢

水煎服

【次診】進一劑。瀉動數次。諸症悉除。再擬方調氣和中。

【次方】焦冬朮

三錢

黃芩

二錢

瓜萎仁

三錢

半夏

二錢

陳皮

二錢

茯苓

三錢

砂仁

八分

甘草

五分

【效果】進三劑卽復常度。此係少年壯盛風痰暴病。若年老氣虛人。又當審慎用之。

遠按同一猝倒而虛實迥異。此症全在脈實上認確。便可大膽施治。用藥亦極有次第。惟次方芩尤呆滯。尙須斟酌耳。

### ○中風脫症案

【病者】吳幹丞。年四十七。武昌總商會會長。住漢口德租界。

【病名】中風脫症。

【原因】體質原屬水盛氣虛。壬戌曾患氣脫症。經余治愈。越七年己巳正月十五日開會閱卷。勞神過度。又見脫症。

【症候】一起筆忽落地。不識人舌瘡不能言。右手足廢不能舉。口舌右斜。右半身汗出發熱。煩燥不寧。脫帽掀衣。呵欠不絕口。

【診斷】脈浮大而虛。按之無力。舌上白苔滑。此寒也。寒盛不能蒸動。水源以化。

尹性初  
湖北

氣則水盛而氣虛。過勞則氣傷而氣愈虛。不能灌注右旁。故右手足不仁。少陰脈係舌本。少陰氣厥不至。故舌瘡不能言。君火不明。元氣不能上達於腦。故不識人。虛陽外越。故有汗出等症也。

【療法】急當溫補元陽。切不可用風藥散氣。潤藥滯氣。

【處方】生黃耆

四兩

吉人參

五錢

炮附塊

二兩

乾薑

五錢

綠水桂

五分

【次診】進二劑汗收。神清。卽無煩燥之象。脈漸沉小。元氣漸回。能平臥。以牛肉汁調薄粥與食。每進半碗。惟審氣虛。則不能運送血液。而血必滯。故於溫補藥中。稍佐紅花。以行血。

【次方】生黃耆

四兩

高麗參

一兩

焦冬朮

一兩

炮附塊

一兩

均薑

三錢

綠水桂

三分

藏紅花

五分

水煎服

【三診】進六劑。口舌漸正。欲言間能成一二字。所開方案。必自閱過。初起小洩。

日夜八九次。今止三四次。惟大便八日未行。亦無所苦。乃於溫補藥中。佐以導滯潤腸之品。

【三方】生黃耆

二兩

高麗參

八錢

焦冬朮

一兩

炮附塊

一兩

巴戟天

六錢

遠志肉

一錢

石菖蒲

一錢

乾薑

一錢

關鹿茸

一錢

肉蓯蓉

四錢

杭白芍

三錢

水煎服

【四方】米炒黃耆

三兩

高麗參

一兩

關鹿茸

一錢

炮附塊

八錢

焦冬朮

二兩

戈半夏

一錢

化橘紅

一錢

熟地

四錢

肉蓯蓉

三錢

【五診】進六劑。語言自如。飲食漸增。顏色已復原狀。惟大便日行二次。即將熟

地。蓀蓉減去。以免滑腸。於溫補藥中略加白芍牡蠣。取治寒以熱涼而

行之之義。令其多服調理。

【五方】米炒黃耆 三兩 高麗參 一兩 炮附塊 六錢 乾 薑 一錢

蘇半夏 三錢 廣陳皮 二錢 巴戟天 六錢 牡 蠕 三錢

白 苓 二錢 龍眼肉 十枚 紅 棗 十枚 水煎服

【效果】調理兩月漸能扶杖緩步。此寒風脫症十難救。一大法宜溫固氣脫大補元陽。以闢乾坤而揭日月。即導滯化痰之品亦宜少用。若認作風治雜以風藥或用消導。未有不危殆立見者。其戚左君仁親言。第三日曾服某方。內雜天麻鈎藤等風藥一次。神又不清。第五日服西醫下劑。此時陰縮。皆急煎余方連進。始脫於危。其明徵也。附錄於此。俾臨症者知審擇焉。

遠按斯病斯治原屬正當。惟病家或戚好中之知醫者。如必欲雜以風藥以顧標。則防風尙可酌用。蓋醫者對於病家及患者戚好之意見。宜酌量

採納若嚴厲拒絕不稍假以詞色亦足誤事書此以爲醫者告

●傷風變爲陽厥案

尹性初湖北武昌

【病者】唐內親家劉夫人年近四十住武昌昌明鄉

【病名】傷風變爲陽厥

【原因】體瘦血虛素多熱疾感風而發

【症候】手足突伸齒齶口噤身體強直不省人事惡寒戰慄手微握者片時卽閉目僵臥兩顴發赤目窠色青遍身厥冷胸前微溫不大便二日與飲尙能嚥下小便尙利

【診斷】脈沉遲而微重按則無審係陽氣怫鬱於內不能營運於外則爲陽厥而似陰症陽實脈應數實今反沉遲而微津液傷而營衛之行不利也兩顴發赤肝火上擾也目窠發青肝陰已傷也強直齒齶口噤熱甚灼筋勁切者燥金之象風木爲病反見燥金之化也惡寒戰慄乃心火亢

甚而戰。兼水化制之。故寒慄也。大便祕。風熱內結也。閉目不語。肺金主聲。心火乘肺金。而神濁氣鬱也。惟幸小便尙利。津液未亡。爲可治。【療法】仲聖治身冷脈遲。有大承氣湯法。治筋強欲作痙。有竹葉湯法。乃本其旨。用大承氣湯瀉陽明之燥氣。而救津液。清少陰之熱氣。而復元陰。加防風葛根。以宣通怫鬱。而祛經絡之邪。酒芩以平少陽之火。桔梗以開提肺氣。歸芍養血。以榮筋。白朮燠土。以制火。炮附子以引陽歸根。

【處方】

防 風

二錢  
五分

葛 根

三錢

酒子芩

二錢

桔 梗

二錢

厚 樸

二錢

枳 實

三錢

當 归

二錢

白 苓

二錢

白 朮

二錢

炮附塊

二錢

大 黃

三錢

芒 硝

四錢

水煎服

先推拿委中曲池風府。以疏通氣血。而使筋脈柔和。口齒卽鬆。

【次診】進一劑。導動三次。身溫脈出。神清能言。爲裏熱除。而陰陽和也。再以竹

葉石膏湯去粳米。加生地地骨皮。以清餘熱。而養陰液。

【次方】竹葉

三錢

麥冬

三錢

黨參

三錢

生石膏

三錢

半夏

二錢

生地

三錢

地骨皮

三錢

生甘草

一錢

【三診】連進二劑食糜粥兩次。六脈漸平勻。惟頭微悶。心微慌。乃以四物湯養血。加梔子丹皮涼血而解虛煩。菊花薄荷變暴風爲和風。茯苓砂仁甘草以調和胃氣。

【三方】川芎

二錢

菊花

二錢

薄荷

一錢

當歸

三錢

白芍

二錢

生地

三錢

丹皮

一錢

梔子

三錢

茯苓

三錢

砂仁

一錢

生甘草

一錢

水煎服

【效果】進二劑氣血調和。而諸疾悉除矣。

遠按證候危急如此。幾至無可下手。看他獨從不大便二日上着眼融會仲景心法。投大承氣以收擢陷廓清之效。心靈手敏。是眞能善讀長沙書者。

○風痙案

蘇致堅住上海南市裏  
馬路一二零五

【病者】王左泰興人。住浦東南碼頭。揷煤爲業。

【病名】風痙。

【原因】素有頭旋心煩盜汗。陰分本虧。今夏四月十三日因力疾工作。偶感疫邪。倏爾昏痙。

【症候】一起卽神志沉迷。自汗如浴。身熱如燔。口噤手握。角弓反張。如真中風狀。

【診斷】脈洪大而數。舌乾赤無津。此疫邪從口鼻吸入。傷於心胞之絡內。則心液不足。鬱火上騰。火爍金傷。不能平木。風木動搖。致成風痙。

【療法】急以辛涼平定風木。芳香化濁開竅。甘寒養液。保持心君。

【處方】羚羊角

六分

粉丹皮

一錢

鮮金釵

三錢

銀花朵

二錢

連翹心

二錢

鮮京葛

一錢

鈎藤

二錢

鮮生地

五錢

大麥冬 三錢 竹葉心 三錢 安宮牛黃丸

一粒  
化下

【覆診】一服後風平炎減。神志漸清。惟脈仍洪數未靖。舌燥津無。時有嗰咳。是熱邪甫退。真陰未復。餘焰上干於肺。肺失清肅之令。故液乾而嗰咳也。再議抑木清金。佐以潤燥。

【次方】桑葉二錢 菊花一錢 杏仁二錢 桔梗一錢

鮮石斛三錢 花粉二錢 麥冬二錢 白蒺藜二錢

梨皮三錢 大貝母三錢 蘆根五錢

【三診】太陰邪熱漸平。咳痰漸豁。陽明燥氣未盡。便祕難更。午後時行潮熱。寤難安寐。脈象反見小數。急擬增液承氣。加減蕩滌中焦之實。而救已虛之陰。

【三方】生地三錢 大麥冬三錢 瓜蒌五錢 大貝母三錢  
箱大黃三錢 枳實一錢 梨汁半杯 薑漿半杯

【四診】便解二次。苔潤津回。脈靖身涼。都是佳候。惟午後潮熱如故。夜間寤不成眠。咳逆未已。顯屬肺胃未和。痰熱內擾。再擬清潤滌痰。

【四方】生苡仁

三錢

杏仁

三錢

茯苓神

各三錢  
碌衣

益元散

三錢

括蔥皮

三錢

大貝母

三錢

秫米

三錢

陳膽星

八分

竹茹

五分

蘆根

三錢

【五診】前方連服三劑。諸症悉屏。惟夜寐不沉。寅卯間必有自汗。當擬雙培氣血。

【五方】南沙參

三錢

茯苓神

各三錢

生白朮

一錢

當歸

一錢

白芍

一錢

青龍齒

三錢

黃耆

二錢

生牡蠣

五錢

浮小麥

五錢

【效果】三服後。眠食如恆而愈。

按此症前後服方十數帖。從未表散。純以清潤而愈。緣體質素弱。陰分。