

重刊孫真人備急千金要方

七



產科孫真人備急千金要方卷之五下 少小嬰孺篇

欬嗽第六 六十四首

小兒出胎二百許日頭身患小小瘡治護小瘡後發五月中忽小小欬嗽微溫和治之因變癰一日二十過發四肢縮動背脊駢眊眼反須更氣絕良久復蘇已與常治癰湯得快吐下經日不間爾後單與竹瀝汁稍進一日一夕中進一升許發時小疎明日與此竹瀝湯得吐下發便止其間猶稍稍與竹瀝汁

竹瀝湯方

竹瀝伍合 黃芩參拾銖 木防已 羚羊角

白木各陸銖 白朮各陸銖 大黃貳兩 茵芋參銖 麻黃

白薇 茯苓 車前 甘草各半



一升分服二合相去一食久進一服一方無單解

治小兒中冷及傷寒暴嗽或上氣咽喉鳴氣逆或鼻塞清水出方

紫苑 杏仁 黃芩 當歸 甘草

橘皮 青木香 麻黃 桂心各陸 大黃壹兩

右十味咬咀以水三升煮取九合去滓六十日至百日兒一服二合半一百日至二百日兒一服三合

五味子治小兒風冷入肺上氣氣逆面青喘迫欬欬晝夜不食食則吐不下方

五味子 當歸各半兩 麻黃 乾薑

桂心 人參 紫苑 甘草各陸



細辛

款冬花各二銖

大黃壹兩半

白朮

右十一味以咀以水二升半煮取九合去滓兒六十日至百日一服二合半一百日至二百日一服三合其大黃別浸一宿下一方無款冬花大黃有大棗叁枚

治小兒大人欬逆短氣曾中吸吸呵出涕唾嗽出臭膿方
燒淡竹瀝煮二十沸小兒一服一合日五服大人一升亦日五服不妨食息乳哺

治小兒寒熱欬逆膈中有癖乳若吐不欲食方

乾地黄肆兩

麥門冬

五味子

蜜各半升

大黃

消石各壹兩

七六味以咀以水三升煮取一升去滓內消石蜜煮令
煎服一合日二服中當有宿乳汁一升許出大者服五合

治小兒欬逆喘息如水雞聲方

射干

麻黃

紫苑

甘草

生薑

各壹兩

半夏

伍枚

桂心

伍寸

大棗

貳拾枚

右八味咬咀以水七升煮取一升五合去滓內蜜五合

煎一沸分溫服二合日三

方

半夏

肆兩

紫苑

桂心

生薑

細辛

阿膠

甘草

各貳兩

欬冬花

貳合

蜜

壹合

右九味咬咀以水一斗煮半夏取六升去滓內諸藥煮

反二升五合五歲兒服一升二歲服六合量大小多少

加減之

方

治大人小兒欬逆上氣方

杏人三升熬穢如膏蜜一升為三分以一分內杏人

嬰孺方下



擣令強更內一分擣之茹膏又內一分擣熟止先食
已含咽之多少自在日三每服不得過半方寸匕則
利

方

半夏

一斤去皮河水洗六七度完用

白礬

新為末

丁香

甘草

草豆蔻

川升麻

縮砂各肆兩

七味以好酒一斗與半夏拌和勻同浸春冬三七日

夏秋七日密封口日足取出用冷水急洗風吹乾每服

一粒嚼破用薑湯下或乾喫候六十日乾方得服疑非

孫思邈方

治少小嗽方

生薑

朱兩

乾薑

四兩

甘草

欽冬花

紫苑

各三兩

杏仁

蜜各壹升

右合諸藥為末微火上煎取如飴餉量其大小多少與兒含咽之百日小兒如棗核許日四五服甚有驗

治小兒嗽

治小兒嗽晝夜甚初不得息不能復啼方

款冬花

紫苑各壹兩半

桂心半兩

伏龍肝陸銖

右為末蜜和如泥取如棗核大傳乳頭令兒飲之日三傳之漸漸令兒飲之

治小兒暴冷嗽及積風冷嗽兼氣逆鳴方

菖蒲

烏頭

杏仁

礬石

細辛

皂莢各陸銖

款冬花

乾薑

淫心

紫苑各十銖

蜀椒伍銖

吳茱萸陸合口

右十二味為末蜜丸如梧子三歲兒飲服五丸加至十九日三兒小以意減之兒大以意加之暴嗽數服便愈

嬰女篇方下



治少小十日已上至五十日卒得驚欬吐乳嘔逆
暴嗽晝夜不得息方

桂枝

甘草

紫苑

麥門冬

右四味咬咀以水二升煮取半升以綿著湯中捉綿滴
兒口中晝夜四五過與之節乳哺

麻黃湯治少小卒有息上氣不得安此惡風入肺方

麻黃

桂心

甘草

生薑

五味子

半夏

生薑

右六味咬咀以水五升煮取二升百日兒服一合大小
節度服之便愈

癖結脹滿第七

方二十五首

灸法一首

治小兒身熱頭痛食飲不消腹中脹滿或小腹絞

痛大小便不利或重下數起小兒無異疾惟飲食過度不知自止哺乳失節或驚悸寒熱惟此丸治之不瘥更可重服小兒欲下是其蒸候哺食減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調悉宜用此丸不用他藥數用神驗千金不傳方臣意等詳序例中凡云服紫丸者即前變蒸篇中四味者是也云服紫丸不下者服赤丸赤丸差驗病重者當用之方中並元赤丸而此用朱砂又

巴豆

麤核人

各拾銖

麥門冬

拾銖

甘草

伍銖

甘遂

朱砂

各貳銖

牡蠣

蠟

各捌銖

古八味以湯熟洗巴豆研新布絞去油別擣甘草甘遂牡蠣麥門冬下篩訖研麤核人令極熟乃內散更擣二千杵藥燥不能相丸更入少蜜足之半歲兒服如荏子一雙一歲二歲兒服如半麻子一雙三四歲者服如麻

麥門冬方下

豆二九五六歲者服如大麻子二九七歲八歲服如小
豆二九九歲十歲微大於小豆二九常以雞鳴時服至
日出時不下者熱粥飲數合即下丸皆双出也下甚者
飲以冷粥即止

治小兒胎中宿熱乳母飲食粗惡辛苦乳汁不起兒乳哺
不為肌膚心腹痞滿萎黃瘦瘠四肢痿躄瘰癧服之可令
充悅方

芍藥

柴胡各貳兩

大黃

人參

各壹兩

乾薑

如熱以枳實代

甘草

各半兩

鼈甲

茯苓

各壹兩

右八味為末蜜丸如大豆服一九歲已上乳服二九
七歲兒服十九日二

治小兒宿乳不消腹痛驚啼方

牛黃參三銖 附子貳枚 真朱 巴豆 杏仁兩

右五味搗附子真朱為末一篩別搗巴豆杏仁令如泥
內藥及牛黃搗一千二百杵藥成若乾入少蜜足之百
日兒服如粟米一九三歲兒服如麻子一九五六歲兒
服如胡豆一九日二先乳哺了服之隔上下悉當微轉
藥完出者病愈散出者更服以藥完出為度

消痰圓

治小兒宿食癖氣痰飲往來寒熱不欲食消瘦

芒消 大黃各肆兩 半夏 甘遂各貳兩

代赭壹兩 巴豆貳枚 杏仁壹伯貳拾枚

右七味為末別搗巴豆杏仁治如膏旋內藥末搗二千
杵令相和合強者內少蜜百日兒服如胡豆一九過百
日至一歲服二九隨兒大小以意節度當候兒大便中

交雅方下 結



藥出為愈若不出更服如初

治八歲已上兒熱結痰實不能食自下方

六藥

枳實

知母

大黃

各二兩

柴胡

六兩

升麻

黃連

黃芩

各二兩

竹葉

升切半

桔梗

壹兩半

細辛

拾伍銖

右十一味咬咀以水六升煮取一升八合去滓分四服

十歲兒為三服一本有枳實杏仁各一兩半而無桔梗

黃連

治十五已下兒熱結多痰食飲減自下方

大黃

柴胡

黃芩

各二兩

枳實

壹兩半

升麻

芍藥

知母

枳實

各二兩

生薑

拾捌銖

杏仁

壹兩

竹葉

切壹升半

十一味咬咀以水六升半取二升一歲至十五者分三服

牛黃雙圓 治小兒結實乳食不消心腹痛方

牛黃

太山甘遂

各半兩

真朱

陸銖

杏仁

芍藥

黃芩

各壹兩

巴豆

拾捌銖

右七味為末蜜丸一歲兒飲服如麻子二丸但隨兒大小加減之

牛黃龍甲圓

治少小癰實壯熱食不消化中惡忤氣方

牛黃

厚朴

茯苓

桂心

芍藥

乾薑

各半兩

龍甲

麥麴

柴胡

大黃

枳實

芫花

各一兩

右十二味為末蜜丸如小豆大日三服以意量之

續結痧方



思與

圓

痰實結

真珠

一兩

麥門冬

二兩

雞人

右四味為末蜜丸暮歲兒服二九

服如麻子二九漸增以知為度當

下勿絕藥病盡下自止又假使

醫方

治少小腹中

有



龜甲

芍藥

大黃

茯苓

柴胡

乾薑

各二十四銖

桂心

陸

蟬蟲

蟻

各二枚

右九味為末蜜和服如梧子七丸漸漸加之以知為度

鼈頭圓

治小兒痞氣脇下腹中有積聚堅痛方

鼈頭

膏

甘皮

半兩

蝨蟲

蜜蟲

桃人

各十

右五味為末蜜丸服如小豆二九日三大便不利加大

黃十八銖以知為度

治小兒羸瘦惛惛宜常服不妨乳方

甘草五兩為末蜜丸一歲兒服如小豆十九日三服

盡即更合

桂心橘皮湯

治小兒五六日不食氣逆方

桂心

人參

各半

橘皮

參

黍米

伍合

成擇薤

勝結脈滿

右五味以水七升先煮藥煎取二升次下薤米米
熟藥成稍稍服之

附黃圓治少小胃氣不調不嗜食生肌肉方

乾地黄

大黃

各壹兩
陸銖

茯苓

拾捌銖

當歸

柴胡

杏仁

各半兩

右六味為末以蜜丸如麻子大服五丸日三

通栗圓治少小脅下有氣內痛喘逆氣息難往來寒熱

羸瘦不食方

馬通中栗

拾捌銖

杏仁

紫苑

各半兩

五味子

石膏

秦艽

半夏

茯苓

各陸銖

古九味為末蜜丸服如小豆十九日三不

兒下痢腹大且堅方

以故衣帶多垢者切一升水二升煮取一升分三服

又方 腹上摩衣中白魚赤治陰腫

治少小腹脹滿方

燒父母指甲灰乳頭上飲之

又方 韭根汁和猪脂煎細細服之

又方 車轂中脂和輪下土如彈丸吞之立愈

又方 米粉鹽等分炒變色腹上摩之

治小兒癖

灸兩乳下一寸各三壯

當歸圓 治小兒胎寒嘔啼腹中痛舌上黑青涎下方黑

當歸 狼毒各功 吳茱萸一作杏仁 蜀椒各半

細辛 乾薑 附子各十 巴豆拾枚 葶藶各合

