

养殖技术普及读物



# 长毛兔养殖及剪毛技术问答

中国科学院长沙农业现代化研究所王仁德编

养殖技术普及读物

# 长毛兔养殖

## 及剪毛技术问答

中国科学院长沙农业现代化研究所

王仁德主编

湖南科学出版社

期消肿。芦荟醋油鼻涕膏带状疱疹如延及面部  
为状，量取样膏外敷于患处，一膏可用数日。  
本品忌食生冷，宜温热敷出。

防治：立即停喂引起发麻的饲料，合酒  
生麸或玉米粉加水调成糊状，每天喂1次，

配合药：常绳生等，每只兔每次服0.25克，  
长毛兔养殖及剪毛技术问答

作者：中国科学院长沙农业现代化研究所  
王仁德 编

责任编辑：常绳生

湖南科学技术出版社出版

（长沙市展览馆路3号）

湖南省新华书店发行

湖南省新华印刷二厂排版 长沙湘中印刷厂印刷

1983年6月第1版 1987年10月第5次印刷  
开本：787×1092毫米 1/64 印张 0.75 字数：13 000  
印数：95 301—106 000

ISBN 7-5357-0327-5/S·51

统一书号：16204·111 定价：0.19元

湘科87—3

## 出版说明

加快养殖业的发展，对于促进工农业生产、提高人民生活水平有着重要的作用。把科学知识和先进技术送到直接从事养殖业生产者手中，是最有效、最现实的智力投资。为此，我们组织了一批长期从事畜牧科研、教学和生产的科技工作者编写了一套《养殖技术普及读物》。

这套读物采用问答的形式介绍养殖关键技术，内容丰富，技术先进适用，文字通俗易懂，适合具有初中、高小文化的农民和农村基层干部学习使用。

湖南省农业厅

一九八三年四月

# 目 录

## 一、长毛兔的繁育

1. 目前，我国有哪几种长毛兔可供选择饲养? ..... (1)
2. 公、母兔饲养几个月可以配种? ..... (2)
3. 母兔发情有何表现? ..... (3)
4. 公、母兔在配种前要做哪些准备工作？配种时应注意什么事项? ..... (4)

## 二、长毛兔的饲养管理

5. 家兔常吃的青料有哪些? ..... (5)
6. 常喂的精料有哪几种? ..... (6)

- 7.为什么长毛兔要喂矿物质饲料?.....(7)
- 8.兔子饲养管理的一般原则是什么?.....(8)
- 9.怎样饲养管理种公兔?.....(10)
- 10.如何养好母兔?.....(11)
- 11.怎样养好仔兔?.....(15)
- 12.断乳幼兔为什么难养?.....(18)
- 13.怎样养中年兔?.....(20)
- 14.不同季节的饲养管理应注意什么?.....(21)
- 15.怎样捉兔?.....(22)
- 16.怎样阉割公兔?.....(23)
- 17.建造兔舍有什么要求?常用兔舍有几种?.....(24)
- 18.兔舍内需要哪些设备?.....(26)
- 三、长毛兔的剪毛技术
- 19.长毛兔采毛方法有哪几种?如

何应用?.....(30)

## 四、常见兔病防治

20.怎样识别病兔?.....(32)

21.兔球虫病有哪些主要症状?如何防治?.....(33)

22.怎样防治兔疥癣病?.....(35)

23.怎样防治母兔乳房炎?.....(37)

24.兔的毛球病是怎样发生的?如何防治?.....(38)

25.兔的腹泻病是怎样引起的?如何防治?.....(39)

26.如何防治兔的消化不良?  
.....(40)

## 一、长毛兔的繁育

1

目前，我国有哪几种长毛兔可供选择饲养？

目前，我国饲养的长毛兔主要有安哥拉兔、全耳毛兔和西德兔等三种。

(1) 安哥拉兔 是世界上著名的毛用兔，原为英国所饲养，后引入法国。由于饲养条件和选育方向的不同，形成了英、法两个兔系。这两种兔的毛色均为白色，年产毛量为500克左右。在外形上主要是根据耳毛的多少加以区别。法系安哥拉兔耳无长毛。英系安哥拉兔耳尖有长毛，飘出耳外。

英系安哥拉兔：被毛蓬松似雪球，毛

长时能从背脊中央自然分开一线，向两边披下；耳短而薄，耳尖有长毛；面部圆，鼻端缩入；额、颊、四肢及趾间脚毛较长，兔毛的密度大，粗毛含量较少。成年兔体重5~7市斤，繁殖力强，每胎产仔有6~7只，但体质较弱，抗病力差。

法系安哥拉兔：体型比英系长而大，成年兔体重为6~8斤，耳朵大而厚。被毛较短，粗毛含量较多。耳上无长毛，额、颊、四肢和趾间脚毛亦较少，体质好，适应性较强。

(2) 全耳毛兔 又名中系安哥拉兔，是由我国劳动人民将英、法两系安哥拉兔进行杂交，并参有中国本地兔的血统，经长期的杂交培育而成的一个品种。

本兔的主要特点是整个耳背及耳端密生细长的绒毛，飘出耳外，甚为美观。头宽，耳长中等，额、颊毛非常丰厚，从侧

面往往看不到眼睛，从正面看只见绒毛一团，形成狮子头。成年兔体重为4~6斤，年产毛量为350克，个别的可达500克左右。

(3) 西德长毛兔 我国于1978年从西德引进的良种，它生长快，产毛量高，一般年产毛1,000克左右，成年兔体重6~9斤。产仔率高，每胎8~10只，是我国现有饲养兔种中最理想的品种。

## 2

公、母兔饲养几个月可以配种？

母兔发情有何表现？

一般兔子出生后3~4个月就能发情配种，但此时发育不够成熟，如交配太早，会影响公、母兔的生长发育，同时所产仔兔体质也弱，成活率低。因此，以母兔在6~7个月龄，体重4~5斤，公兔8~9个月龄，体重5~6斤开始配种为宜。成年母兔每月发情两次，每次持续3至4天。发情母

兔的表现是吃得少，举动活跃，在笼内跑来跑去，外阴部潮红湿润等。

### 3

## 家兔怎样配种？它的生殖有何特点？

家兔的配种，目前普遍采用自然交配。将发情母兔放入公兔笼中，公兔嗅到气味追赶，很快就会爬上母兔的后体，并用前爪揉弄母兔腹侧，这时母兔便会支起后脚，举尾迎合。公兔射精后会发出“咕咕”的叫声，后肢卷缩向一侧倒下，说明配种结束。此时要在母兔臀部拍一巴掌，使母兔紧张地一缩，而使精液深深吸入，便可将母兔捉回原笼。母兔虽有周期性的发情现象，但是它的排卵却与其它家畜不同。母兔必须通过交配或性刺激后方能排卵，在发情期内如不及时配种，成熟的卵就会在体内退化萎缩。

## 4

## 公、母兔在配种前要做哪些准备

工作？配种时应注意什么事项？

公、母兔在配种前要进行一次健康检查，凡患疥癣和梅毒病的兔，一律不能配种，应进行隔离治疗，待痊愈后才能配种。配种前要加强公、母兔的饲养管理，饲料要合理搭配，营养要全面，并促使加强运动，以增强体质，提高公、母兔的性机能。

配种时应注意的事项：配种前先将公兔笼中的食盆、水盆取出。当遇到凶恶公兔嗅到母兔身上有其它公兔气味而进行咬击时，应立即取出母兔，隔2~3小时后再配。配种的时间，夏季在早晚进行，冬季在中午进行，其它季节在上下午喂料前进行。

## 二、长毛兔的饲养管理

5

家兔常吃的青料有哪些?

农村养兔，青料以野草为主，如鸡长根、蒲公英、鹅毛草、细米花、芦花草、车前草等。冬春两季的青料靠种植为主，如三叶草、胡萝卜、包心菜、小白菜、干红薯藤及花生苗等。笔者以三叶草为主饲养长毛母兔、仔兔及幼兔，母兔产后16天配种怀孕，产仔五只，生长发育良好，幼兔40日龄断奶，平均体重1.3斤。

6

常喂的精料有哪几种?

农村养兔精料以大米为主，但单纯用大米营养成分不全面，喂不好兔，应搭配

多种精料才好，如玉米、大米、麦麸、黄豆、黄豆饼、花生饼、豆渣、蚕豆渣、糠饼等。

## 7

### 为什么长毛兔要喂矿物质饲料？

长毛兔所需要的矿物质主要有钙和磷。钙和磷是形成骨骼与牙齿不可缺少的矿物质元素，正在成长中的幼兔、中兔特别需要。日粮中如果缺乏钙、磷，兔子会出现周期性拒绝采食，或吃污垢等现象，同时行动迟钝，生长停滞，局部脱毛；怀孕母兔胚胎发育受阻；哺乳母兔体内钙质消耗过多，会造成瘫痪。

动物性饲料，如鱼粉、蛋壳粉、骨粉中含钙、磷特别多。植物性饲料豆科含钙较多。除了喂给动物性和植物性饲料外，还可在日粮中加喂2%的磷酸氢钙，直接补充钙、磷营养。

## 8

# 兔子饲养管理的一般原则是什么？

对不同类的家兔和不同的季节饲养管理中应该注意有所区别外，有一些共同的原则是不能违反的：

(1) 饲料要多样搭配，保持相对稳定。饲料单纯，满足不了家兔生长发育对各种养分的需要，兔子会发生营养缺乏症和食欲减退，因此，饲料必须多样搭配。改变饲料时要逐步变换，新换饲料的量要从少到多，使兔子的消化机能逐渐适应，不致产生食欲下降或伤食而影响生长发育。

(2) 少喂勤添，定时定量。每天喂的次数要多，每次喂的数量要少，因兔胃的生理结构没有肌肉纤维层，胃不能自身蠕动，上次吃的食要靠下次吃进新食物来推进，因此，少喂多餐就显得重要了。免

的个体不同，食量有差异，平时要注意看兔投料，食量大的多喂，食量少的少给，不能千篇一律，这样才能保持每只兔子食欲旺盛，生长发育快。喂料必须定时，每天必须在固定的时间投料，不能任意提前或推迟。如果不定时，就会降低兔子的消化机能，影响生长发育。

(3) 保持笼舍清洁，减少疾病发生  
家兔的抗病力较别的家畜弱。平时要勤于清扫兔舍，认真做好防疫卫生工作。笼底的粪尿每天要清除2次。兔笼要定时擦洗，保持良好的饲养环境。在喂料前必须检查食具，清除剩料及粪尿，用清水洗净；沾有污泥的青草要洗净晾干后喂，带有霜、露水的青料要晾干喂，霉烂变质的精、青料，决不能喂。

(4) 保证适当运动，增进体质健壮  
运动能促使家兔新陈代谢旺盛，增进食欲，

增强抗病力。家兔晒到阳光，可以促进兔体内合成维生素D，有利于钙、磷的吸收，减少母兔的空怀和死胎，提高母兔的产仔率。因此，应使兔子有适当的运动并晒到太阳，以增进体质健壮。

## 9

### 怎样饲养管理种公兔？

种公兔要选择发育良好、两侧睾丸大小均匀、体格健壮、性欲强的兔子，才能繁殖好的后代。公兔到了3个月龄以上，就要与母兔分开饲养，以免发生早配和乱配。4个月龄以上的公兔还必须单独饲养，这样能增强其性欲，并避免公兔之间撕咬而造成伤害。

种公兔要养得健壮，不使过瘦或过肥。在配种时期，应喂蛋白质、维生素丰富的饲料，并补充钙和磷。如胡萝卜、豆类、鱼粉和麦芽等，饲喂量可稍大，如公兔每天