

重修政和經史證類備用本草

十一



重修政和經史證類備用本草卷第十

已酉新
增衍義

成都唐慎微續證類

臣曹孝忠奉

敕校勘

草部下品之上總六十二種

楊臣氏

滄葦

臣

三十種神農本草經

白字

四種名醫別錄

墨字

臣

臣

三種海藥餘

二十五種陳藏器餘

臣

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

附子

烏頭

射罔烏
喙附

天雄



羊躑躅	薨 音花	茵芋	白及	白欬 附赤欬	常山	鈎吻	草蒿 音義作蒿青蒿子續注	葶藶	由跋	側子
	牙子	赭 音魁	大戟	青箱子	蜀漆	射 音干	旋覆花	桔梗	鳶尾	半夏
	及已	貫衆 附花	澤漆	藿 音菌 郡音	甘遂	蛇全 合是含字	藜蘆	芩 浪音 藎 音子	大黃	虎掌

三種海藥餘

瓶香

釵子股

耳南草

二十五種陳藏器餘

藕車香

朝生暮落花

衝洞根

井口邊草

純耳草

燈花末

千金鏹草

斷罐草

狼把草

百草灰

產死婦人塚上草 孝子衫襟灰

靈床下鞋履

蚩母草

故蓑衣結

故炆帚

天羅勒

毛蓼

蛇芮草

萬一藤

螺麝草

繼母草

甲煎

金瘡小草

鬼釵草

梓州附子



梓州附子花



附子味辛甘溫大熱有大毒主風寒欬逆邪氣溫中金
 瘡破癥堅積聚血瘕寒濕踈_{烏卧切}臂拘攣膝痛脚疼冷
 弱不能行步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤
 白堅肌骨強陰又墮胎為百藥長生犍為山谷及廣漢

冬月採為附子春採為烏頭

地膽為之使惡蜈蚣畏防風黑

云附子以八月上旬採八角者良凡用三建皆熟灰微炮令折勿過
焦惟薑附湯生用之俗方每用附子皆漬甘草入參生薑相配者正
制其毒故也今按陳藏器本草云附子醋浸削如小指內耳中去
聾去皮炮令折以蜜塗上炙之令蜜入內舍之勿咽其汁主喉痺

圖經

文具側

陳藏器云

附子無八角陶強名之古方多用
八角附子市人所貨亦八角為名

公云

凡使先須細認勿誤用有烏頭烏喙天雄側子木鼈子烏頭
少有莖苗長身烏黑少有傍尖烏喙皮上蒼有大豆許者孕

八九箇周圍底陷黑如烏鐵宜於文武火中炮令皺坼即劈破用天
雄身全矮無尖周圍四面有附孕十一箇皮蒼色即是天雄宜炮皺
坼後去皮尖底用不然陰制用並得側子只是附子傍有小顆附子
如棗核者是宜生用治風癱神妙木鼈子只是諸喙附雄烏側中毗
捷者号曰木鼈子不入藥中用若服令人喪目若附子底平有九角
如鐵色一箇箇重一兩即是氣全堪用夫修事十兩於文武火中炮
令皺坼者去之用刀刮上孕子并去底尖微細勞破於屋下午地上
掘一坑可深一尺安於中一宿至明取出焙乾用夫欲炮者灰火勿
用雜木火只用柳木最妙若陰制使即生去尖皮底了薄切用東流
水并黑豆浸五日夜然後曬出於日中曬令乾用凡使須陰制去皮尖
了每十兩用生烏豆
五兩東流水六升

聖惠方

治丁瘡腫甚者用附子末醋和
塗之乾即再塗千金翼方同

外臺



秘要

療偏風半身不遂冷痺症附子一兩生用無灰酒一升
右咬咀內於酒中經一七日隔日飲之服一小合差

千金

翼

治大風冷痰癰脹滿諸痺等病用大附子一枚重半兩者二枚
亦得炮之酒漬春冬五日夏秋三日服一合以差為度日再服

無所

又方

治口噤卒不開搗附子末
內管中開口吹喉中差

百一方

治卒忤停尸不能
言口噤不開生附

子末置管中吹
內舌下即差

經驗方

嘔逆難胃用大附子一箇生薑一
斤細剉煮研如麪糊米飲下之

經驗

後方

治大人久患口瘡生附子為末醋
麪調男左女右貼脚心日再換

又方

治熱病吐下水及
下利身冷脉微發

躁不止附子一枚去皮臍分作八片
入鹽一錢水一升煎半升外溫服立效

斗門方

治癰胃用附子一箇
最大者坐於壻上四

面着火漸逼碎入生薑自然汁中又依前火逼乾復淬之約生
薑汁可盡半碗許搗羅為末用粟米飲下一錢不過三服差

又方

治元藏傷冷及開胃附子炮過去皮尖搗羅為末以水兩盞入藥二
錢鹽慈棗薑同煎取一盞空心服大去積冷暖下元肥腸益氣酒食

無簡要濟眾

治脚氣連腿腫滿久不差方黑附子一兩去皮臍
生用搗為散生薑汁調如膏塗傳腫上藥乾再調

澄之腫

孫用和

治大瀉霍亂不止附子一枚重七錢炮去皮臍為
末每服四錢水兩盞鹽半錢煎取一盞溫服立上

張文仲

療眼暴赤腫疼痛不得開又淚出不止削
附子赤皮末如蠶屎着背中以定為度

崔氏方

療耳





龍州烏頭

江寧府烏頭

牙關急不得開方取八角附子一枚酢漬之三宿令
潤微削一頭內耳中灸上十四壯令氣通耳中即差
孫兆口訣云
治陰盛隔陽傷寒其人必躁熱而不欲飲水者是也宜服霹靂散附
子一枚燒為灰存性為末蜜水調下為一服而愈此逼散寒氣然後
熱氣上行而
又方
治頭痛附子炮石膏煨等分為
末入腦麝少許茶酒下半錢
修真秘旨
治
風至驗以附子一箇生去皮臍用菴豆一合同入銚子內煮豆
熟為度去附子服豆即立差每箇附子可煮五服後為末服之

成州烏頭




梓州草烏頭



晉州烏頭



邵州烏頭



烏頭味辛甘溫大熱有大毒主中風惡風洗洗出汗除

寒濕痺效逆上氣破積聚寒熱消肯上痰冷食不下心

腹冷疾臍間痛肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視又墮

胎其汁煎之名射罔殺禽獸○射罔味苦有大毒療尸

疰癥堅及頭中風痺痛一名奚毒一名即子一名烏喙

目禹錫等謹按中蠱通用藥云射罔溫大熱○烏喙音諱味辛微溫有大毒主風濕

丈夫腎濕陰囊痒寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰

腫膿結又墮胎生朗陵山谷正月二月採陰乾長三寸已

上為天雄莽草為之使反半夏枯樓貝母白斂白及惡藜蘆陶隱居云今採用四月烏頭與附子同根春時莖初生有腦

形似烏鳥之頭故謂之烏頭有兩歧共蒂狀如牛角名烏喙喙即鳥之口也亦以八月採搗竿莖取汁日前為射罔獵人以傳箭射禽獸中人亦死宜速解之唐本注云烏喙即烏頭異名也此物同苗或有三歧者然兩歧者少縱天雄附子有兩歧者仍依本名如烏頭兩歧即

名烏喙天雄附子若有兩歧者復云何名之目禹錫等謹按吳氏云

烏頭一名葇一名千秋一名毒公一名果負一名耿子神農雷公桐

君黃帝甘有毒正月始生葉厚莖方中空葉四四相當與蒿相似又

云烏喙神農雷公桐君黃帝有毒十月採形如烏頭有兩歧相合如

烏之喙名曰烏喙也所畏惡使盡與烏頭同爾雅云葇葇草注即烏

頭也江東呼為葇音蕘崔寔四民月令云三月可採烏頭藥性論云

烏頭使遠志為之使忌或汁味苦辛大熱有大毒能治惡風憎寒濕

痺逆氣冷痰包心腸腹痛痲痺氣塊益陽事中風洗洗惡寒除寒

熱主腎中痰滿冷氣不下食治欬逆上氣治齒痛破積聚寒主強志

又云烏喙使忌或汁味苦辛大熱能治男子腎氣衰弱陰汗主療風

溫濕邪痛治寒熱癰腫歲月不消者陳藏器云射罔本功外主療瘡

瘡根結核瘰癧毒腫及蛇咬先取藥塗肉四畔漸漸近瘡習逐病

至骨瘡有熟膿及黃水出塗之若無膿水有生血及新傷肉破即不

可塗立殺人亦如殺走獸傳箭鏃射之十步倒也日華子云土附子

味療辛熱有毒生去皮搗濾汁澄清旋添曬乾取膏名為射罔獵人

將作毒箭使用或中者以甘草藍青小豆葉浮萍冷水薺菜皆可禦也

圖經

文具側
子條下

聖惠方

治風腰脚冷痺疼痛用川烏頭三分去
皮臍生搗羅醋調塗於故帛上傳之

須臾又方

治久疥癬方用川烏頭七枚生用搗碎
以水三大盞煎至一大盞去滓溫洗之外臺秘要治

風頭痛臍月烏頭一升炒令黃
末之絹袋盛酒三升浸溫服

千金方

治耳鳴如流水聲耳痒及
風聲不治久成聾全烏頭



一味掘得承濕削如棗核大塞耳旦易夜易不過三日愈

又方 治沙虱毒以射罔傳之佳**經驗方** 治一切

風痰定遍身疼痛益元氣強精力固精益髓令人少病川烏頭一斤

用五升許大瓷鉢子盛以童子小便浸逐日添注任令溢出浸二七日其烏頭通軟揀去爛壞者不用餘以竹刀切破每箇作四片却用

新汲井水淘七遍後浸之每日換七日通前浸二十一日取出焙乾其藥潔白搗羅為末酒煮麪糊丸菰豆大每服十九空

心搥湯酒下少粥餅壓之如冷氣稍盛加丸數服之**經驗後方**

治痢獨聖丸川烏頭一箇好者柴灰火燒煙欲盡取出地上蓋子合良久細研用酒蠟丸如大麻子每服三丸赤痢用黃連甘草黑豆煎

湯放冷吞下如白用甘草黑豆煎湯放冷吞下**梅師方** 治蛇虺螫如瀉及肚疼水吞下每於空心服之忌熱物

塗螫處**又方** 治婦人血風虛冷月候不勻或即脚手心煩熱或頭頻易

內熬令裂如桑椹色為度去皮臍五靈脂四兩合一處為末入臼中搗令勻後蒸餅丸如梧桐子大空心溫酒鹽湯下二十九丸亦治丈夫

風疾**又方** 補益元藏進飲食壯筋骨二虎丸烏頭附子各四兩醋醃疾三外同藥傾入熱坑子內盆合之經一宿取出去砂土用好青鹽

醋三兩研與前藥同炒令赤黃色杵為末醋麪糊丸如梧子大空心冷酒下十五丸鹽湯

又方 療癱緩風手足躡曳口眼喎斜語言蹇澁亦得婦人亦宜履步不正神驗烏龍丹川烏頭去皮臍了



五靈脂各五兩右為末入龍腦麝香研令細勻滴水丸如彈子大每服一丸先以生薑汁研化次煖酒調服之一日兩服空心晚食前服治一人只三十九服得五七丸便覺勝金方治蠟蜚烏頭末少

靈苑方

治馬汗入瘡腫痛漸甚宜急療之遲則毒深難初虞

世

治陷甲割甲成瘡連年不差川烏頭尖黃藥等分為末洗了貼藥修真秘訣治瀉痢三神

兩一兩生一兩熟炒一兩燒存性研為末以醋麪糊丸如菰豆大每服五丸空心服瀉用井花水赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢生薑甘孫兆口訣治陰毒傷寒手足逆冷脉息沉細頭疼腰重兼

草湯下炒令轉色放冷再搗為細散每一錢水一盞盞一撮煎取半盞溫服古今錄驗治癰攻腫若有瘰肉

洗之曰夜三四度楊氏產乳等分為末綿裹塞耳中日再用効也

唐李寶臣

為娥人置薑于液寶唐武后氏食之暴死


衍義曰

烏頭烏喙天雄附子側子凡五等皆一物也止以大小長短似像而名之後世補虛寒則須用附子仍取其端平而

圓大及半兩以上者其力全不替風家即多用天雄亦取其大者以其尖角多熱性不肯就下故取數散也此用烏頭附子之大略如此

餘三等則量其材而用之
其炮製之法經方已著

天雄



天雄味辛甘溫大溫有大毒主天風寒濕痺歷節痛
拘攣緩急破積聚邪氣金瘡強筋骨輕身健行療頭
面風去來疼痛心腹結積關節重不能行步除骨間痛
長陰氣強志令人武勇力作不倦又墮胎一名白菴

生少室山谷二月採根陰乾

遠志為之使惡腐婢陶隱居云今採用八月中旬天雄似附子

細而長便是長者乃至三四寸許此與烏頭附子三種本並出建平
故謂之三建今宜都恨山最好謂為西建錢塘間者謂為東建氣力
劣弱不相似故曰西冰猶勝東白也其用灰殺之時有冰強巨兩切
者不佳唐本注云天雄附子烏頭等並以蜀道綿州龍州出者佳餘處

縱有造得者力弱都不相似江南來者全不堪用陶以三物俱出建
平故名之非也按國語實董于肉注云烏頭也爾雅云芡莖音耕草
郭注云烏頭苗也此物本出蜀漢其本名董今復為水葦今說為建遂以建平釋
之又石龍芮葉似葦故名水葦今復為水葦亦作建音此豈復生建
平耶檢字書又無葦字甄立言本草音義亦論之天雄附子側子並
同用八月採造其烏頭四月上旬今云二月採恐非時也臣禹錫等
謹按淮南子云天雄雄雞志氣益注云取天雄三枚內雄雞腸中搗
生食之令人勇藥性論云天雄君忌鼓汁大熱有大毒乾薑制用之
能治風痰冷痺軟脚毒風能止氣喘促急殺禽蟲毒日華子云治一
切風一切氣助陽道暖水藏補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血
脉四肢不遂破痼癰瘰癧結排膿止痛續骨消痰血補冷氣虛損霍亂
轉筋背脊痠痺消風痰下骨膈水發汗止陰汗炮含治喉痺凡丸散炮
去皮臍用飲藥即和皮生使甚佳可以便驗又云天雄大長少角刺
而虛烏喙似天雄而附子大短有角平穩而實烏頭次於附子側子
小於烏頭連聚生者名為虎掌並是天雄一裔子母之圖經文具
類力氣乃有殊等即宿根與嫩者耳已上並忌鼓汁

陳藏器

天雄身全短無尖周匝四面有附子孕十一箇皮蒼
色即是天雄宜炮皺坼後去皮尖底用之不然陰制

別說云

謹按此數條說前項悉備但天雄者始種烏頭而不
得用並生諸附子側子之類經年獨生長大者是也蜀人種

之忌生此以為不利如
養蚕而為白殭之類也

峽州側子



側子味辛大熱有大毒主癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒

熱鼠瘻又墮胎

陶隱居

云此即附子邊角之大者脫取之昔時不

同根而本經分生三處當各有所宜故也方云少室天雄朗陵烏頭皆稱本土今則無別矣少室山連嵩高朗陵縣屬豫州汝南郡今在北國唐李注云側子只是烏頭下共附子天雄同生小者側子與附子皆非正生謂從烏頭傍出也以小者為側子大者為附子今稱附子角為側子理必不然若當陽已下江左及山南嵩高齊魯間附子時復有角如大豆許夔州已上劔南所出者附子之角曾微黍粟持此為用誠亦難充比來京下皆用細附子有效未嘗取角若然方須八角附子應信八角側子言取角用不近人情也臣禹錫等謹按蜀本注云昔多不用今以療脚氣甚效按陶云側子即附子邊角之大者削取之蘇云只是烏頭下共附子同生小者為側子大者為附子殊

無證據但云附子角小如黍粟難充於用故有此說今據附子邊果有角大如棗核及檳榔已來者形狀亦自是一顆仍不小是則烏頭傍出附子附子傍出側子明矣似烏鳥頭為烏頭兩歧者為烏喙細長乃至三四寸者為天雄根傍如芋散生者名附子傍連生者名側子五物同出而異名苗高二尺許葉似石龍芮及艾其花紫赤其實紫黑今以龍州綿州者為佳作之法以生熟湯浸半日勿令滅氣出以白灰裹之數易使乾又法以米粥及糟麴等並不及前法吳氏云側子一名葭神農岐伯有大毒八月採陰乾是附子角之大者畏惡與附子同藥性論云側子使能治冷風濕痺大風筋骨掣急

圖經曰烏頭烏喙生朗陵山谷天雄為山谷及廣漢今並出蜀土然四品都是一種所產其種出於龍州種之法冬至前將肥腴陸田耕五七遍以猪糞糞之然後布種逐月耘耔至次年八月後方成其苗高三四尺已來莖作四稜葉如艾花紫碧色作穗實小紫黑色如桑椹本只種附子一物至成熟後有此四物收時仍一處造釀方成釀之法先於六月內踏造大小麥麴至收採前半月預先用大麥煮成粥後將上件麴造醋候熟淋去糟其醋不用太酸酸則以水解之便將所收附子等去根須於新潔甕內淹浸七日每日攪一遍日足撈出以彌踈篩攤之令生白衣後向慢風日中曬之百十日以透乾為度若猛日曬則皺而皮不附肉其長三二寸者為天雄割削附子傍尖芽角為側子附子之絕小者亦名為側子元種者母為烏頭其餘大小者皆為附子以八角者為上如方藥要用須炮令裂去皮臍使之綿州彰明縣多種之惟赤水一

