

中醫古籍出版社

中國科學院
圖書館
館藏善本醫書



中醫古籍出版社

中國科學院
圖書館藏善本醫書

中国科学院图书馆馆藏善本医书

第四册

傅景华等编

中医古籍出版社发行

新华书店北京发行所发行

北京振华印刷厂印刷

787×1092毫米

16开本

印张

1990年6月第1版

1990年6月第1次印刷

ISBN 7-80013-289-7/R·286

定价(第三、四册合计): 300元

顾问

辛希孟

崔建英

主编

傅景华

编辑

徐岩春

杜杰慧

葛渭海

赵明晖

靳潇君

郝建辉

封面书名题字

辛希孟

封面设计

高文军

牛复仁

序

我国是世界文化典籍最为丰富的国家之一。在这浩如烟海的典籍之中，「善本」又是极为值得珍视的部分。

所谓「善本」，通常是指其成书时间较早（包括宋、元、明等朝刻本及清初以前的精刻本），或经著名专家、学者题识、序跋、校勘、收藏过的古籍，或一些旧抄、精抄抄本，或各名家手稿。由于这些「善本」珍贵稀少，收藏过程复杂，需要精心保护等原因，所以，在各收藏单位，往往借阅不便，因而影响其使用价值。

中国科学院图书馆（又名中国科学院文献情报中心）自一九五〇年四月成立之日起，由于科学研究和国民经济建设的需要，便在接受原中央研究院语言历史研究所三十余万册藏书（其中多为古籍）的基础上，广泛采集和收藏各种具有较高学术价值的古今中外文献。经过四十年的不懈努力，至今馆藏数量已达五百六十余万册。这些藏书，依学科分，哲学、社会科学与自然科学、技术科学之比，大概是二比三。在约计五十余万册的线装古籍中，不少是具有较高学术价值、资料价值和文物价值的「善本」。

为了深入发掘这笔丰厚的文化遗产中所蕴藏的智力，弘扬民族文化，根据「古为今用」的精神，现谨就馆藏古籍「善本」中有关医、药、卫生者，加以整理，分门别类地汇编成册，并以「丛书」方式，由中医古籍出版社陆续出版发行，以供海内外医、药、卫生工作者以及有关教学、科技人员研究参考。

辛希孟

一九九〇年六月

治

法

彙

本册子目

治

法

汇

(下)

内 容 提 要

《治法汇》系明代医家张三锡编纂。张氏字叔承，应天人，世代业医，积三十年临床经验，博采众家，著成《医学六要》一书，认为医学要旨有六个方面。遂将该书分为《四诊法》、《经络考》、《病机部》、《治法汇》、《本草选》、《运气略》六部分。《治法汇》即是丛书《医学六要》之单行本，共八卷，刊行于明万历十三年。作者采辑《内经》、《难经》、《伤寒论》、《金匱要略》及历代医著有关治法内容予以汇编，荟萃其要，内容全面而扼要，是一部综合性临床书籍。由王肯堂校。现据中国科学院图书馆藏明刻本原貌影印。

據中國科學院圖書
館館藏明刻本影印
原書板框高一八五
毫米寬一三七毫米

治法彙五卷

肝江

張二錫

纂

金壇

王有聲

校

脹滿

有寒有熱有氣滯有氣虛有血虛俱屬脾

寒初起脉沉伏或食寒涼傷脾而脹屬寒平胃

理中湯辛以散之

熱脉弦數膏粱酒色傷中濕熱鬱于中而脹者

屬熱小便必短數苓連梔子滑石苦以洩之大

便秘而脉數有力者遇僊丹或茵陳梔子大黃湯以通大便、

氣虛脉緩弱無力或氣口大四倍于人迎食少倦怠朝急暮寬屬中氣虛補中益氣湯加厚朴氣不運加木香不能食者先用六君子湯、

血虛脉弦數或瀦黑瘦口乾二便阻澀暮急朝寬屬血虛四物加二冬蘇子紅花桃仁泥以生血潤燥有火加薑製黃連大便秘用搜風順氣丸一二服、

氣滯脉沉結、或伏、或弦、晝夜不減、頻歎氣、屬氣滯、因暴怒、或抑鬱而成、用木香、流氣飲、或七氣湯、增減、

三錫曰、脹滿、悉屬脾虛、運化不及、濁氣填塞、所致、初起、微佐以消化、舒鬱爲先、勢盛而二便澀滯者、微利之、弱人或稍久、一切病後、瘡疽後、產後、必參朮、芪芍、大補脾氣爲主、而佐以消化、厚朴、木香、黃連、三類、然王道無近功、必數十服、以漸取效、常見用商陸、牽牛等行水法、一瀉卽消、

三日後復起而死者比比皆是良由病家不明
理醫者求速效天人天年悲哉歷考古今明醫
無踰于丹溪東垣薛新甫王損菴矣豈肯曠日
持久而不知尅伐之功速耶其如中氣何可與
高明言難與俗人道爾

肥白人腹脹多是濕痰二朮二陳平胃五苓加
減瘦人腹脹是熱用炒黃連厚朴白芍香附
芩血有口嗜煎燂及熱酒物致血蓄于中而脹
者大便必見黑物抵當湯丸下之不若桃仁承

氣湯加紅花蘇木韭汁佳、

宿食如氣口緊滑惡心飽悶而脹者是食積口

乾內熱者木香檳榔丸或枳實導滯丸下之、

初起挾寒食而脉弦者木香厚朴丁香砂仁神

麴香附、

內有濕熱外被寒鬱而脹者用藿香麻黃升麻

葛根桂枝亦表散之、

怒則氣逆兩脇脹滿兩手脉弦青陳皮木香槐

子仁蘆薈甚者當歸蘆薈丸、

厚味太過脾傷運化不及而脹者一朮二陳加
薑製黃連薑製厚朴蘿藦子或保和丸

因食肉過多而脹者山查枳朮香附半夏麴有
火加炒芩連

脹而喘喘則必生脹脹則必生喘二者相因之
病脾不運而濁火上炎肺不得清則喘肺氣被
鬱喘而不得下降則脹治分新久虛實初起脉
實者二陳蘇子葶藶洩之二便通暢喘脹俱減
其功易