

重修政和經史證類備用本草

八



重修政和經史證類備用本草卷第七

已酉新
增衍義

成都唐慎微續證類

臣曹孝忠奉

敕校勘

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本草經

字白

楊以季氏

陰華

二種名醫別錄

墨字

二種唐本先附

注云
唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類



沙參	景天 附花	蛇床子	旋花 附續筋	茜根	天名精	續斷	防風 葉附花 續注	疾梨子	黃連	藍實 澱青布 續注
白兔藿	茵陳蒿	地膚子 鴨舌 草附	蘭草	飛廉	決明子 注莖 續注	漏蘆	蒲黃	黃耆 白水耆赤水 耆木耆續注	絡石	芎藭
徐長卿	杜若	千歲蘘 藤是也	忍冬	五味子	丹參	營實 白薔薇 根續注	香蒲	肉苁蓉 草苁 蓉附	龍蕪	

石龍菊

敗蓆
續注

薇銜

雲實

附花

王不留行

鬼督郵

附唐

白花藤

附唐

五種唐本餘

留軍待

地不容

獨用將軍

山胡椒

燈籠草

十種陳藏器餘

人肝藤

越王餘筭

石蓴

海根

寡婦薦

自經死繩

刺蜜

骨路支

長松

合子草



藍實味苦寒無毒主解諸毒殺蠱蚊

音其小兒鬼也

疰鬼

熬毒久服頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔

毒其莖葉可以染青生河內平澤

陶隱居云此即今漆繅音禁碧所用者至解毒人卒

不能得生藍汁乃浣繅布汁以解之亦善以汁塗五心又止煩悶尖

藥者為勝甚療蜂螫毒唐本注云藍實有三種一種圓徑二寸許厚

三四分出嶺南云療毒腫太常名此草為木藍子如陶所引乃是菰

藍其汁押普更切為澱音殿者按經所用乃是蓼藍實也其苗似蓼

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非比且二種藍今並堪染菰藍為

澱惟堪染青其蓼藍不堪為澱惟作碧色爾臣禹錫等謹按唐本

圖經云葉似水蓼花紅白色子若蓼子而大黑色今所在下濕地有

人皆種之爾雅云葑馬藍注今大葉冬藍也疏今為澱者是也論云藍實君味甘能填骨髓明目利五藏調六腑利關節治經絡

中結氣使人健少睡益心力藍汁止心煩躁解蠱毒日華子云藍

味苦甘冷無毒治天行熱狂丁瘡游風熱毒腫毒風癰除煩止渴殺

疥解毒藥毒箭金瘡血悶蟲蛇傷毒刺鼻洪吐血排膿寒熱頭痛赤

眼產後血運解金石藥毒解狼毒射罔毒小兒壯熱熱疳陳藏器云

蘇云菰藍造澱按澱多是槐藍蓼藍作者入藥勝槐藍澱寒熱瘡

解諸毒滓傳小兒禿瘡熱腫初作上沫堪染如青黛解毒小兒丹熱

和水服之藍有數種蓼藍最堪入藥甘藍此人食之去熱黃也又云

青布味鹹寒主解諸物毒天行煩毒小兒寒熱丹毒並水漬取汁飲
燒作黑灰傳惡瘡經年不差者及灸瘡止血令不中風水和蠟熏惡
瘡入水不爛熏殺蟲重虎狼咬瘡出水毒又於器中燒令煙出以
器口熏人中風水惡露等瘡行下得惡汁知痛痒差又入諸膏藥療
丁腫狐刺等惡瘡又浸汁和生薑圖經曰藍實生河內平澤今處
焚服止霍亂真者入用假者不中
畦種蔣三月四月生苗高三二尺許葉似水蓼花紅白色實亦若蓼
子而大黑色五月六月採實按藍有數種有木藍出嶺南不入藥有
菰藍可以爲澱者亦名馬藍爾雅所謂葳馬藍是也有蓼藍但可染
碧而不堪作澱即醫方所用者也又福州有一種馬藍四時俱有葉類
苦益菜土人連根採之焙搗下筴酒服錢匕治婦人敗血甚佳又江
寧有一種吳藍二三月內生如蒿狀葉青花白色寒去熱解毒止吐
血此二種雖不類而俱有藍名又古方多用吳藍者或恐是此故并
附之後漢趙岐作藍賦其序云余就醫偃師道經陳留此境人皆以
種藍染紵爲業藍田彌望黍稷不殖至今近京種藍特盛云藍汁治
蟲傷咬劉禹錫傳信方著其法云取大藍汁一椀入雄黃麝香二物
隨意看多少細研投藍汁中以點咬處若是毒者即并細服其汁神
異之極也昔張薦貞外左劔南爲張延賞判官忽被斑蜘蛛咬項上
一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上從骨前下至心經兩宿頭面
腫疼如數外盆大肚漸腫幾至不救張相素重薦因出家財五百千
并薦家財又數百千募能療者忽一人應召云可治張相初甚不信
欲驗其方遂令目前合藥其人云不惜方當療人性命耳遂取大藍

汁一甕盃取蜘蛛投之藍汁良久方出得汁中甚困不能動又別擣
藍汁加麝香末更取蜘蛛投之至汁而死又更取藍汁麝香復加雄
黃和之更取一蜘蛛投汁中隨化為水張相及諸人甚異之遂令點
於交處兩日內悉平愈但咬處作小瘡痂落如舊又中品著青黛條
云從胡國來及太原廬陵南康等染澱亦堪
傳熱毒等染瓮上池沫紫碧色者同青黛功

聖惠方

治時氣熱毒心

神煩躁用藍澱半大匙以新汲水一盞服

又方

治小兒中蠱下血欲死擣青藍汁頻頻服半合

千金方

治

上生瘡連年不差以八月藍葉壹斤擣取汁洗不過三日差

又方

治自縊死以藍汁灌之又極須安定其心徐緩解慎勿割

斷繩抱取心下猶溫者刺雞冠血滴着口中即活也男雌女雄

又方

熊傷人瘡燒青布熏瘡口毒出仍煮葛根令濃汁以洗瘡

日十度并擣葛根為散煮葛根汁服方寸匕日五服差

又方

治驚癇藍葉一斤擣以水三升絞取汁服一升日二

翼

治急疳蝕鼻口數日欲死取藍澱傳之令遍日十度夜四度差

肘後方

治人身體重小腹急熱上衝骨頭重不能

舉眼中生瞖膝脛拘急欲死取藍一把水五升鼠屎兩頭尖者二七枚煮取二升盡服之溫覆取汗

葛氏方

新被毒箭擣藍

青絞汁飲并傳瘡上如無藍可漬青布絞汁飲之亦以治瘡中

又方

中水毒擣藍青汁以少水和傳頭面身上令匝

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍取汁服數升無藍澆青絹取汁飲亦佳

又方

食杏人中毒藍子汁解之

梅師

方治虎傷人瘡取青布緊捲作繩燒頭又方治上氣咳嗽呷呀息氣

內竹筒中射瘡口令煙熏入瘡中佳又方治中作聲垂黏以藍寶

藥水浸良久擣絞取汁一升空腹頻服須臾以杏人研子母秘錄

取汁煮粥食之一兩日將息依前法更服吐痰盡方差

治小兒赤痢擣青又方治小兒丹藍子母秘錄

藍汁二升分四服又方治小兒丹藍子母秘錄

廣五行記永徽中絳州僧病噎不下食告弟子吾死之後便可開

一物形似魚而有兩頭通體是肉鱗弟子致器中跳躍不止戲以諸

味皆隨化盡時夏中藍盛作澱有一僧以澱致器中此虫遂遊器中

走湏臾化為水矣

衍義曰藍實即大藍實也謂之蓼藍非是爾雅所說是解諸藥等

毒不可闕也實與葉兩用注不解實只解藍葉為未盡經

所說盡矣藍一本而有數色刮竹青綠雲碧青藍黃豈非青出於藍

而青於藍者也生葉汁解藥毒此即大葉藍又非蓼藍也蓼藍即堪

揉汁染翠碧花成

長穗細小淺紅色

芎藭



鳳翔府芎藭



永康軍芎藭



芎藭味辛溫無毒主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急
 金瘡婦人血閉無子除腦中冷動面上遊風去來目淚
 出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛
 脅風痛溫中內寒一名胡窮一名香果其葉名靡蕪生
 武功川谷斜谷西嶺三月四月採根暴乾得細辛療金瘡
止痛得牡蠣療

頭風吐逆白芷為之使陶隱居云今惟出歷陽節大莖細狀如馬銜
 謂之馬銜苦藟蜀中亦有而細人患齒根血出者含之多差苗名藟
 蕪亦入藥別在下說俗方多用道家時須爾胡居士云武功去長安
 二百里正長安西與扶風狄道相近斜谷是長安西嶺下去長安百
 八十里山連接七百里唐本注云今出秦州其人間種者形塊大重
 實多脂潤山中採者瘦細味苦辛以九月十月採為佳今云三月四
 月虛惡非時也陶不見秦地苦藟故云惟出歷陽歷陽出者今不復
 用呂錫等集蜀本圖經云苗似芹胡荽蛇牀葦叢生花白今出
 秦州者為善九月採根乃佳吳氏云苦藟神農黃帝岐伯雷公辛無
 毒扁鵲酸無毒季氏生溫孰寒或生胡無挑山陰或太山葉香細青
 黑文赤如藁本冬夏叢生五月華赤七月實黑莖端兩葉三月採根
 有節似馬銜狀藥性論云苦藟臣能治腰脚軟弱半身不遂主胞衣
 不出治腹內冷痛日華子云畏黃連治一切風一切氣一切勞損切
 血補五勞壯筋骨調眾脉破癥結宿血養新血長肉鼻衄吐血及溺
 血痔瘻腦癰發背癰癰癰圖經曰苦藟生武功山谷斜谷西嶺藟
 贅瘡疥及排膿消瘀血燕苦藟苗也生雍州川澤及宛
 句今關陝蜀川江東山中多有之而以蜀川者為勝其苗四五月間
 生葉似芹胡荽蛇牀輩作叢而莖細淮南子所謂夫亂人者若苦藟
 之與藁本蛇床之與藟蕪是也其葉倍香或蔣於園庭則芬馨滿徑
 江東蜀川人採其葉作飲香云可以已泄瀉七八月開白花根堅瘦
 黃黑色三月四月採暴乾一云九月十月採為佳三月四月非時也
 關中出者俗呼為京芎並通用惟貴形塊重實作雀腦狀者謂之雀



腦芎此最有力也薩無一名斷古片斤切古方單用芎藭含咀以主口齒疾近世或蜜和作拍大丸欲寢服之治風痰殊佳

方 治婦人崩中下血晝夜不止以芎藭一兩剉酒一大盞煎至五分去滓入生地黃汁二合煎三兩沸食前分二服

方 治崩中晝夜不止芎藭八兩清酒五升煎取二升半分三服不耐者徐徐進之

方 治婦人經絡住經三箇月驗胎法川芎生為末煉蜜為丸如小彈子大不拘時茶酒罯下一丸

斗門方 治偏頭疼兩用淨水洗浸薄切片子日乾或焙杵為末煉

靈苑方 治婦人經絡住經三箇月驗胎法川芎生為末煉服之佳

續十全方 治胎忽因倒地忽舉動擊重促換腹中不安及子死腹中以芎藭為末酒服方寸匕須臾一二服立出

又方 風齒敗口臭御藥院方 真宗賜高公相國去痰清目進飲

泔浸三日換切片子日乾為末作兩料每料入麝腦各一分生犀半兩重湯煮蜜杵為丸小彈子大茶酒罯下一丸痰加朱砂半兩隔壅

加牛黃一分水飛鐵粉一分頭目昏眩

加細辛一分口眼喎斜炮天南星一分

文帝勸醫文 止河魚之腹

衍義曰 芎藭今出川中大塊其裏色白不油色罯之微辛甘者佳他種不入藥止可為末煎湯沐浴此藥今人所用最多頭



面風不可闕也然須以他藥佐之沈括云子一族子舊服芎藭醫鄭叔熊見之云芎藭不可久服多令人暴死後族子果無疾而卒又朝士張子通之妻病腦風服芎藭甚久亦一旦暴亡皆目見者此蓋單服耳若單服既久則走散真氣既使作藥佐使又不以服中病便已則烏能至此也

薜無味辛溫無毒主效逆定驚氣辟邪惡除盡毒鬼症

去三蟲久服通神主身中老風頭中久風風眩一名薇

蕪一名莊離芎藭苗也生雍州川澤及冤句四月五月

採葉暴乾陶隱居云今出歷陽處處亦有人家多種之葉似蛇

二種一種似芹葉一種如蛇狀香氣相似用亦不殊爾**按爾雅**云蘄蒞薜蕪注香草葉小如菱狀疏引郭云如菱蕪之狀


圖經曰薜蕪說文已具芎藭條下**廣志曰**薜蕪香草魏武帝以藏衣中**管子曰**五沃之土

生薜蕪**郭璞贊曰**薜蕪香草亂之蛇床不隕其貴自烈以芳

黃連

澧州黃連

宣州黃連



黃連味苦寒微寒無毒主熱氣目痛腎傷泣出明目腸

辟腹痛下痢婦人陰中腫痛五藏冷熱久下洩瀉膿血

止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令

人不忘一名王連生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月採黃

龍骨理石為之使惡菊花苑花玄參白鮮畏款冬勝烏頭解巴豆毒
陶隱居云巫陽在建平今西間者色淺而虛不及東陽新安諸縣最

勝臨海諸縣者不佳用之當布裏按去毛令如連珠俗方多療下痢及渴道方服食長生唐本注云蜀道者鹿大節平味極濃苦療渴為最江東者節如連珠療痢大善今澧州者更勝公注醫家見用宣州九節堅重相擊有聲者為勝日禹錫等謹按蜀本圖經云苗似茶花黃叢生一莖生三葉高尺許冬不凋江左者節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及杭州柳州者佳藥性論云黃連臣一名支連惡白殭蠶忌猪肉惡冷水殺小兒疳蟲點赤眼昏痛鎮肝去熱毒日華子云宣州絕佳東陽亦有歙州歙州者次陳藏器云主羸瘦氣急肉止血并瘡疥盜汗天行熱疾猪肚蒸為丸治小兒疳氣圖經
曰黃連生巫陽川谷及蜀郡泰山今江湖荆夔州郡亦有而以宣城者為勝施黔者次之苗高一尺已來葉似甘菊四月開花黃色六月結實似片子色亦黃二月八月採根用生江左者根若連珠其苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色六七月根緊始堪採古方以黃連為治痢之最胡洽方載九盞湯主下痢不問冷熱赤白穀滯休息久下悉主之以黃連長三寸三十枚秤重兩半龍骨如碁子四枚重四分附子大者一枚乾薑一兩半膠二兩半並切先以水五合著銅器中去火三寸煎沸便下著生土上沸止又上水五合如此九上九下內諸藥著火上沸輒下著土上沸止又復九上九下度可得一升頓服即止又香連丸亦主下痢近世盛行其法以宣連青木香分兩停同擣篩白蜜丸如梧子空腹飲下二三十丸日再如神其久冷人即用煨熟大蒜作丸此方本出李絳兵部手集方嬰孺用之亦効



又治目方用黃連多矣而羊肝丸尤奇異取黃連末一大兩白羊子
肝一具去膜同於砂盆內研令極細眾手撚為丸如梧子每食以煖
漿水吞二七枚連作五劑差但是諸眼目疾及障翳青盲皆主之禁
食猪肉及冷水蠶禹錫云有崔承允者因官治一死罪囚出活之囚
後數年以病自致死一旦崔為內障所苦喪明逾年後半夜歎息獨
坐時聞階除間悉窣之聲崔問為誰曰是昔所蒙活者囚今故報恩
至此遂以此方告訖而沒崔依此合服不數月眼復明因傳此方於
世又今醫家洗眼湯以當歸芍藥黃連等分停細切以雪水或甜水
煎濃汁乘熱洗冷即再溫洗甚益眼目但是風毒赤目花翳等皆可
用之其說云凡眼目之病皆以血脉凝滯使然故以行血藥合黃連
治之血得熱即行故乘
熱洗之用者無不神効
雷公云凡使以布拭上肉毛然後用漿水
用若服此藥得十兩不得食猪肉
若服至三年不得食猪肉一生也
外臺秘要治卒心痛黃連八兩
煮取五升絞去滓寒
溫飲五合日三服
又方連乳汁浸點皆中止
千金方治大熱
痢宣連六兩以水七升煮取三升半夜
露星月下平旦空腹頓服之少卧將息
時後方治眼淚出不止濃
又方赤痢熱下久不止黃連末雞子
白丸飲服十九三十九丸即差
又方治卒消渴小便多擗
渴延年又方赤白痢下令人下部疼重故名重下出膿血如雞子
白日夜數十行絞臍痛治之黃連一升酒五升煮取

一升半分再經驗方 治暴赤白痢如鵝鴨肝者痛不忍黃連黃芩
服當小絞痛

即疑梅師方 傷寒病發豌豆瘡未成膿方黃連斗門方 治痔
矣

頭如雞冠者用黃連末傳之 簡要濟衆 小兒吐血不止以一兩
即差更加赤小豆末尤良

水七分入豉二十粒同煎至五 博濟方 治久患脾洩神聖香黃散
分去滓溫服量兒大小加減進

以慢火炒令薑乾脆色深去薑取連檮末每 勝金方 治眼黃連丸
服二錢匕空心腸茶清下甚者不過二服差

少捷碎用新汲水一大碗浸至六十日後用綿濾過取汁入元椀內
却於重湯上熬不任以匙蕩攪候乾為度即穿地坑子可深一尺以

瓦鋪底將熟艾四兩坐在瓦上以火然如灸法然後以藥梳覆上四
畔封泥開孔令煙出盡即止取出刮下丸如小豆大每服十九粒甜竹

葉湯 又方 治久痢累醫不差黃連一兩為末以雞子白和為餅炙
下 令如紫肝色杵為末以漿水三升慢火煎成膏白痢加

酒半盞同煎每服半合 廣利方 治骨節熱積漸黃瘦黃連四分碎
溫米飲調下食前服

煎三四沸去滓食上分兩 杜壬 治氣痢瀉裏急後重神妙方宣連
服如人行四五里再服

錢薑半錢和勻 子母秘錄 因驚舉重胎動出血取黃連末 又方
空心溫酒下 酒服方寸匕日三服孫尚藥同

