

新刊仁齋直指方論

二



新刊仁齋直指方論卷之四

風緩

附

歷節風

胸氣

風緩方論

風緩者風邪深入而手足爲之緩弛也夫人身四肢百骸
急遇熱則柔緩病在陽經氣行遲而關以縱病在陰經氣行
疾而關以收此物理之常然也然脾主肌肉四肢胃爲水穀海
所以流布水穀之氣周養一身脾胃旣虛肢體失其所養於是
風邪襲虛由腠理而入肌肉由肌肉而入脾胃安得不爲之緩
廢乎若曰驅風之劑與助胃之劑不同亦顧吾活法用之何如
耳抑余聞人之一身筋骨爲壯肝主筋腎主骨肝腎氣虛風邪
襲之亦有肢體緩弱之證然則先散其風而後益之於此尤當
加意

風緩

風緩證治

排風湯 繼命湯 方見風類 加靈半夏 雞心大棗 滌增薑煎先以

此散風毒邪氣

蘇合香圓用沸湯泡生薑汁調開吞

服治手足風緩或白圓

不換金正氣散

方見寒類

加川芎

官桂

煎食前吞

安宮圓

胃肝腎俱虛風入

四體筋骨緩弱不仁

仍早辰常服炒黑豆淋酒

大聖一粒金丹

治中風昏仆舌強涎潮癱瘓偏枯

頑痙麻痺癲

癇倒地閉目作聲項強反張口噤直視

大川烏

炮

附子

炮去皮臍新羅

白附子各貳兩

川五靈脂

白僵蚕

炒去殼然備

白蒺藜各壹兩

白礬

朱砂

沒藥

麝香各半兩

右細末合和用松煙墨半兩新汲水磨汁搜圓每兩作陸圓
金箔貳伯片爲衣令自乾每服壹圓以生薑半兩取自然汁
磨開溫酒半盞調服蓋取微汗爲效

大鐵彈圓 治中風癱緩口眼喝斜筋骨攀夜肢體麻木

自然銅

燒紅醋淬朱次
壹兩半

虎脰膏

酒浸黃當歸
酒浸焙

白附子

炮

川烏

炮皮去

五靈脂

炒

麻黃

去節
各一錢

沒藥

乳香

全蝎

焙

安息香

白芷

直僵蚕

炒去絲
各半兩

烏蛇肉

酒浸焙乾
參分

木鱉

貳拾壹箇
去殼炒熟

朱砂

麝香

各壹分

右爲末以酒煮入飛白麪爲糊圓彈子大每壹圓溫酒磬下

酒磬下

鵝頭膏 治肝腎氣虛風入筋骨手足緩弱

小附子

去皮生草烏頭
炮去皮臍

蒼朮

炒

牛膝

酒浸炮川芎

當歸

天麻

各半兩

防已

白芷

黃耆

蜜炙

全蝎

各半兩

右末每壹錢黑豆淋酒調下兼用核桃肉研酒下食前服

宣木瓜

去穰切焙

天麻

剉

牛膝

剉燒

附子

剉炙

虎骨

斷炙各貳兩

右爲末用浸藥酒調麪糊圓桐子大每服參肆拾圓食則溫酒或豆淋酒下

方加蜜參分乳首沒藥五靈脂各半兩麝香壹錢名大四

用前湯下亦治脚氣

酒治諸風緩弱及歷節風骨節酸疼

虎胫骨

酥炙黃

右搥碎如米每服壹升以酒參升浸伍日空心服壹盞冷則暖之

鎖骨丹

鍼穿圓

方並風類治諸風緩弛其他用藥風類甚詳

○歷節風

歷節風論



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

歷節風

歷節風之狀短氣自汗頭眩欲吐手指攀曲身體腫痹其腫如脫漸至推落其痛如掣不能屈伸蓋由飲酒當風汗出入水或體虛膚空掩護不謹以致風寒濕之邪偏歷關節與血氣搏而有斯疾也其痛如掣者為寒多其腫如脫者為濕多肢節間黃汗出者為風多遍身走瘡微骨疼痛晝靜夜劇發如虫齶者謂之白虎歷節治法當以溫藥解其風寒濕之毒或用和平則獨丸或用白虎散也其白虎歷節遊走瘡痛虫齶為之况夫脾主肌肉虛則為癢遇癢而進飲食尚庶幾焉而虫亦饑厭其間不至於頻頻齒也書曰若藥弗瞑眩厥疾弗瘳似此證候一名厲風須當大作湯圓未可拘以平常淺近之劑

歷節風證治

虎膏散 治白虎歷節走注痒痛不得屈伸

虎胫骨酒末黃酒浸取一两半白花蛇肉酒浸取一两半黃芩

自然銅服醋以水煎服

防風

白附子炮

檳榔

官桂

當歸

羌活

牛膝

白芷

川芎

僵蚕

炒去絲各壹兩

全蝎

焙

地龍去土

乳香

沒藥

雄黃各半兩

麝香壹分

右末每服貳錢

食前以燙豆淋酒調下

雄蠅圓

治歷節風骨節疼痛攣急痺頑

安息香

五靈脂

天麻各半兩

地龍淨

白僵蚕

炒各全蝎

微炒

雄黃各半兩

麝香壹分

烏蛇肉

酒浸取

天雄炮去皮臍

當歸

川烏炮去皮臍

川芎

南星炮

官桂

虎胫骨

酒炙黃各壹兩

右末煉蜜杵圓桐子大每服拾伍圓食前溫酒下

獨活

草薢

川芎

當歸各參分

桃仁

去皮燒

天麻

川芎

當歸各參分

獨活

草薢

川芎

當歸各參分

桃仁

去皮燒

天麻

川芎

當歸各參分

牛膝

麻黃

去節

枳殼製

海桐皮

白芍藥

川烏

皮齊去

松節

防風

杜仲

舊製

甘草

炙各半兩

麝香

壹分

虎脰骨

酒炙黃壹兩

右麗末每服貳錢置伍片棗貳枚食前煎服

治歷節風水治脚氣

方見腰疼門

治白虎歷節遊走癢痛狀如虫噬

方見風類

治歷節諸風百節疼痛

方見風緩門

治惡風頭面肢體癱瘓癲癇

透明鋒芒硫黃

右每服參錢乳鉢內研細入醇酒再研空心飲其清者淳又研細入酒飲之連日如是硫黃能殺惡蟲自大便下

治手指彎曲骨節間痛甚

單麻子

去皮一兩

黃連

去鬚剉如瓦

右用新水貳升於磁瓶內浸貳藥蜜封柒日取出逐日侵晨

面東以浸藥水吞一粒染日後添兩粒微利不妨以
療大風亦效

風調身全無治大風厲風

川大黃

鋸紋根者
壹兩

獨生皂角刺

壹兩半

右末每服貳錢臨夜冷酒調下以淨桶伺候泄虫如虫口黑
色乃是多年虫口赤色是為方近三數日又進壹服直候無
虫則絕根也

瘧疹若與醋則風疹食入

神授圓治風寒濕合而為痺遍身或半身麻木不仁最能殺虫

方見虛勞門

用增味五虎湯下空心服

方見風類

白虎風走注養癰方

雞子揩患處呴參遍願送冀堆頭蓋白虎是冀神愛喫雞子
患者下飯用黃脚雞為妙亦可抱雞來壓之其癰自止

麝香圓

治白虎風歷節風游走疼痛遍身癰癧狀如虫齧晝靜

夜劇

方見風類

脚氣

脚氣方論

腎司於下一身之根本繫焉脚者腎之外候也夫人爲嗜欲所戕苦不自覺腎氣內虛真元不守凡驟立冷地久坐卑濕暴熱灌水凌晨覆霜感受四氣於冥冥之中不爲脚氣者鮮矣脚氣爲病雖起於足實周乎身或壯熱頭痛或身體冷疼或百節拘攣或十指走注或轉筋急痛或小腹不仁以至冒滿喘息煩悶怔忪昏憤羞明誤忘錯語腰痛下利嘔噦痰涎食氣惡聞見食即吐大便小便多是秘澁自腰至膝自胫及踝屈弱彊牽掣急酸疼或肢不伸或腫不腫皆其候也其自汗惡風無汗惡寒下寒乍熱傳足六經外證與傷寒類焉但卒然脚痛爲異耳治法究其所自來挾風者遊走有汗挾寒者掣痛攣疼挾暑者大渴熱煩挾濕者腫滿重滯其間四氣兼有則推其多者解之對病

施藥固在權衡然古人以此名為緩風謂其感於風毒所致則總治之法大要疏導大便使毒氣得泄而後愈但分劑不可過焉其補湯淋洗皆醫家之大戒也雖然脚氣治法以疏利毒氣為先蓋慮乎氣實而死矣然表裏之有異經冷熱之有異證或因他病而後發或致他病之續生又不可以不通其變所謂寒則溫之熱則寒之在表則散在裏則下太虛氣之扶養其中凝陰溫毒為之溫利是又胷中之活法矣其或療治不早使毒氣入復衝心攻築作痛喘滿上氣嘔吐異常此則漸入頗深或者自貽奄忽

脚氣證治

二十四味輕油膏治脚氣通用

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 當歸 <small>酒浸曬干</small> | 川芎 |
| 杜仲 <small>蜜製炒</small> | 石南葉 |
| 華陰細辛 | 枳殼 <small>各壹兩</small> |
| 蒼朮 <small>炒</small> | 薏苡仁 |
| | 大雞心檳榔 |
| | 五加皮 |

防風

獨活

續斷

洗熱

牛膝

酒浸鹽炒

威靈仙

海桐皮

木香

木瓜

麻黃

去節

川五靈脂

沒藥

別研

各三分

滴乳香

半兩

右細末酒浸雪糕爲圓糊子大每服伍拾圓細剉辣桂

制方

食前煎湯下或以

木瓜

煎湯下

木瓜散

脚氣通用

大腹

紫蘇

羌活

木香

伏苓

陳皮

甘草

各半兩

宣木瓜乾

壹兩

右細末每參錢薑鹽煎服

降氣湯

腳氣通用

半夏

真蘇子

微炒各五兩

當歸

厚朴

製

甘草

北前胡

各兩

肉桂

陳皮

各三兩

右剉散每參錢薑伍片棗兩煎服如無蘇子以蘇葉貳兩代之

檳榔散治風毒腳氣腫痛

橘葉

杉木節

右童子尿壹盞醇酒半盞煎陸分濃清乘熱調
食前服

方見風類

生木瓜圓脚氣通用

宣州生木瓜

龍帝切壹錢取出後以生艾葉塞滿合至四
竹針伸定蒸透去火其木瓜去皮研爛

右入生木瓜末和圓桐子大日乾每服柒拾圓食前醇酒下

止嘔治腳氣嘔逆吐瀉轉筋

宣木瓜壹味細剉每服肆錢新水煎服神効

止嘔治腳氣攻注手足不能牽

雞心大檳榔

右末每服參錢用茶葉連梗摘皮壹全箇不去白薑伍
片煎湯乘熱調下治腳氣健心痛悶用童尿煎服治腳心串
痛溫酒調下

海桐皮治風毒腳氣膝脛疼痛

海桐皮

五加皮

川獨活

枳殼

製

防風

杜仲

鹽製炒

牛膝

酒浸熟

薏苡仁

炒各半

生地黃

貞而半

右末用綿裹以醇酒壹斗春浸七日秋浸拾肆日每日空心溫服壹盞半前壹盞

杉皮治腳氣攻心痛悶脹滿不食

青皮

陳皮

天台烏藥

雞心檳榔

宣木瓜

乾杉木節

半夏

製

枳殼

製

縮砂仁

赤伏苓

各半

丁香

茴香

微炒

大腹皮

紫蘇子

微炒

羅荀子

微炒

北梗

甘草

各半

右剉每參錢薑伍片煎

方見山門

烏藥瀉氣散

方見

廩門

腳氣通用

發散疏導毒氣

枳殼(五
兩)

甘草(二
半)

右末每服貳錢濃煎水湯調下如要快利更加大黃

(一
錢)

治腳氣大便秘滯

麻仁(別研)

杏仁(浸去皮水
各五
兩半)

枳實(製)

厚朴(製)

芍藥(各半斤)

大黃(壹斤蒸切鹽)

右末煉蜜圓桐子大每貳拾圓食後熟水下或取姜散加大黃

(通)

大黃湯治腳氣風熱煩悶發渴大便不通

木香

大黃(各半
兩)黑豆(一
錢)煎水服

升麻(參分)

右剉每服參錢烏梅貳箇新水煎服

羌活(一
錢)

治腳氣熱多證疏泄風毒

桑白皮(炒
各半
兩)

雞心檳榔防風



郁李仁炒

大黃

生各二分

右判定散每服參錢黑豆百粒煎服熱甚大便祕更加大黃

敗毒散

方見寒類治腳氣熱證或自汗惡風則加葛根無汗惡寒

則加玄蔴又治風濕腳氣發熱煩躁加石膏

生各一錢半煎服

利爲效

附方

治腳氣胃熱煩燥嘔吐方見積熱門加烏梅煎

附方

治寒證腳氣加桂枝

附方

治腳氣入腹攻心嘔悶

附方

治血熱加甘草

炙

青木香

吳茱萸

溫洗半次炒

宣木瓜

真橘皮

紫蘇葉

雞心

枳榔各一兩

右判定散每服參錢薑伍片烏梅壹枚煎服

方見前吞散治腳氣衝心築痛嘔吐

附方

治腳氣寒證通用方見脹滿門

附方

治腳氣寒證通用方見脹滿門

方見前脹滿門治腳氣寒證

大生木瓜

就第切盡以正川酒去目溫末
細貴其小用於丹藥其益於孰

右研貳味爲圓桐子大每肆拾圓溫酒下扶虛用

核桃肉煎

湯下

治腳氣風多證

麻黃壹兩半 獸石膏貳兩 白朮壹兩 熟附子

甘草

炙

各半兩右剉散每服參錢薑伍片棗壹枚煎服

多用薑片治腳氣寒多證加

芍藥

治腳氣風多證方見脚氣門

加

芍藥

治寒證脚氣方並見暑門

加

芍藥

治風證脚氣無熱者皆可服最除風毒消

惡血

不是腰疼門

治風毒脚腫生瘡或筋攣痛重

石南葉

薏苡仁

杏仁

蜜炙去皮

牽牛

炒熟

大腹子

腹皮

川芎

川續斷

赤芍藥