

重刊巢氏諸病源候總論

十五



重刊巢氏諸病源候總論卷之四十四

婦人產後病諸候 下 凡四十一論

產後月水不利候

手太陽少陰之經主下為月水太陽小腸之經少陰心之經也心主血脈因產傷動血氣其後虛損未復而為風冷客於經絡冷搏於血則血凝澁故令月水不利也

產後月水不調候

夫產傷動血氣虛損未復而風邪冷熱之氣客於經絡乍冷乍熱冷則血結熱則血消故令血或多或少乍在月前乍在月後故為不調也

產後月水不通候

夫產傷動血氣其後虛損未平復為風冷所傷血之為性得

冷則凝結故風冷傷經血結於胞絡之間故今月水不通也
凡血結月水不通則變成血瘕水血相并後遇脾胃衰弱肌
肉虛者變水腫也

產後帶下候

帶下之病由任脉虛損任脉為經絡之海產後血氣勞損未
平復為風冷所乘傷於任脉冷熱相交冷多則白多熱多則
赤多也相兼為帶下也

又云帶下有三門一曰胞門二曰龍門三曰玉門產後屬胞
門謂因產傷損胞絡故也

產後崩中惡露不盡候

產傷於經血其後虛損未平復或勞役損動而血暴崩下遂
因淋瀝不斷時來故謂崩中惡露不盡凡崩中若小腹急滿
為內有瘀血不可斷之斷之終不斷而加小腹脹滿為難矣

產後諸病

若無瘀血則可斷易治也

產後利候

產後虛損未平復而起早傷於風冷風冷乘虛入於大腸腸虛則泄故令利也產後利若變為血利則難治泄謂之產子利也

產後利腫候

因產勞傷榮衛脾胃虛弱風冷乘之水穀不結大腸虛則洩成利也利而腫者脾主土候肌肉土性本剋水今脾氣衰微不能剋消於水水氣流溢散在皮膚故令腫也

產後虛冷洞利候

產勞傷而血氣虛極風冷乘之入於腸胃腸胃虛而暴得冷腸虛則泄遇冷極虛故變洞利也

產後滯利候

產後虛損冷熱之氣客於腸間熱乘血血滲於腸則赤冷搏腸間津液則變白其冷熱相交故赤白相雜連滯不止故謂滯利也

產後冷熱利候

產後臟虛而冷熱之氣入於腸胃腸虛則泄故成冷熱利凡利色青與白為冷黃與赤為熱不止熱甚則變生血冷極則生白膿膿血相雜冷熱不調則變滯利也

產後客熱利候

產後臟虛而熱氣乘之熱入於腸腸虛則洩故為客熱利色黃是也熱甚則黃赤而有血也

產後赤利候

赤利血利也因產後血虛為熱氣所乘熱搏血滲入腸腸虛而洩為血利凡血利皆是多熱熱血不止蘊瘀成膿血利也

產後血利候



產後陰下脫候

產而陰脫者由宿有虛冷因產用力過度其氣下衝則陰下脫也

產後陰道痛腫候

臟氣宿虛因產風邪乘於陰邪與血氣相搏在其腠理故令痛血氣為邪所壅否故腫也

產後陰道開候

子臟宿虛因產冷氣乘之血氣得冷不能相榮故令開也

產後遺尿候

因產用氣傷於膀胱而冷氣入胞囊胞囊缺漏不禁小便故遺尿多因產難所致

產後淋候

因產虛損而熱氣客胞內虛則起數熱則洩少故成淋也

產後渴利候

渴利者渴而引飲隨飲隨小便而謂之渴利也膀胱與腎爲表裏膀胱爲津液之府婦人以腎繫胞產則血水俱下傷損腎與膀胱之氣津液竭燥故令渴也而腎氣下通於陰腎虛則不能制水故小便數是爲渴利也

產後小便數候

胞內宿有冷因產氣虛而冷發動冷氣入胞虛弱不能制其小便故令數

產後尿血候

夫產傷損血氣血氣則虛而挾於熱搏於血血得熱流散滲於胞故血隨尿出是爲尿血

產後大小便血候

夫產傷動血氣腑臟勞損血傷未復而挾於熱血得熱則妄

行大腸及胞囊虛者則血滲入之故因大小便而血出也

產後大小便不通候

大小腸宿有熱因產則血水俱下津液暴竭本挾於熱大小腸未調和故令大小便澀結不通也

產後大便不通候

腸胃本挾於熱因產又水血俱下津液竭燥腸胃否澀熱結腸胃故大便不通也

產後小便不通候

因產動氣氣衝於胞胞轉屈辟不得小便故也亦有小腸本挾於熱因產水血俱下津液竭燥胞內熱結則小便不通也然胞轉則小腹脹滿氣急絞痛若虛熱津液竭燥者則不甚張急但不通津液生氣和則小便也

產後小便難候

產則津液空竭血氣皆虛有熱客於胞者執停積故小便否澀而難出

產後嘔候

胃為水穀之海水穀之精以為血氣血氣榮潤腑臟因產則腑臟傷動有血虛而氣獨盛者氣乘腸胃腸胃燥澀其氣則逆故嘔不下食也

產後欬嗽候

肺感微寒則成欬嗽而肺主氣因產氣虛風冷傷於肺故令欬嗽也

產後時氣熱病候

四時之間忽有非節之氣而為病者謂之時氣產後體虛而非節之熱氣傷之故為產後時氣熱病也診其脉弦小者足溫則生足寒則死凡執病脉應浮滑而懸急以為不順手足

溫而反冷爲四逆必死也

產後傷寒候

觸冒寒氣而爲病謂之傷寒產婦血氣俱虛日月未滿而起早勞動爲寒所傷則蓄蓄惡寒吸吸微熱數日乃歇重者頭及骨節皆痛七八日乃瘥也

產後寒熱候

因產勞傷血氣使陰陽不和互相乘剋陽勝則熱陰勝則寒陰陽相加故發寒熱凡產餘血在內亦令寒熱其腹時刺痛者是也

產後瘧候

大瘧者由夏傷於暑客在皮膚至秋因勞動血氣腠理虛而風邪乘之動前暑熱止邪相擊陰陽交爭陽盛則熱陰盛則寒陰陽更盛故發寒熱陰陽相離則寒熱俱歇若邪動氣至

交爭復發故瘧休作有時其發時節漸晏者此由邪客於風府邪循脊而下衛氣一日一夜常大會於風府其明日下一節故其作日晏其發早者衛氣之行風府日下一節二十一日至尾骶二十二日入脊內上注於伏衝之脈其行九日出於缺盆之內其氣既上故其病發更早其間日發者由邪氣內薄五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能日作故間日蓄積乃發產後血氣損傷而宿經傷暑熱今因產虛復遇風邪相折陰陽交爭邪正相干故發作成瘧也

產後積聚候

積者陰氣五臟所生聚者陽氣六腑所成皆由飲食失節冷熱不調致五臟之氣積六腑之氣聚積者痛不離其部聚者其痛無有常處所以然者積為陰氣陰性沈伏故痛不離其部聚為陽氣陽性浮動故痛無常處產婦血氣傷損臟虛



弱爲風冷所乘搏於臟腑與氣血相結故成積聚也

產後癥候

癥病之候腹內塊按之牢強推之不移動是也產後而有癥者由臟虛餘血不盡爲風冷所乘血則凝結而成癥也

產後癖候

癖病之狀脅下弦急刺痛是也皆由飲食冷熱不調停積不消所成產後臟虛爲風冷搏於停飲結聚故成癖也

產後內極七病候

產後血氣傷竭爲內極七病則舊方所云七害也一者害食二者害氣三者害冷四者害勞五者害房六者害任七者害睡皆產時傷動血氣其後虛極未平復犯此七條而生諸病凡產後氣血內極其人羸瘦萎黃冷則心腹絞痛熱則肢體煩疼經血否澀變爲積聚癥瘕也

產後目瞑候

目不痛不腫但視物不明謂之目瞑肝藏血候應於目產則血虛肝氣不足故目瞑也

產後耳聾候

腎氣通耳而婦人以腎繫胞因產血氣傷損則腎氣虛其經爲風邪所乘故令耳聾也

產後虛熱口生瘡候

產後口生瘡者心藏虛熱心關竅於口而主血脈產則血虛臟有客熱氣上衝胃腸重發於口故生瘡也

產後身生瘡候

產則血氣傷損腠理虛爲風所乘風邪與血氣相搏臟腑上熱重發肌膚故生瘡也

產後乳無汁候

產後乳無汁候

婦人手太陽少陰之脉下爲月水上爲乳汁任娠之人月水不通初以養胎既產則水血俱下津液暴竭經血不流故無乳汁也

產後乳汁溢候

婦人手太陽少陰之脉上爲乳汁其產雖血水俱下其經血盛者則津液有餘故乳汁多而溢出也

重刊巢氏諸病源候總論卷之四十四

無所傾軋... 入本太... 垂對... 入本太... 入本太...

重刊巢氏諸病源候總論卷之四十五

小兒雜病諸候

凡二十九論

養小兒候

經說年六歲已上爲小兒十八已上爲少年二十已上爲少年五十已上爲老年也其六歲已還者經所不載是以乳下嬰兒病難治者皆無所承按故也中古有巫方立小兒顙顙經以占夭壽判疾病死生世所相傳有小兒方爲逮乎晉宋推諸蘇家傳襲有驗流於人間小兒始生肌膚未成不可暖衣暖衣則令筋骨緩弱宜時見風日若都不見風日則令肌膚脆軟便易傷損皆當以故絮著衣莫用新綿也天和暖無風之時令母將抱日中嬉戲數見風日則血凝氣剛肌肉硬密堪耐風寒不致疾病若常藏在幃帳之內重衣溫暖譬如

陰地之草木不見風日軟脆不任風寒又當薄衣薄衣之法
當從秋習之不可以春夏卒減其衣則令中風寒從秋習之
以漸稍寒如此則必耐寒冬月但當著兩薄襦一複裳耳非
不忍見其寒適當佳耳愛而暖之適所以害也又當消息無
令汗出汗出則致虛損便受風寒晝夜寤寐皆當慎之其飲
乳食哺不能無痰癖常當節適乳哺若微不進仍當將護之
凡不能進乳哺則宜下之如此則終不致寒熱也又小兒胎
生生氣尚盛無有虛勞微惡則須下之所損不足言及其愈
病則致深益若不時下則成大疾疾成則難治矣其冬月下
之難將護然有疾者不可不下夏月下之後腹中常當小脹
喘故當節哺乳將護之數日間又節哺之當令多少有常劑
兒稍大食哺亦當稍增若減少者此是腹中已有小不調也
便當微將藥勿復哺之但當寬之甚者十許日輕者五六日

