

傷寒論綱目十一

傷寒卒病論序

漢長沙守南陽仲景張機著

余每覽越人入虢之診望齊侯之色未嘗不慨然歎其才秀也怪當今居世之士曾不留神醫藥精究方術上以療君親之疾下以救貧賤之厄中以保身長全以養其生但競逐榮勢企踵權豪孜孜汲汲惟名利是務崇飾其末忽棄其本華其外而悴其內皮之不存毛將安附焉卒然遭邪風之氣嬰非常之疾患及禍至而方震慄降志屈節欽望巫祝告窮歸天東

乎愛敵貴百年之壽命持至貴之重器委付凡醫恣其所措咄嗟嗚呼厥身以斃神明消滅變爲異物幽潛重泉徒爲啼泣痛夫舉世昏迷莫能覺悟不惜其命若是輕生彼何榮勢之云哉而進不能愛人知人退不能愛身知己遇災值禍身居厄地蒙蒙昧昧蠢若遊魂哀乎趨世之士馳競浮華不固根本忘軀徇物危若冰谷至于是也余宗族素多向餘二百建安紀年以來猶未十稔其死亡者三分有二傷寒十居其七感往昔之淪喪傷橫天之莫救乃勤求古訓博

采衆方撰用素問九卷八十一難陰陽大論胎臚藥
錄并平脈辨證爲傷寒雜病論合十六卷雖未能盡
愈諸病庶可以見病知源若能尋余所集思過半矣
夫天布五行以運萬類人稟五常以有五藏經絡府
俞陰陽會通玄冥幽微變化難極自非才高識妙豈
能探其理致哉上古有神農黃帝岐伯伯高雷公少
俞少師仲文中世有長桑扁鵲漢有公乘陽慶及倉
公下此以往未之聞也觀今之醫不念思求經旨以
演其所知各承家技終始順舊省疾問病務在口給

相對斯須便處湯藥接寸不及尺握手不及足人迎
跌陽三部不參動數發息不滿五十短期未知決診
九候曾無髣髴明堂闕庭盡不見察所謂窺管而已
夫欲視死別生實爲難矣孔子云生而知之者上學
則亞之多聞博識知之次也余宿尚方術請事斯語



傷寒卒病論

辨太陽病脈證

太陽之爲病脈浮頭項強痛而惡寒

太陽病發熱汗出惡風脈緩者名爲中風

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脈陰

陽俱緊者名爲傷寒

傷寒一日太陽受之脈若靜者爲不傳煩欲吐若躁

煩脈數急者爲傳也

傷寒二三日陽明少陽證不見者爲不傳也

傷寒論

太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病若發汗已身灼
熱者名曰風溫風溫爲病脉陰陽俱浮自汗出身重
多眠睡息必鼾語言難出若被下者小便不利直視
失溲若被火者微發黃色劇則如驚癇時瘵瘵若火
熏之一逆尚引日再逆促命期

瘵音記瘵音縱

病有發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也
發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數
六故也

太陽病頭痛至七日以上自愈者以行其經盡故也

若欲作再經者、鍼足陽明、使經不傳則愈。

太陽病欲解時、從巳至未上。

風家表解而不了了者、十二日愈。

病人身大熱、反欲得近衣者、熱在皮膚、寒在骨髓也。

身大寒、反不欲近衣者、寒在皮膚、熱在骨髓也。

太陽中風、陽浮而陰弱、陽浮者熱自發、陰弱者汗自

出、嗇嗇惡寒、淅淅惡風、翕翕發熱、鼻鳴乾嘔者、桂枝

湯主之。

太陽病頭痛、發熱、汗出惡風者、桂枝湯主之。

太陽病項背強几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯

主之

几音殊

太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯若不上衝

者不得與之

太陽病三日已發汗若吐若下若溫鍼仍不解者此

爲壞病桂枝不中與也觀其脉證知犯何逆隨證治

之

桂枝本爲解肌若其人脉浮緊發熱汗不出者不可

與之常須識此勿令誤也



若酒客病不可與桂枝湯得之則嘔以酒客不喜甘故也

喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳

凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血也

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之

太陽病下之後脉促胸滿者桂枝去芍藥湯主之若微寒者桂枝去芍藥加附子湯主之

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其

人不嘔清便欲自可一日二三度發脉微緩者爲欲愈也脉微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必痒宜桂枝麻黃各半湯

更去聲

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府卻與桂枝湯則愈

服桂枝湯大汗出脉洪大者與桂枝湯如前法若形似瘧日再發者汗出必解宜桂枝二麻黃一湯

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者白虎加



人參湯主之

太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者此無陽也不
可發汗宜桂枝二越婢一湯

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下
滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之
傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與
桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆
者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更
作芍藥甘草湯與之其脚卽伸若胃氣不和譫語者

少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之
讞尼兼切音讞

問曰證象陽旦按法治之而增劇厥逆咽中乾兩脛拘急而讞語師言夜半手足當溫兩脚當伸後如師言何以知此答曰寸口脉浮而大浮爲風大爲虛風則生微熱虛則兩脛攣病形象桂枝因加附子參其間增桂令汗出附子溫經亡陽故也厥逆咽中乾煩躁陽明內結讞語煩亂更飲甘草乾薑湯夜半陽氣還兩足當熱脛尚微拘急重與芍藥甘草湯爾乃脛

伸以承氣湯微溏則止其譫語故知病可愈
太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之

太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主

之

太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解

也喘而汗出者葛根黃連黃芩湯主之

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而

喘者麻黃湯主之

太陽與陽明合病。喘而胸滿者不可下。宜麻黃湯。

太陽病十日以去。脈浮細而嗜臥者。外已解也。設胸

滿脇痛者。與小柴胡湯。脈但浮者。與麻黃湯。

太陽中風。脈浮緊。發熱惡寒。身疼痛。不汗出而煩躁。

者。大青龍湯主之。若脈微弱。汗出惡風者。不可服。服

之則厥逆筋惕肉瞤。此爲逆也。

瞤音瞤

傷寒脈浮緩。身不疼。但重。乍有輕時。無少陰證者。大

青龍湯發之。

傷寒表不解。心下水氣乾嘔。發熱而欬。或渴。或利。

或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之
傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者
此寒去欲解也小青龍湯主之

太陽病外證未解脉浮弱者當以汗解宜桂枝湯

太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏仁

湯主之

人同仁

太陽病外證未解不可下也下之爲逆欲解外者宜

桂枝湯

太陽病先發汗不解而復下之脉浮者不愈浮爲在



外而反下之故令不愈今脉浮故知在外當須解外則愈宜桂枝湯

太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在、此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之

太陽病脉浮緊發熱身無汗自衄者愈

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷者不可下下之爲逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者