

醫學小叢書

猩紅熱

商務印書館叢行

醫 學 小叢 書

猩

顧胡
壽定
白安
校編

紅

商務印書館發行

熱

中華民國十一年四月初版
中華民國二十三年九月國難後第二版

(6243.1)

小醫學 猩紅熱一冊

每册定價大洋壹角伍分
外埠酌加運費匯費

編纂者 胡定安 白壽顧

***** 版權所有必究 *****

校閱者 兼發行者 發行所
上海及各埠
商務印書館
上海河南路
商務印書館
一九七六年上

目 錄

一 傳染病之警告.....	一
二 猩紅熱的病原.....	四
三 猩紅熱傳染的路徑.....	五
四 猩紅熱的病狀.....	八
五 猩紅熱的主要診斷法.....	一八
六 猩紅熱的經過和豫後.....	二一
七 猩紅熱的治法.....	二三
八 猩紅熱的預防法.....	二六

猩紅熱

一 傳染病之警告

諸君一天一天在世界上過生活。覺得處處地方都有危險的機會。并且要時時刻刻留心去防着種種的危險。譬如水火槍炮。人家都知道他是要害生命的。這種顯而易見的危險還能夠使大家特別注意。因此就想出種種方法去防備他。但是對於傳染病却大不然。

可憐我們中國醫學還沒有發達。一般人民頭腦裏却都沒有普通的衛生智識。講什麼微生物是要害人性命的。大家都不能信服。就是對他細

細地說明一切的危險。在事實上仍舊還是不能實行。這因為微生物是眼睛不能看到的。不像那水火槍炮這樣彰明較著。所以不能夠引起大家十分的注意。還有一層。譬如人家看到一個觸電而死的人。往往心裏怦的一驚。因為死的時間非常快的緣故。就是毛病當中像夏天常常流行的霍亂。也是受了傳染之後立刻要害命的。所以人家比較的也格外留心一點。還能夠互相警戒。設法預防。同是一種傳染病。因得病致死的時間有長短。大家對這病的注意程度也就有差異了。近年來社會上的空氣稍為新鮮些了。一般上等社會也都曉得各種傳染病的危險了。遇到一種傳染病流行底時候。也知道趁早到醫生那裏去打預防針。吃預防藥。所以傳染病流行底時候。把死亡人數統計起來。還是貧民占了大多數。這是一因他們的生計已經日不暇給了。那裏還有錢去設法預防。那天花流行底時候。還有幾

個慈善機關施種牛痘。霍亂流行底時候，還有幾個防疫醫院把他們醫治療養。至于其餘幾種傳染病流行底時候，却是沒有施送預防注射的慈善機關了。一因貧民的生活既然低劣，衛生智識更是茫然。幾種發生疾病的主條件都齊備了，所以碰到傳染病流行，他們就不得不做前驅的犧牲者了。但是從社會公衆衛生上說起來，倘使他們的死亡數多起來，即使預防的十分精密，要想防止傳染和蔓延，實在是不容易辦到的。這樣看來，傳染病對於我們的生命，豈非有莫大的危險麼。

傳染病當中，近年來我們中國北方常常鬧的就是鼠疫，南方常常鬧的就是霍亂、猩紅熱、爛喉痧、天花，還有幾種雖則並不絕迹，但是比較的不蔓延起來，所以也不注重去預防他。

大凡春秋兩季當着氣候乾燥底時候，在通商口岸人烟稠密的地方，

常常流行猩紅熱、爛喉痧等危險的傳染病。現在鄙人趁着這種毛病要起來底時候，把猩紅熱的原委以及種種療治的方法和預防的方法一一說明，使大家看到了這個病名，就知道是害人的危險毛病，輾轉相傳，就是對於貧民不識字的。我們也願負勸導的責任，那不但一方面對於自己預防上得到安穩的利益，就是他方面社會上也可得一種衛生底進步，這不是一舉兩得麼。

二 猩紅熱的病原

猩紅熱俗名紅斑痧，因為一起病就要發熱，還要生出固有的紅疹，是一種很利害的急性傳染病。常常侵犯咽頭和腎臟。他的主要病原體現在

還沒有決定。究竟是那一種微生物。但是往往在血中、咽頭、扁桃腺、可以證明連鎖狀球菌。並且在許多地方也是狠相像的。所以知道他的病毒是存在於組織、體液、分泌物、排泄物、以及血液、眼淚、鼻涕、痰、皮膚落屑的當中。這病的傳染力剛剛在落屑的時候最强。而且長時的持續。狠難斷根絕種。所以對這病不設法防止。那就容易蔓延起來了。

三 猩紅熱傳染的路徑

猩紅熱這個病。現在都知道他是接觸傳染的。雖則他的病原體還沒有確定。但是有許多的證明。差不多已經相近快了。所以他的傳染的路徑。也是和他種傳染病一樣的。從一切使用物品。譬如衣服、寢具、飲食器具等。

倘若有了病毒附着。那就有傳染的機會。並且因為他可以由空氣的媒介而感染病毒。所以在病室裏服侍病人。或則到這個毛病流行的地方。都有傳染的危險。

有了傳染的機會。這病毒常常從喉嚨旁邊兩個扁桃腺裏進去。就因此釀成這種狠危險的猩紅熱。但是也有從皮膚受損傷的地方跑進去的。大凡交通利便的地方。人烟稠密的地方。因為這病毒可以從空氣裏傳播。所以蔓延起來格外快些。像那工廠、學校、兵營以及人羣集合的地方。只要一個人害了這個病。倘使不趕緊去撲滅他。那就同火燒一樣。越燒越利害起來。去年杭州女子師範學校爲了這個毛病。因之停課了好多日子。這是一個明明白白地證據。還有俗語說「這毛病要過人的」。既然知道他是要過人的。不去想個免掉這種過人毛病底方法。這不是大大的危

險麼。大概因為大家還不曉得這過人的原因。所以也就不大留心了。我現在明明白白地講了出來。怎樣是要過人的。怎樣可以防避的。倘若已經害了這個病。又要怎樣去醫治他。遇着流行底時候。怎樣可以使他不蔓延起來。這許多問題都容易解決的。最要緊的就是先要明白這個毛病所以過人的道理。那就可以想法防備了。

而且這種毛病喜歡在繁盛的地方發展他的勢力。所以通商大埠。工廠林立。煤氣滿天。空氣既然不乾淨。並且還要做種種不規則的生活。抵抗力自然不強大。那過人的原由。也是不十分明白。這就是容易害這病的大原因。

這個毛病並且和年齡也是狠有關係的。兩歲至五歲的小孩最多。在一歲未滿的很少。四十五歲以後更比較的少。青年的人比較容易犯着。

四 猩紅熱的病狀

人體受了病毒。并不立刻就發病。還要經過一定時候。纔發動起來。最短隔一二天。最長隔兩星期。這個期間稱爲潛伏期。就是說這病毒躲在身體裏面的時期。

這潛伏期過完。病就要發作起來了。這就稱爲前兆期。在這個時候。身上非常怕冷。反覆幾次。連着就發熱起來。熱度越昇越高。（若是小孩就要發全身痙攣。抽筋縮脈的症候。）同時又發頭痛、恶心、嘔吐、精神恍惚、咽頭灼熱、嚥物覺痛各症候。頸腺也腫脹起來。

經過這樣難受的苦痛之後。發熱很氣。同日或第二天。就有紅疹發出。

這稱爲發疹期。這紅疹從項頸上先發現。其次就到四肢的伸側。又蔓延到關節和手脚上面。頭上和臉上很少。而頤部和口唇周圍更是無疹。這疹子的狀態是猩紅色的像帽針頭那樣大的小斑。稍爲有點高起。而且各疹子融合起來。變爲範圍很廣的潮紅。

咽頭粘膜和扁桃腺的紅腫狠利害。稱爲猩紅熱性口峽炎。那最重的這些地方竟至於壞死。稱爲壞死性口峽炎。或者像喉風一樣。上面生一張假膜。稱爲猩紅的喉風。這是極危險的症候。到那時候。熱度越發昇高。差不多要達到四十一度的以上。並且這時候舌的狀態非常特別。所以應當注意。起初舌上面生灰白色或白色的苔。一天一天漸漸地剝脫下來。現深紅色。舌的乳頭像有刺的樣子。其形狀宛如覆盆子（很像楊梅的一種菓實）。所以稱爲覆盆子舌。但是又像貓的舌頭。所以又稱爲貓舌。在害猩紅熱的

時候這算是一個特異的症候。

經過三天到五天那皮膚上的疹子漸漸退色到了第六日就可完全消失了於是皮膚上就落屑起來這落屑也是從項頸上落起有的像糠粃一樣有的像膜一樣這叫做糠粃樣落屑和膜樣落屑這時候就叫做落屑期同時咽頭的紅腫和身體上各處腫脹的淋巴腺也漸漸地退減了發熱亦漸次低降了但這落屑期的持續是不定的大約要兩個星期的長久這時候很容易傳染人家。

還有別的症候在眼裏發結膜炎在呼吸器發支氣管炎所以有時還有點咳嗽。

以上所說的症候是一般的症狀現在再把部分的變化細細地分別說明一下。

一、發熱 起初熱度就立刻昇騰到三十九度以上。到了第二天再昇高一點。這熱在發疹的全盛期常常稽留不退。等到疹子褪色。同時熱度也慢慢地下降。通常要九天到十二天才下降。倘使到第二星期還不退熱。那便是有別的毛病併發了。

害猩紅熱的時候。不發熱的很少。脈搏也很多。有熱的時候。計算起來大約每分鐘有一百二十至一百五十跳以上。有時有心臟衰弱的危險。

二、發疹 痒子像帽針頭的那樣大。起初是鮮紅色。以後變爲紅色。從周圍高起。增大很快。所以疹子和疹子的中間。起初還有健康的皮膚。到後來因爲他增大起來。就融合在一塊兒。成爲一種廣汎的紅色。和塗了紅墨水的一樣。發疹的部位。先在鎖骨下面和項頸上發生。一天以內。就快快地蔓延到臉上。頭上。軀幹。臂膊。和大腿上去。他的頂特別的樣子。就是頰部雖

現潮紅。但是口圍地方還是蒼白的。關節伸側地方。疹子更是顯露。試把一種鈍的東西。在紅疹上面劃了一劃。就留了一條白線。發疹利害底時候。并且還有痒痛。也有發疹部生了一種透明的小水疱的。這就叫做粟粒性猩紅熱。往往水疱再增大。變了大水疱。這叫做天疱狀猩紅熱。若是更加利害。發生點狀或斑狀的出血。那就叫做出血性猩紅熱。也有疹子並不瀰漫。而呈一種不正形的斑紋的。這叫做斑紋性猩紅熱。皮膚的潮紅不多時就消退的。叫做奔竄性猩紅熱。不發疹的叫做無疹性猩紅熱。因為發疹的樣子不同。就分出這許多種的猩紅熱。

還有皮膚上疹子剛剛蔓延底時候。腋窩和鎖骨底下。還有那鼠蹊部地方底淋巴腺。也同時輕度的腫脹起來。並且脾臟也是要腫大的。

三、口腔病 那口峽炎的症狀。差不多是免不了的。這叫做猩紅熱性。

口峽炎。也有不發那種口峽炎的。就叫做無口峽炎。猩紅熱這口峽炎往往變壞。就成了前面所說的猩紅熱喉風。這種喉風和真正的喉風有時很難區別。不過猩紅熱的時候所生的假膜是褐色的。並且柔軟容易破碎。零零星星的可以剝離下來。不像真正喉風的帶黃灰白色比較的硬固的假膜。還有猩紅熱喉風的壞死。直達到深部組織裏。但是並不蔓延到喉頭和氣管枝。也不發癩痺的症狀。這都是和真正喉風不同的地方。倘若還有懷疑的時候。可以用顯微鏡驗看有沒有喉風微生物。那就更可明白了。

此外壞死的地方。往往潰爛化膿。膿血從口鼻流出。臭不可近。也有懸壅垂（俗稱小舌頭）爛斷的。也有口蓋帆穿孔的。也有口鼻粘膜出血不止的。那變了壞死底部分都變成黑綠色而軟化了。

項頸裏的淋巴腺。因為口峽炎的緣故腫脹起來。那壞死性的變化。往