

美国和加拿大发放的大豆栽培
品种的系谱和特征特性

吉林省农业科学院

《国外农学—大豆》编辑部

1981年11月印

美国和加拿大发放的大豆栽培品种的系谱和特征特性

品 种 原 名	中 文 名 称	成 熟 期 组	系 谱 (中 文)	引 入 年 份	命 放 名 年 或 发 份	花 色	荚 色	种 皮 色	脐 色	茸 毛 色	茸 毛 类 型	细 斑 点 菌 病	细 斑 疹 菌 病	灰 斑 病	灰 斑 小 种 生 2	锈 病	褐 斑 病	霜 霉 病	褐 茎 腐 病	英 枯 萎 病	疫 根 腐 病
Acadian	阿卡黛安	Ⅷ	P.I.60406×F.C.04910	1908	1943	紫	褐	黄	褐	黄褐	正常	—	中	—	—	高感	—	—	—	—	抗
Acme	艾克姆	0 0	选自帕戈达		1953	"	"	"	黄	灰	正常	感	"	感	感	"	高感	抗	抗	—	—
Ada	艾 达	0 0	梅里特×诺尔曼		1972	白	"	"	"	"	正常	高抗	感	高感	"	—	中	—	—	—	异质
Adams	亚当斯	Ⅱ	伊利尼×邓菲尔德		1948	"	黄褐	"	浅黄	"	正常	抗	"	抗	"	高感	—	中	感	抗	感
Adelphia	阿德尔菲	Ⅱ	肯特的姊妹系×亚当斯		1964	"	"	"	"	"	正常	感	"	—	"	—	抗	"	中	"	"
Agate	玛 瑙	0 0	P.I.81037 (来自日本札幌)	1929	约1939	"	褐	"	红褐	黄褐	正常	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	"
A.K. (F.C.30761)	A.K. (F.C. 30761)	Ⅳ	选自A.K.	1912	约1940	"	"	"	褐	"	正常	—	—	—	—	"	—	—	—	—	"
A.K. (Harrow)	A.K. (哈罗)	Ⅱ	"		约1940	"	"	"	"	"	正常	—	—	—	—	"	—	—	—	—	抗
A.K. (Kansas)	A.K. (堪萨斯)	Ⅱ	"		约1949	紫	"	绿	"	淡黄褐	正常	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	"
Aksarben	阿克萨本	Ⅰ	来自中国东北 Fakumen	1918	约1925	"	黄褐	黄	黄	灰	正常	—	—	—	—	"	—	—	—	—	感
Altona	阿尔塔那	0 0	P.I.194654×福拉姆表		1966	"	褐	"	黑	黄褐	正常	高抗	感	—	中	—	感	高抗	感	高感	抗
Amsoy	阿姆索	Ⅱ	亚当斯×哈罗索		1965	"	黄褐	"	黄	灰	正常	中	中	—	高感	—	抗	抗	抗	—	感
Amsoy 71	阿姆索 71	Ⅱ	阿姆索 ⁸ ×(黑鹰×哈罗索)		1970	"	"	"	"	"	正常	感	"	感	"	—	"	中	中	抗	抗
Anoka	阿诺卡	Ⅰ	柯林×(林肯 ² ×里奇兰德)选系		1970	"	褐	"	黑	黄褐	正常	抗	感	—	"	—	—	高抗	抗	—	感
Aoda	奥 达	Ⅳ	P.I.81043 (来自日本函馆)	1929	约1939	"	"	绿	浅黄	灰	正常	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	"
Arisoy	艾里索	Ⅷ	P.I.86736 (来自日本Konosu)	1908	1930	"	"	黄	褐	黄褐	正常	—	抗	—	—	"	—	—	—	—	抗
Arksoy	阿克索	Ⅷ	P.I.37335 (来自朝鲜平壤)	1914		白	黑	"	"	灰	正常	—	高感	高抗	—	高感	—	抗	—	—	"
Arlington	阿林顿	Ⅴ	P.I.22899 (来自中国保定市)	1908	约1910	紫	褐	黑	黑	"	正常	—	"	—	—	—	—	—	—	—	感
Armredo	阿姆雷多	Ⅱ	选自马雷多		1942	白	黑	黄	"	黄褐	正常	—	感	高抗	—	高感	—	高抗	—	—	抗
Austin	奥斯汀	Ⅴ	P.I.17263 (来自朝鲜平壤)	1901	约1910	"	黄褐	"	褐	灰	正常	—	高感	—	—	—	—	—	—	—	"
Avoyelles	阿沃伊利斯	Ⅷ	奥图坦去杂		1932	紫	褐	黑	黑	黄褐	正常	—	中	—	—	高感	—	—	—	—	"
A-100	A-100	Ⅰ	不 详		1959	白	"	黄	浅黄	灰	正常	中	"	抗	感	—	中	感	抗	中	感

品 种 原 名	中 文 名 称	成 熟 期 组	系 谱 (中 文)	引 入 年 份	命 放 年 份 名 或 份	花 色	莢 色	种 皮 色	脐 色	茸 毛 色	茸 毛 类 型	细 斑 菌 病	细 斑 疹 菌 病	灰 斑 病	灰 斑 小 生 2	锈 病	褐 斑 病	霜 霉 病	褐 茎 腐 色 病	英 萎 茎 病	枯 萎 病	疫 根 腐 霉 病
Bansei	斑 塞	I	P.I.81031 (来自日本札幌)	1929	1936	紫	褐	黄	黄	灰	正常	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	—	感
Bansei (Ames)	斑 塞 (艾姆斯)	I	选自斑塞			"	"	"	黄	灰	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一 抗
Barchet	巴切特	VI	P.I. 23232 (来自中国上海)	1908	1923	紫	黄褐	褐	褐	黄褐	"	—	抗	—	—	高感	—	—	—	—	—	感
Bavender Special	巴文德专用	II	沈阳×来自北卡罗来纳州的一个品系		1945	"	褐	黄	黑	"	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	—	"
Bavender special A	"	A	巴文德专用的姊妹系		1967	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	"
Bavender Special B	"	B	"		1967	白	"	"	褐	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	"
Bavender Special C	"	C	"		1967	紫	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	"
*Beeson	比 松	I	C 1253×肯特		1968	"	"	"	不全黑	灰	"	中	感	—	抗	—	中	抗	高感	中	抗	抗
Bethel	贝瑟尔	IV	F.C.33243×佩里		1961	白	"	"	黄	"	"	感	"	抗	感	高感	—	中	感	中	抗	感
Bienville	比恩维尔	VI	佩利坎 2 号×奥格登		1958	紫	黄褐	"	暗褐	黄褐	"	—	中	中	—	—	—	—	—	—	—	一 感
Biloxi	比洛克西	VI	P.I.23211 (来自中国Tangsi)	1908	约1917	"	"	褐	褐	"	"	—	感	—	—	高感	—	—	—	—	—	感
Black Eyebrow	黑眼眉	I	P.I.30744 (来自中国东北乌拉街)	1911	约1917	白	褐	"	黑	"	"	—	感	感	感	高感	—	高感	感	中	抗	抗
Blackhawk	黑 鹰	I	沈阳×里奇兰德		1949	"	"	黄	浅黄	灰	"	中	感	感	感	高感	—	高感	感	中	—	一 抗
Bombay	博姆贝	I	不 详		1966	紫	"	"	黄	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一 抗
*Bonus	邦纳斯	IV	C 1266 R×C 153		1971	"	"	"	不全黑	"	"	感	中	高感	高感	—	中	感	高感	抗	—	一 抗
Boone	布 恩	IV	P.I.56543—3 (来自中国东北 Jangchiangko)	1921	1930	白	"	"	浅黄	"	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	—	一 抗
Bossier	博西尔	VI	选自品种李		1962	紫	黄褐	"	黑	褐	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一 抗
*Bragg	布雷格	VI	杰克逊×D49—2491		1963	白	褐	"	"	黄褐	"	—	高抗	抗	—	—	—	抗	—	—	—	一 抗
Burwell	伯韦尔	I	不 详		1933	紫	"	黑	"	"	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	—	一 抗
*Calland	卡兰特	II	C 1253×肯特		1968	"	"	黄	"	"	"	高抗	感	—	高感	—	抗	中	高感	抗	—	感
Capital	首 都	0	171(中国东北引种材料)×A.K.(哈罗)		1944	"	"	"	黄褐	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	感
Carlin	卡 林	IV	邓菲尔德去杂		1948	"	"	灰	灰	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	—	抗—感
Cayuga	凯尤加	I	P.I.65393 (来自中国东北哈尔滨)	1925	1933	白	"	黑	黑	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	—	高抗
*Centennial	百年纪念	VI	皮基特 71×D 64—4636		1976	紫	黄褐	黄	"	褐	"	—	抗	—	—	—	—	—	—	—	—	高抗

品 种 原 名	中 文 名 称	成熟 期 组	系 谱 (中文)	引入 年份	命 放 名 年 或 份	花 色	莢 色	种 皮 色	脐 色	茸 毛 色	茸 毛 类 型	细 斑 点 菌 病	细 斑 疹 菌 病	灰 斑 病	灰 斑 小 种 生 2	锈 病	褐 斑 病	霜 霉 病	褐 色 茎 腐 病	英 茎 病	枯 萎 病	疫 根 腐 霉 病
Charlee	查 理	VI	P.I.71663(来自中国南京)	1927		紫	褐	黄	黑	黄褐	正 常	—	高感	抗	—	高感	—	—	—	—	—	感
Cherokee	切罗基	VII	P.I.93057 (来自中国杭州)	1931		"	黑	绿	褐	灰	正 常	—	中	—	—	高感	—	—	—	—	"	
Chestnut	切斯纳特	III	选自哈巴罗	1907	约1910	紫	黑	褐	褐	浅黄褐	正 常	—	—	—	—	"	—	—	—	—	感	
Chief	首 领	IV	伊利尼×满丘A	1940		"	褐	黄	不全黑	灰	正 常	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	"	
Chippewa	齐佩华	I	林肯 ² ×里奇兰德	1954		"	"	"	黑	黄褐	正 常	中	中	—	感	高感	—	—	中	抗	"	
Chippewa 64	齐佩华 64	I	齐佩华 ⁸ ×黑鹰	1964		"	"	"	"	"	"	高抗	"	—	高感	—	中	高感	感	—	抗	
Chusei	丘 塞	III	P.I.80472 (来自日本东京)	1929	1936	白	黄褐	"	黄	灰	半紧贴—稀疏	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	感	
Clark	克拉克	IV	林肯 ² ×里奇兰德	1953		紫	褐	"	黑	黄褐	正 常	感	高感	抗	感	"	—	中	感	—	"	
Clark 63	克拉克 63	IV	(克拉克 ⁷ ×CNS)×(克拉克 ⁸ ×黑鹰)	1963		"	"	"	"	"	"	"	抗	"	高感	—	感	感	中	"	抗	
Clay	克 莱	0	首都×伦维尔	1968		紫	"	"	黄	灰	"	中	中	—	"	—	高感	中	感	"	感	
Clemson	克萊姆森	VII	P.I.71569 (来自中国南京)	1927		"	"	"	黑	黄褐	"	—	高感	高抗	—	高感	—	—	—	—	"	
Cloud	克劳德	III	P.I.16790(来自中国杭州)	1905	约1910	白	"	黑	"	浅黄褐	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	"	
CNS	CNS	V	克萊姆森去杂	1927	1943	紫	黄褐	黄	褐	黄褐	"	—	高抗	高抗	—	—	—	—	—	—	抗	
* Cobb	科 布	VII	F 57—735×D 58—3358	1973		白	黄褐	"	浅黄	灰	"	—	—	—	—	—	—	高抗	—	—	抗—感	
Coker Hampton 226	科克尔·汉普顿 266	VII	马乔斯×李	1964		紫	浅黄褐	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Coker Hampton 226A	科克尔·汉普顿 266A	VII	马乔斯×李	1970		"	浅黄褐	"	"	"	"	—	高抗	高抗	—	—	—	—	—	—	抗—感	
Coker 338	科克尔 338	VII	科克尔·汉普顿266×布雷格	1974		白	褐	"	黑	黄褐	"	—	—	—	—	—	—	抗	—	—	抗	
Columbia	哥伦比亚	III	P.I.22897 (来自中国保定市)	1908	约1910	紫	"	绿	浅黄	灰	"	—	—	—	—	中	—	—	—	—	感	
* Columbus	哥伦布	IV	C 1069×克拉克	1972		"	"	黄	黑	褐	"	—	感	—	—	—	—	—	—	—	抗—感	
Comet	科姆特	0	帕戈达×曼达林	1954		紫	"	"	黄	灰	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	感	
Corsoy	科 索	I	哈罗索×首都	1967		"	"	"	"	"	"	感	中	—	高感	—	中	抗	感	—	"	
Creole	克里奥尔	VII	P.I.71614 (来自中国南京)	1927		"	"	"	黑	黄褐	"	—	高感	高抗	—	高感	—	—	—	—	"	
* Crest	克里斯特	00	ND 8—291×曼达林	1967		"	"	"	黄	灰	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	抗	

品 种 原 名	中 文 名 称	成熟期组	系 谱 (中 文)	引入年份	命名年份或	花 色	英 色	种 皮 色	脐 色	茸 毛 色	茸毛类型	细菌斑点病	细斑疹菌病	灰斑病	灰斑病生	锈病	褐斑病	霜霉病	褐茎病	英萎病	枯 萎 病	疫 根 腐 霉 病
Curtis	柯蒂斯	Ⅶ	选自品种李		1962	紫	黄褐	黄	浅褐	灰	正常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Custer	卡斯特	Ⅳ	{[(北京×斯科特 ⁴)×(北京×斯科特 ²)]×(斯科特 ⁹ ×黑鹰)}×(北京×斯科特 ⁵)		1967	〃	褐	〃	不全黑	〃	半紧贴	抗	抗	—	高感	—	感	感	感	抗	—	抗
Cutler	卡特勒	Ⅳ	(林肯×奥格登)×克拉克		1968	〃	褐	〃	黑	黄褐	正常	抗	感	—	高抗	—	感	中	〃	抗	—	感
Cutler 71	卡特勒 71	Ⅳ	卡特勒 ⁴ ×肯特		1971	〃	〃	〃	〃	黄褐	〃	〃	中	高抗	〃	—	中	〃	高感	〃	—	感
Cypress No. 1	西普雷斯一号	Ⅳ	柯林去杂		1950	白	〃	〃	褐	浅黄褐	〃	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	—	—
Dare	达 尔	Ⅴ	希尔×(罗诺克×奥格登)		1965	〃	〃	〃	淡褐	灰	〃	—	抗	抗	—	—	—	—	—	—	—	—
Davis	戴维斯	Ⅶ	[罗诺克×(奥格登×CNS)]×(雷尔索×奥格登)		1965	白	淡黄褐	〃	浅黄	〃	〃	—	高抗	感	—	—	—	高抗	—	高抗	〃	〃
• Delmar	德尔马	Ⅳ	C 799×F.C.33243		1963	〃	褐	〃	黄	〃	〃	感	感	—	抗	—	抗	中	中	抗	—	感
Delsoy	德尔索	Ⅶ	P.I.85355 (来自朝鲜水原)	1930	〃	〃	黑	〃	褐	〃	〃	—	高感	高抗	—	高感	—	高抗	—	—	—	—
Delsta	德尔斯塔	Ⅶ	不 详		1924	紫	黄褐	〃	〃	〃	〃	—	中	—	—	高感	—	—	—	—	—	—
Disoy	迪 索	I	[曼达林(渥太华)×坎罗]×(里奇兰德×乔冈)		1967	〃	〃	〃	黄	〃	〃	感	高感	—	抗	—	—	感	感	—	—	—
Dixie	迪克西	Ⅴ	P.I.37330 (来自朝鲜平壤)	1914	〃	紫	褐	褐	褐	〃	〃	—	感	—	—	—	—	—	—	—	—	〃
Dorman	多尔曼	Ⅴ	邓菲尔德×阿克索		1952	白	黄褐	黄	浅黄	〃	〃	—	中	高抗	—	高感	—	感	—	高抗	〃	〃
Dortchsoy 31	道奇索引 31	Ⅶ	奥格登去杂		1949	紫	褐	绿	褐	〃	〃	—	感	—	—	高感	—	—	—	—	—	〃
Dortchsoy 67	道奇索引 67	Ⅴ	马科平选系×奥格登		1953	白	〃	黄	浅黄	〃	〃	—	高感	高抗	—	高感	—	高抗	—	—	—	〃
Dunfield	邓菲尔德	Ⅲ	P.I.36346 (来自中国东北范家屯)	1913	1923	白	黄褐	〃	〃	〃	〃	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	—	〃
Dunn	邓 恩	I	格兰特×齐佩华		1969	紫	褐	〃	黑	浅黄褐	〃	中	感	—	高感	—	—	中	抗	—	—	〃
Dyer	戴 尔	Ⅴ	希尔×(李 ² ×北京)		1967	〃	黄褐	〃	〃	黄褐	〃	—	高抗	—	—	—	—	—	—	—	—	抗—感
Early White Eyebrow	早熟白眉	0	不 详		约1940	紫	褐	〃	黄	灰	〃	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	—	感
Earlyana	厄利阿纳	I	邓菲尔德去杂		1943	〃	〃	〃	〃	黄褐	〃	—	—	—	—	感	—	—	—	—	—	〃
Easycook	伊西库克	Ⅶ	P.I.34702 (来自中国山东省)	1894	约1923	〃	黑	〃	褐	灰	密集	—	感	—	—	高感	—	高抗	—	—	—	抗
Ebony	埃博尼	Ⅳ	P.I.6386 (来自朝鲜平壤)	1901	1907	〃	褐	黑	黑	浅黄褐	正常	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	—	感

品 种 原 名	中 文 名 称	成 熟 期 组	系 谱 (中 文)	引 入 年 份	命 放 名 年 份 或 份	花 色	英 色	种 皮 色	脐 色	茸 毛 色	茸 毛 类 型	细 斑 点 菌 病	细 斑 疹 菌 病	灰 斑 病	灰 斑 小 病 生 2	锈 病	褐 斑 病	霜 霉 病	褐 茎 腐 色 病	茎 萎 病	枯 萎 病	疫 根 腐 霉 病
Elton	埃尔顿	I	P.I.20406(来自苏联哈巴罗夫斯克)	1906	约1910	紫	褐	黄	黄	灰	正常	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	—	感
Emperor	埃姆珀罗	IV	P.I.97155(来自朝鲜沙里院)	1931	1939	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	—	"
Ennis I	恩尼斯一号	III	林肯去杂		1967	"	"	黄	黑	黄褐	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
* Essex	埃塞克斯	V	李×S 5—7075		1973	"	黄褐	"	浅黄	灰	"	—	抗	—	—	—	—	抗	—	—	—	抗—感
Etum	埃塔姆	II	P.I.86100(来自日本带广)	1930	约1941	"	褐	黄	黄	灰	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	—	感
Evans	伊文斯	O	梅里特×哈罗索		1974	白	"	"	"	"	"	—	—	—	—	高感	—	高感	中	感	—	抗
Fabulin	法布林	IV	林肯去杂		1952	白	"	"	黑	黄褐	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	—	感
Flambeau	福拉姆表	O O	来自苏联	1934	1944	紫	"	"	"	"	"	抗	高感	感	感	"	中	高抗	中	—	—	"
Ford	福特	III	林肯×里奇兰德		1958	白	"	"	"	"	"	"	感	抗	高感	"	—	感	中	感	中	"
Forrest	福莱斯特	V	戴尔×布雷格		1972	白	黄褐	"	"	"	"	—	抗	—	—	—	—	抗	—	—	—	抗
Fuji	富吉	II	P.I.81029(来自日本札幌)	1929	1936	"	褐	绿	"	"	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	—	"
Funk Delicious	芬克·德利西奥斯	IV	来自日本		1932	紫	褐	黄	黄	灰	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	—	感
Funman	芬曼	I	选自满丘		约1938	"	"	"	黑	黄褐	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	—	"
Gatan	盖坦	VI	选自奥图坦		1943	"	黄褐	褐	褐	浅黄褐	"	—	高感	高抗	—	"	—	—	—	—	—	抗
Georgian	乔治安	VI	P.I.71583(来自中国南京)	1927		"	褐	黄	黑	黄褐	"	—	"	"	—	"	—	感	—	—	—	"
Ginat Green	巨人绿	I	(来自日本东京)	1935	1938	"	褐	绿	"	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	—	感
Gibson	吉布森	IV	米德威斯特×邓菲尔德		1942	白	暗褐	黄	淡浅黄	灰	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	—	"
Goku	戈库	II	P.I.80480(来自日本东京)	1929	1936	白	黄褐	"	浅黄	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	抗
Goldsoy	金豆	O	选自OAC 211		约1940	紫	褐	"	黄	"	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	—	感
Grande	格兰德	O	阿诺卡×马格纳		1976	"	—	"	淡褐	褐	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	"
Granger	格兰格	III	选自满丘		1941	"	褐	"	黑	黄褐	正常	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	—	"
Grant	格兰特	O	林肯×赛纳卡		1955	白	褐	"	"	浅黄褐	"	抗	感	感	高感	"	感	中	抗	—	—	"
Green and Black	绿与黑	IV	P.I.84784(来自朝鲜水原)	1930	1941	紫	"	绿	"	黄褐	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	—	抗
Guelph	古尔夫	III	与中绿同	1889	1907	白	黑	"	"	"	"	—	—	—	—	中	—	—	—	—	—	感

品 种 原 名	中 文 名 称	成 熟 期 组	系 谱 (中 文)	引 入 年 份	命 放 名 年 份 或 份	花 色	莢 色	种 皮 色	脐 色	茸 毛 色	茸 毛 类 型	细 斑 点 菌 病	细 斑 疹 菌 病	灰 斑 病	灰 斑 病 生 2	锈 病	褐 斑 病	霜 霉 病	褐 茎 腐 色 病	莢 萎 病	疫 根 腐 霉 病
Habaro	哈巴罗	I	P.I.20405(来自苏联哈巴罗夫斯克)	1906	约1913	紫	黄褐	黄	黄	灰	正常	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	抗
Haberlandt	哈伯兰特	VI	P.I.6396(来自朝鲜平壤)	1901	约1910	白	褐	黄	褐	黄褐	"	—	高感	高抗	—	高感	—	高抗	—	—	感
Hahto	哈托	VI	P.I.40118(来自日本若松)	1915	约1921	紫	"	绿	黑	"	"	—	"	—	—	—	—	—	—	—	"
Hahto (Michigan)	哈托(密执安)	IV	不详,可能来自哈托		约1940	"	"	"	褐	"	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	抗
Hakote	哈科特	I	P.I.81039(来自日本札幌)	1929	1936	白	褐	黄	黑	黄褐	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	抗—感
Hampton	汉普顿	VII	马乔斯×李		1962	紫	"	"	淡褐	灰	"	—	高抗	高抗	—	—	—	—	—	—	感—抗
Harbinsoy	哈尔滨大豆	IV	P.I.54606—3(来自中国东北本溪)	1921	约1936	白	"	"	褐	黄褐	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	感
Harcor	哈尔科	I	科索×(科索×哈罗索63)		1975	紫	—	"	黄	灰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	抗
*Hardee	哈迪	VII	D49—722×改良佩利坎		1962	白	黄褐	"	浅黄	"	正常	—	高抗	高抗	—	—	—	—	—	—	"
Hardome	哈杜姆	0	曼达林(渥太华) ² ×A.K.(哈罗)		1963	紫	褐	"	灰	"	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	感
Hark	哈克	I	鹰眼×哈罗索		1966	"	"	"	黄	"	"	高抗	中	—	—	感	—	中	中	中	"
Harlon	哈伦	I	黑鹰×哈罗索 63		1976							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Harly	哈利	I	曼达林(渥太华)×A.K.(哈罗)		1948	紫	褐	黄	黄	灰	正常	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	抗
Harman	哈曼	III	选自满丘		1943	"	"	"	黑	黄褐	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	感
Harosoy	哈罗索	I	曼达林(渥太华) ² ×A.K.(哈罗)		1951	"	"	"	黄	灰	"	中	中	抗	高感	感	中	抗	中	中	"
Harosoy 63	哈罗索63	I	哈罗索 ⁸ ×黑鹰		1963	"	"	"	"	"	"	"	高抗	"	感	—	感	"	"	"	抗
Harrel	哈勒尔	V	农民的选系(弗吉尼亚)			"	"	"	褐	黄褐	"	—	高感	高抗	—	高感	—	高抗	—	—	"
Hawkeye	鹰眼	I	沈阳×里奇兰德		1947	"	"	"	不全黑	灰	"	高抗	中	感	高感	"	—	感	感	中	感
Hawkeye 63	鹰眼 63	I	鹰眼 ⁷ ×黑鹰		1963	"	"	"	"	"	"	中	感	"	感	—	—	"	"	高抗	抗
Hayseed	海西德	VI	P.I.71525(来自中国南京)	1927		白	"	"	褐	黄褐	"	—	中	—	—	高感	—	高抗	—	—	感
Henry	汉瑞	I	里奇兰德×(邓菲尔德×伊利尼)选系		1960	紫	"	"	灰	灰	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	抗
Hidatsa	希达沙	0 0	P.I.81038(来自日本札幌)	1929	约1941	"	"	绿	黑	黄褐	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	"
Higan	希甘	IV	P.I.80475(来自日本东京)	1929	1936	"	黄褐	黄	浅黄	灰	紧贴	—	—	—	—	"	—	—	—	—	"
Hill	希尔	V	(邓菲尔德×哈伯兰特)×李的姊妹系		1959	白	黄褐	"	褐	黄褐	正常	—	高抗	高抗	—	—	—	高抗	—	抗	感

品 种 原 名	中 文 名 称	系 谱 (中 文)	引 入 年 份	命 放 名 年 份 或 年 份	花 色	莢 色	种 皮 色	脐 色	茸 毛 色	茸 毛 类 型	细 斑 点 菌 病	细 斑 疹 菌 病	灰 斑 病	灰 斑 小 病 生 2	锈 斑 病	褐 斑 病	霜 霉 病	褐 茎 病	萎 黄 病	疫 根 腐 病
Hinn	欣 恩	Ⅴ 来自南非的选系		1964	白	黄褐	黄	浅黄	灰	正常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
• Hodgson	霍奇森 (何得松)	I 科索×M 372		1974	紫	褐	—	—	—	—	—	—	—	高感	—	—	感	感	高感	感
Hokkaido	北海道	Ⅳ P.I. 85666 (来自日本东京)	1930	约1936	白	—	—	黄	—	—	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	—
Hollybrook	霍利布鲁克	Ⅳ 马莫斯黄去杂	1902	约1910	—	—	—	浅黄	—	—	—	高感	—	—	—	—	—	—	—	—
Hongkog	香 港	Ⅳ P.I. 22406 (来自香港)	1908	约1910	—	褐	—	褐	灰	正常	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	—
• Hood	霍 德	Ⅴ 罗诺克×N45-745		1958	紫	浅黄褐	—	浅黄	—	正常	—	高抗	抗	—	—	—	感	—	抗	抗—感
Hood 75	霍德 75	Ⅴ 霍德×阿克苏		1975	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	抗
Hoosier	霍西尔	I P.I. 30746 (来自中国东北乌拉街)	1911	约1927	—	褐	—	黄褐	黄褐	正常	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	感
• Hp-963	Hp-963	Ⅳ D 49-2525×L 46-5679		1969	—	黄褐	—	不全黑	灰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hurrelbrink	赫里尔布林克	Ⅳ 选自哈伯兰特		约1923	—	褐	—	褐	黄褐	—	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	抗
• Hutton	赫 顿	Ⅴ F 55-822×(罗诺克×CNS-4)		1972	—	黄褐	—	黑	—	—	—	—	—	—	—	—	感	—	—	—
Illington	伊林顿	I 来自日本		约1938	白	暗褐	—	淡浅黄	灰	—	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	—
Illini	伊利尼	I 选自A.K.		1927	—	褐	—	浅黄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ilsoy	伊尔索	I 选自埃博尼		约1927	紫	—	褐	褐	浅黄褐	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	感
Imperiae	帝 国	Ⅳ P.I. 81780 (来自日本Kotoni)	1929	约1938	—	—	黄	黄	灰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Improved Pelican	改良佩利坎	Ⅴ 坦洛齐×P.I. 60406		1950	—	—	—	褐	黄褐	—	—	感	—	—	—	—	—	—	—	抗
J.E.W. 45	J.E.W 45	Ⅴ 选自混合的种子群体		1945	—	黄褐	—	—	—	—	—	中	—	—	—	—	—	—	—	—
Jackson	杰克逊	Ⅴ 沃尔斯塔特×帕尔梅托		1953	白	褐	—	浅黄	灰	—	—	高感	高抗	—	—	—	感	—	—	感
Jefferson	杰斐逊	Ⅳ P.I. 82202 (来自朝鲜 Kogendo)	1920	约1941	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jogun	乔 冈	I P.I. 87615 (来自朝鲜 Dojogun)	1930	约1936	—	—	—	黄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jogun Ames	乔冈艾姆斯	I —		—	—	—	—	黄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
• Jupiter	丘辟特	Ⅴ D49-2491×P.I. 240664		1971	紫	—	黄+绿	褐+黑	褐	—	—	抗	抗	—	—	—	—	—	—	—
Kabott	卡博特	O (来自中国东北宁古塔)		约1940	—	—	黄	黄	灰	—	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	感
Kagon	卡 冈	I 不 详		约1944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

品 种 原 名	中文名称	系 谱 (中 文)	引 入 年 份	命 放 名 或 份	花 色	莢 色	种 皮 色	脐 色	茸 毛 色	茸 毛 类 型	细 斑 点 菌 病	细 斑 疹 菌 病	灰 斑 病	灰 斑 小 病 生 2	锈 病	褐 斑 病	霜 霉 病	褐色茎腐病	荚 枯 萎 茎 病	疫 根 腐 病
Kanrich	肯瑞奇	Ⅱ坎罗 ² ×里奇兰德		1956	紫	褐	黄	黄	灰	正常	中	感	—	高抗	高感	感	—	中	中	感
Kanro	坎 罗	Ⅱ P.I.84928 (来自朝鲜平壤)	1929	1936	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	"
Kanum	卡努姆	Ⅱ P.I.84668—1 (来自朝鲜水原)	1929	约1941	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	"
Kent	肯 特	Ⅳ 林肯×奥格登		1961	"	"	"	黑	黄褐	"	中	感	抗	高抗	"	中	高抗	感	抗	"
Kim	金	Ⅱ 塞克 ² ×里奇兰德		1956	"	"	绿	"	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	"
Kingston	金斯顿	Ⅳ P.I.17255 (来自日本)	1889	1907	白	黑	黑	黑	黄褐	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	"
Kingwa	金 瓦	Ⅳ 北京去杂		1931	紫	褐	"	"	灰	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	"
*Kino	基 诺	Ⅶ D49—2491×克拉克		1968	"	"	黄	"	黄褐	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	抗
Korean	柯 林	Ⅰ 来自中国		约1928	白	"	"	"	浅黄褐	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	感
Kura	库 拉	Ⅱ P.I.81042 (来自日本札幌)	1929	1936	"	"	绿	"	黄褐	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	"
La. Green	路易斯安纳绿	Ⅷ 不 详			紫	黑	"	褐	"	"	—	抗	—	—	"	—	—	—	—	抗
Laredo	拉雷多	Ⅶ P.I.40658 (来自中国阳平关)	1914	约1923	紫+白	"	黑	黑	"	"	—	感	感	—	"	—	高抗	—	—	感
Lee	李	Ⅶ S—100×CNS		1954	紫	黄褐	黄	"	"	"	—	高抗	高抗	—	"	—	抗	—	高抗	"
Lee 68	李 68	Ⅶ 李 ⁶ ×阿克索		1968	"	浅黄褐	"	"	"	"	—	"	高抗	—	—	—	中	—	—	抗
Lee 74	李 74	Ⅶ 李 68×(李 ⁶ ×F.C.33243)		1974	"	黄褐	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	感	—	—	"
Lexington	列克星敦	V 选自舍伍德		约1923	白	黑	"	褐	灰	"	—	感	—	—	—	—	—	—	—	—
Lincoln	林 肯	Ⅱ 曼达林×满丘		1943	"	褐	"	黑	黄褐	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	感
Lindarin	林达林	Ⅰ 曼达林(渥太华)×林肯		1958	紫	"	"	浅黄	灰	"	中	感	抗	感	"	—	高抗	感	中	"
Lindrin 63	林达林 63	Ⅰ 林达林 ⁸ ×沈阳		1963	"	"	"	"	"	"	"	"	"	感	—	感	抗	中	"	抗
Linman 533	林曼 533	Ⅰ 选自满丘		约1939	"	"	"	黑	黄褐	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	感
Little Wonder	小旺德	Ⅱ 不 详		约1947	"	"	灰	灰	灰	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	"
Luthy	卢 西	V 农民的选系(马里兰州)			白	"	黄	褐	黄褐	"	—	高感	高抗	—	高感	—	高抗	—	—	"
*Maok	麦 克	V [(NC55 ³ ×S 62—5—16—12)×RA63—19—2]×李68		1972	紫	浅黄褐	"	黑	"	"	—	抗	"	—	—	—	抗	—	—	抗
Maeoupin	麦库平	Ⅳ 马莫斯黄去杂		1934	白	褐	"	浅黄	灰	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	感

品 种 原 名	中 文 名 称	成熟期组	系 谱 (中 文)	引入年份	命 放 名 年 或 份	花 色	荚 色	种 皮 色	脐 色	茸 毛 色	茸 毛 类型	细 斑 点 菌病	细 斑 疹 菌病	灰 斑 病	灰 斑 病 生 2	锈 小 种 病	褐 斑 病	霜 霉 病	褐 茎 腐 色病	荚 枯 萎 病	疫 根 腐 霉病
Madison	麦迪逊	I	门罗×林肯		1960	白	褐	黄	浅黄	灰	正常	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	抗
Magna	马格纳	I	〔曼达林(渥太华)×乔冈〕×〔曼达林(渥太华)×坎罗〕		1967	紫	”	”	黄	”	”	感	感	—	抗	—	感	中	感	—	感
Magnolia	马格诺利亚	VI	P.I.85537 (来自朝鲜水原)	1929		紫	黄褐	”	褐	”	”	—	中	—	—	高感	—	高抗	—	—	抗
Majos	马乔斯	Ⅷ	东京×耶尔雷多		1949	白	”	”	浅黄	”	”	—	感	—	—	”	—	—	—	—	”
Mamloxi	曼洛克西	Ⅷ	可能是马莫斯黄×比洛克西		1922	紫	褐	黄	褐	黄褐	”	—	感	—	—	”	—	—	—	—	抗
Mammoth Yellow	马莫斯黄	Ⅷ	不 详	约1900		白	黄褐	”	浅黄	灰	”	—	高感	高抗	—	—	—	感	—	—	感
Mamotan 6640	马莫顿 6640	Ⅷ	可能是马莫斯黄×比洛克西		1929	紫	褐	”	褐	”	”	—	中	—	—	—	—	—	—	—	抗
Mamredo	马雷多	Ⅷ	可能是马莫斯黄×拉雷多		1924	白	黄褐	”	”	黄褐	”	—	感	高抗	—	高感	—	高抗	—	—	抗
Manohu	满 丘	Ⅲ	P.I.30593 (来自中国东北宁古塔)	1911	约1917	紫	褐	”	黑	”	”	—	—	—	—	”	—	—	—	—	感
Manchu (Lafayette)	满 丘 (拉斐特)	Ⅲ	选自满丘		1943	”	”	黄褐	褐	”	”	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	”
Manchu (Lafayette) B	满丘 (拉斐特) B	Ⅲ	满丘 (拉斐特) 性状不同的姊妹系			”	”	黄	”	”	”	—	—	—	—	—	—	—	—	—	”
Manchu (L 55-143)	满丘(L 55-143)	Ⅲ	选自满丘		1955	”	”	”	黑	”	”	—	—	—	—	—	—	—	—	—	”
Manchu (Madison)	满丘 (麦迪逊)	I	”		1951	”	”	”	褐	”	”	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	”
Manchu Hudson	满丘赫德森	I	”		约1938	”	”	”	黑	”	”	—	—	—	—	”	—	—	—	—	”
Manchu Montreal	满丘蒙特利尔	I	”		约1944	”	”	”	”	”	”	—	—	—	—	感	—	—	—	—	”
Manchu 2204	满 丘 2204	Ⅲ	”			”	”	”	”	”	”	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	”
Manchu 3, Wisc.	满丘 3, 威斯康星	I	”		约1940	”	”	”	”	”	”	—	—	—	—	”	—	—	—	—	”
Manchu 606, Wisc.	满丘 606 威斯康星	I	”		约1940	”	”	”	”	”	”	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	”
Manchukota	满丘科塔	I	”		1943	”	”	”	”	”	”	—	—	—	—	”	—	—	—	—	”
Manchuria	满丘里亚	I	P.I.28050 (来自中国东北哈尔滨)	1910	1912	”	黑	”	淡浅黄	灰	”	—	—	—	—	”	—	—	—	—	”
Manchuria 13177	满丘里亚 13177	Ⅲ	选自满丘里亚		1913	1913	”	褐	”	浅黄	”	—	—	—	—	”	—	—	—	—	”
Manchuria 20173	满丘里亚 20173	Ⅲ	”		1920	1920	”	”	”	”	”	—	—	—	—	”	—	—	—	—	”
Mandarin	曼达林	I	P.I.36653 (来自中国东北北团林子)	1911	约1920	”	”	”	黄	”	”	—	—	—	—	”	—	—	—	—	”

品 种 原 名	中 文 名 称	成 熟 期 组	系 谱 (中 文)	引 入 年 份	命 放 名 年 份	花 色	莢 色	种 皮 色	脐 色	茸 毛 色	茸 毛 类 型	细 斑 点 菌 病	细 斑 疹 菌 病	灰 斑 病	灰 斑 小 病 生 2	锈 病	褐 斑 病	霜 霉 病	褐 茎 腐 色 病	荚 萎 病	根 腐 霉 病
Mandarin(ottawa)	曼达林 (渥太华)	0	选自曼达林		约1940	紫	褐	黄	黄	灰	正常	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	感
Mandarin 507	曼达林 507	I	"		约1948	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	抗一感
Mandell	曼多尔	III	选自满丘		约1934	"	"	"	黑	黄褐	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	感
Manitoba Brown	马尼托巴褐豆	0 0	不 详		约1939	白	"	红褐	红褐	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	一感
Mansoy	满 索	II	选自满丘		约1928	紫	"	黄	黑	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	"
Medium Green	中 绿	I	见古尔夫 (来自日本)	1889	约1903	紫	"	绿	浅黄	灰	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	抗一感
Mendota	门多塔	I	P.I.84668 (来自朝鲜水原)	1929	约1944	"	"	黄	黄	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	抗一感
Merit	梅里特	0	黑鹰×首都		1959	白	"	"	浅黄	"	"	中	中	—	高感	"	高感	感	中	感	抗
Midwest	米德威斯特	IV	P.I.6556 (来自中国中部)	1901	约1922	紫	"	"	褐	黄褐	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	感
Miller 67	米勒 67	II	不详 (可能是朝鲜)		1967	"	黄褐	"	浅黄	灰	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一感
Mingo	明 戈	II	选自满丘		约1940	"	褐	"	黑	黄褐	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	"
Minsoy	明 索	0	P.I.27890 (来自法国巴黎)	1910	约1926	"	黄褐	"	褐	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	"
Missoy	米 索	VI	P.I.71664 (来自中国南京)	1927		"	褐	"	黑	"	"	—	—	高感	中	—	—	—	—	—	抗
Monetta	莫内塔	VI	P.I.71608 (来自中国南京)	1927		"	"	"	"	"	"	—	—	高抗	—	—	—	感	—	—	抗
Monroe	门 罗	I	沈阳×曼达林		1948	白	"	"	黄	灰	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	抗
Morse	莫尔斯	IV	P.I.19186 (来自中国东北牛庄或营口)	1906	约1910	"	"	绿	浅黄	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	感
* Morsoy	莫 索	0 0	艾克姆×L48—7289		1970	紫	"	黄	不全浅黑	"	"	感	感	—	高感	—	感	抗	中	—	感
Mukden	沈 阳	II	P.I.50523Q (来自中国东北沈阳)	1920	1932	白	"	"	浅黄	"	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	抗
Nanda	南 达	VII	P.I.95727 (来自朝鲜沙里院)	1931		紫	黄褐	"	褐	"	"	—	中	—	—	"	—	—	—	—	"
Nansemond	南西蒙德	V	农民选系 (弗吉尼亚州)			"	褐	"	"	黄褐	"	—	高感	高抗	—	"	—	高抗	—	—	"
Nela	内 拉	VII	选自马莫顿 6680		1945	白	"	"	"	"	"	—	感	—	—	"	—	—	—	—	"
Norchief	诺奇夫	0	鹰眼×福拉姆表		1954	紫	"	"	黑	"	"	中	中	感	感	"	感	感	中	—	感
Norman	诺尔曼	0 0	艾克姆×哈杜姆		1969	"	"	"	黄	灰	"	感	感	—	—	—	中	高抗	中	—	"
Norredo	诺雷多	IV	不 详		1935	"	黄褐	黑	黑	浅黄褐	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	"

品 种 原 名	中文名称	成熟期组	系 谱 (中 文)	引入年份	命名年份或份	花 色	荚 色	种 皮 色	脐 色	茸 毛 色	茸 毛 类 型	细斑菌病	细斑疹菌病	灰斑病	灰斑小种2	锈 病	褐斑病	霜霉病	褐茎腐病	荚萎病	根 腐 霉 病
Norsoy	诺 索	I	不 详		约1944	紫	褐	黄	黄	灰	正 常	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	感
OAC 211	OAC 211	I	选自哈巴罗		约1928	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	"
Ogden	奥格登	VI	东京×P.I.54610		1942	"	"	绿	不全黑	"	"	—	中	抗	—	"	—	抗	—	—	感
Ogemaw	奥吉莫	0 0	早熟黑豆6号×矮褐		1902	白	"	红褐	红褐	黄褐	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	"
Oksoy	奥克索	IV	斯科特 [*] ×黑鹰		1971	紫	"	黄	浅黄	灰	半 紧 贴	—	抗	—	—	—	—	—	—	—	抗
Old Dominion	老多米宁	VI	P.I.44512来自中国(Yiksien)	1917		紫	黑	褐	褐	灰	正 常	—	中	—	—	高感	—	高抗	—	—	"
Ontario	安大略	I	P.I.65344 (来自中国东北哈尔滨)	1925	1941	"	褐	黄	黑	黄褐	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	感
Osaya	奥萨亚	II	P.I.80465 (来自日本东京)	1929	1936	白	黄褐	"	黄	灰	半紧贴—稀疏	—	—	—	—	"	—	—	—	—	"
Otootan	奥图坦	VI	(来自中国台湾省, 经由夏威夷)	1911	约1923	紫	褐	黑	黑	黄褐	正 常	—	中	—	—	"	—	—	—	—	"
Ottawa	渥太华	I	齐佩华去杂		1959	"	"	黄	灰	灰	"	感	感	感	高感	—	—	感	感	抗	抗
Pagoda	帕戈达	0 0	马尼托巴褐豆×曼达林		约1939	"	"	"	黄	"	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	—
Palmetto	帕尔梅托	VI	P.I.71587 (来自中国南京)	1927		"	"	"	黑	黄褐	"	—	高感	高抗	—	"	—	感	—	—	感
Pando	潘 多	0 0	来自朝鲜	1947	1949	"	"	绿	"	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	抗
Patoka	帕托卡	IV	P.I.70218 (来自中国东北哈尔滨)	1926	1940	"	"	黄	不全黑	灰	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	感
Patterson	帕特森	IV	来自摩洛哥		1966	白	黄褐	"	黄	灰	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	"
Peking	北 京	IV	P.I.17852 B (来自中国北京)	1906	约1910	"	褐	黑	黑	黄褐	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	"
Pennsoy	佩恩索	II	满丘里亚 13177 去杂		约1944	紫	"	黄	不全黑	灰	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	"
Perry	佩 里	IV	帕托卡×P.I.81041去杂材料		1951	"	"	"	"	"	"	—	中	—	—	"	—	—	—	—	"
Pickett	皮基特	VI	(D49—2491 [] ×多尔曼)×(李 ⁴ ×北京)		1965	"	黄褐	"	"	"	"	—	高抗	—	—	—	—	—	—	—	抗—感
Piickett 71	皮基特 71	VI	皮基特×抗疫霉病的李		1971	"	"	"	"	"	"	—	—	高抗	—	—	—	中	—	—	抗
Pine Dell Perfection	完美的松谷	VI	天然杂交, 亲本不详			"	褐	褐	黑	"	"	—	感	—	—	—	—	—	—	—	"
Pluto	普卢托	VI	P.I.72219 (来自中国Taaihohhan)	1927		白	黄褐	黑	"	黄褐	"	—	高感	高抗	—	—	—	感	—	—	感
Pocahontas	波卡恩塔斯	VI	不 详			紫	褐	黄	褐	"	"	—	"	"	—	感	—	—	—	—	抗
Poland Yellow	波兰黄	0	P.I.128128 (不详)		约1932	"	"	"	黄	灰	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	—

品种原名	中文名称	成熟期组	系 谱 (中 文)	引入年份	命发 名放 年份	花 色	莢 色	种 皮 色	脐 色	茸 毛 色	茸 毛 类型	细斑 点 菌病	细斑 疹 菌病	灰 斑 病	灰斑 小种 生2	锈 病	褐 斑 病	霜 霉 病	褐 茎 腐 色病	莢 枯 萎 病	疫 根 腐 霉病
Polysoy	波利索	Ⅳ	不 详		约1951	紫	褐	黄	褐	黄褐	正 常	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	感
Pomona	庞莫纳	Ⅳ	C 1266×C 1265		1974	"	"	"	黑	"		—	感	—	抗	—	—	—	—	—	"
Portage	波特吉	00	艾克姆×科姆特		1964	"	"	"	黄	灰	正 常	高感	高感	—	高感	—	中	高抗	感	感	"
Portugal	波特加尔	I	不 详		1949	"	"	"	褐	黄褐	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	—
Pridesoy 57	普赖德索 57	I	选自普赖德索 (与诺索相同)		1948	"	"	"	黄	灰	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prize	普里兹	Ⅱ	〔曼达林(渥太华)×乔冈〕×〔曼达林(渥太华)×坎罗〕		1967	"	黄褐	"	黄	灰	"	感	感	—	—	—	高感	中	感	—	感
*Protana	普罗塔那	Ⅱ	(沈阳×C 1069)×(P.I.65338×C 1079)		1969	"	褐	"	不全黑	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Provar	普罗瓦	Ⅱ	哈罗索×克拉克		1969	"	"	"	褐	黄褐	"	感	中	感	高感	—	中	—	高抗	感	感
Ral soy	雷尔索	Ⅳ	选自阿克索		1940	白	黄褐	"	"	灰	"	—	高感	抗	—	高感	—	高抗	—	—	抗
Rampage	雷姆佩吉	I	克拉克×齐佩华		1969	紫	褐	"	黑	黄褐	"	中	感	—	高感	—	—	感	抗	—	感
*Ransom	兰塞姆	Ⅳ	(N 55-5931×N 55-3813)×D 56-1185		1970	"	黄褐	"	"	"	"	—	—	抗	—	—	—	高抗	—	—	感—抗
Renville	伦维尔	I	林肯 ² ×里奇兰德		1952	白	褐	"	浅黄	灰	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	感
Richland	里奇兰德	Ⅱ	P.I.70502-2 (来自中国东北长岭)	1926	1938	紫	"	"	灰	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	"
Roanoke	罗诺克	Ⅳ	南京去杂		1946	白	"	"	浅黄	"	"	—	高感	高抗	—	"	—	感	—	—	"
Roe	罗	Ⅳ	选自林肯		1953	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	"
Rokusun	罗库森	Ⅳ	P.I.80481 (来自日本东京)	1929		紫	"	"	褐	"	"	—	高感	—	—	—	—	—	—	—	"
Rsoe Non-pop	罗斯 (不炸荚)	Ⅳ	农民选系 (北卡罗来纳州)		1942	白	"	"	"	黄褐	"	—	感	中	—	—	—	高抗	—	—	"
Ross	罗斯	Ⅱ	门罗×林肯		1960	"	"	"	黑	"	"	高抗	"	抗	感	感	—	"	感	—	抗
S-100	S-100	V	伊利尼去杂		1949	"	"	"	浅黄	灰	"	—	高感	抗	—	高感	—	中	—	—	"
Sac	塞克	I	P.I.80462 (来自日本东京)	1929	1941	紫	"	绿	黑	黄褐	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	感
Sanga	桑加	Ⅳ	P.I.70210-1 (来自中国东北杨家围子)	1926	约1944	"	"	黄	黄	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	抗
Sato-3	萨托-3	Ⅳ	P.I.81041 (来自日本札幌)	1929	1936	白	"	黑	黑	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	—
Scioto	斯乔托	Ⅳ	选自满丘		1933	紫	"	黄	"	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	感
*Scott	斯科特	Ⅳ	D 49-2525×L 46-5679		1958	"	"	"	不全黑	灰	半紧贴	高感	抗	—	感	"	抗	感	中	抗	"

品 种 原 名	中 文 名 称	成熟期组	系 谱 (中 文)	引入年份	命名年份或年份	花 色	荚 色	种 皮 色	脐 色	茸 毛 色	茸 毛 类型	细斑菌病	细斑疹菌病	灰斑病	灰斑小种2	锈 病	褐斑病	霜霉病	褐茎腐病	荚枯萎病	疫根腐霉病
Seminole	塞米诺尔	Ⅷ	P.I.93058 (来自中国杭州)	1931		紫	黄褐	黄	褐	黄褐	正常	—	感	—	—	高感	—	—	—	—	感抗
* Semmes	塞姆斯	Ⅷ	D 51—5427×D 49—2491		1965	〃	黄褐	〃	不全黑	灰	〃	—	高抗	感	—	—	—	—	—	—	〃
Seneca	塞尼卡	Ⅰ	F.C.03654 A (来自中国东北)	1920	1939	白	黑	〃	浅黄	〃	〃	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	〃
Shelby	谢尔比	Ⅱ	林肯 ² ×里奇兰德		1958	紫	褐	〃	黑	黄褐	〃	中	中	抗	感	〃	感	高感	感	感	〃
Shingto	欣托	Ⅲ	P.I.21079 (来自中国东北铁岭)	1907	1910	白	黑	绿	褐	〃	〃	—	—	—	—	感	—	—	—	—	〃
Shiro	希罗	Ⅳ	P.I.81036 (来自日本札幌)	1929	1936	白	黄褐	绿	黑	黄褐	〃	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	〃
Shore	肖尔	V	P.I.80837×霍德		1976	紫	〃	黄	〃	〃	—	—	感	—	—	—	—	抗	—	—	中
Sioux	西奥克斯	0 0	P.I.81021 (来自日本札幌)	1929	约1939	〃	褐	绿	〃	〃	正常	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	一感
Sooty	图蒂	Ⅳ	选自克劳德		约1927	〃	黄褐	黑	〃	灰	〃	—	—	—	—	〃	—	—	—	—	〃
Sousei	索塞	Ⅰ	P.I.80476 (来自日本东京)	1929	1936	白	〃	黄	浅黄	〃	〃	—	—	—	—	感	—	—	—	—	〃
Soysoia	索伊索塔	I	P.I.28019 (来自意大利那不勒斯)	1910	约1923	紫	褐	褐	褐	黄褐	〃	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	〃
Steele	斯蒂勒	I	黑鹰×哈罗索		1972	〃	〃	黄	黄	灰	〃	感	高抗	高感	高感	—	高感	感	感	中	抗
Stuart	斯图尔特	Ⅷ	马乔斯×李		1964	白	黄褐	〃	浅黄	〃	〃	—	〃	—	—	—	—	—	—	—	一
Swift	斯威夫特(快飞豆)	0	{ (林肯 ² ×里奇兰德) ×柯林 } × (伦维尔×首都)		1972	〃	褐	〃	黑	黄褐	〃	高抗	抗	感	高感	—	中	抗	中	感	感
Tanner	坦纳	Ⅷ	奥图坦去杂			紫+白	黄褐	褐	褐	褐	〃	—	感	高感	—	高感	—	—	—	—	抗
Tarheel Black	塔西尔黑	Ⅷ	P.I.14952 (来自中国上海)	1905	约1923	紫	褐	黑	〃	黄褐	〃	—	高感	高抗	—	〃	—	高感	—	—	〃
Tastee	塔斯蒂	Ⅰ	P.I.86019 (来自日本带广)	1930	约1941	〃	〃	绿	黑	〃	〃	—	—	—	—	〃	—	—	—	—	感
Tennessee Non-pop	田纳西(不炸荚)	Ⅷ	东京×P.I.54610		1942	白	〃	黄	浅黄	灰	〃	—	高感	中	—	〃	—	高感	—	—	〃
Toku	托库	Ⅰ	P.I.86129 (来自日本带广)	1930	1936	〃	黄褐	〃	〃	〃	〃	—	—	—	—	〃	—	—	—	—	抗一感
Tokyo	东京	Ⅷ	P.I.8424 (来自日本横滨)	1901	约1910	紫	褐	绿	〃	〃	〃	—	感	高抗	—	〃	—	感	—	—	感
Tortoise Egg	乌龟蛋	I	来自日本		约1938	白	〃	黄	〃	〃	紧贴	—	—	—	—	〃	—	—	—	—	抗一感
* Tracy	脱西	Ⅷ	C 61—618×D 60—9647		1973	〃	黄褐	〃	黑	黄褐	正常	—	—	—	—	—	—	高抗	—	—	抗
Traverse	特拉维斯	0	林肯×曼达林(渥太华)		1965	〃	褐	〃	黄	灰	〃	抗	感	—	中	—	感	抗	抗	—	感

品 种 原 名	中 文 名 称	成 熟 期 组	系 谱 (中 文)	引 入 年 份	命 放 名 或 年 份	花 色	莢 色	种 皮 色	脐 色	茸 毛 色	茸 毛 类 型	细 斑 点 菌 病	细 斑 疹 菌 病	灰 斑 病	灰 斑 病 生 2	锈 病	褐 斑 病	霜 霉 病	褐 茎 腐 色 病	荚 萎 病	疫 根 腐 霉 病
Vansoy	温 索	0	(林肯×福拉姆表)选系×金豆		1970	白	褐	黄	黄	黄 褐	正常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verde	维 德	II	奥达×(里奇兰德×乔冈)		1967	紫	"	绿	淡浅黄	灰	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 感
Viking	海 盗	III	伊利尼×满丘 A		1942	"	"	黄	黑	黄 褐	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	"
Virginia—N	北弗吉尼亚	IV	P.I.19186 D (选自莫尔斯)	1907	约1920	"	"	褐	褐	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	抗
Virginia—S	南弗吉尼亚	V	"	1907		白	黑	"	"	"	"	—	高感	中	—	"	—	高抗	—	—	"
Volstate	沃尔斯塔特	VI	京东×P.I.54610		1942	白	褐	黄	浅黄	灰	"	—	高感	高抗	—	"	—	感	—	—	感
Wabash	瓦巴什	IV	邓菲尔德×满索		1948	"	黄褐	"	"	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	"
Waseda	瓦塞达	I	P.I.80461—1 (来自日本东京)	1929	1936	紫	褐	"	黄	"	"	—	—	—	—	"	—	—	—	—	—
* Wayne	韦 恩	II	L 49—4091×克拉克		1964	白	"	"	黑	黄 褐	"	高抗	高抗	抗	中	—	感	感	感	感	感
Wea	威	II	P.I.30600 (来自中国东北双城堡)	1911	约1925	"	黄褐	"	浅黄	灰	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	感
* Wells	威尔斯	II	C 1266 R×C 1253		1973	紫	褐	"	不全黑	"	"	中	中	—	抗	—	中	感	高感	中	抗
White Biloxi	白色比洛克西	VII	比洛克西去杂			"	"	"	褐	黄 褐	"	—	"	—	—	高感	—	—	—	—	抗
Wilkin	维尔金	0	梅里特×哈罗索		1972	白	"	"	黄	灰	"	高抗	"	感	高感	—	中	抗	感	—	抗
* Williams	威廉姆斯(威廉斯)	III	韦恩×L57—0034		1972	"	黄褐	"	浅黑	黄 褐	"	"	高抗	高感	"	—	感	感	"	抗	感
Willomi	威洛米	III	P.I.81044—1 (来自日本函馆)	1929	1938	紫	褐	"	黄	灰	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	"
Willomi B	" B	III	威洛米性状不同的姊妹系		1967	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wilson	威尔逊	IV	P.I.19183 (来自中国东北牛庄)	1906	约1910	"	"	黑	黑	黄 褐	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	感
Wilson B	" B	III	威尔逊性状不同姊妹系		1967	"	"	黄	黄	灰	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wilson 5	" 5	IV	选自威尔逊		约1920	"	"	黑	黑	浅黄褐	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	感
Wilson 5 B	" 5 B	IV	威尔逊 5 性状不同的姊妹系		1967	"	黑	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wilson 6	" 6	IV	选自威尔逊		1966	"	褐	"	"	灰	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wing Jet	温杰特	III	不 详		约1929	"	黄褐	"	"	浅黄褐	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	感
Wirth	沃 奇	I	克拉克×齐佩华		1969	"	褐	黄	"	黄 褐	"	中	感	—	高感	—	—	感	中	—	"
Wisconsin Black	威斯康星黑豆	I	P.I.5039 (来自法国巴黎)	1900	1910	"	"	黑	"	"	"	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	"

品 种 原 名	中 文 名 称	成 熟 期 组	系 谱 (中 文)	引 入 年 份	命 放 名 年 份	花 色	荚 色	种 皮 色	脐 色	茸 毛 色	茸 毛 类 型	细 斑 点 菌 病	细 斑 疹 菌 病	灰 斑 病	灰 斑 小 种 生 2	锈 病	褐 斑 病	霜 霉 病	褐 茎 腐 色 病	荚 枯 萎 茎 病	疫 根 腐 霉 病
Wolverine	密执安人	II	P.I.80490—1 (来自日本横滨)	1929	1941	紫	褐	黄	黄	灰	正常	—	—	—	—	高感	—	—	—	—	感
Woods Yellow	伍兹黄	VII	马莫斯黄去杂		1934	白	黄褐	"	浅黄	"	"	—	高感	高抗	—	"	—	—	—	—	抗
* Woodworth	渥得沃恩	II	韦恩×L 57—0034		1975	"	"	"	黑	褐	"	—	抗	—	高感	—	—	中	中	感	感
* Wye	韦	IV	亚当斯、林肯、佩里、瓦巴什、C 799、C 987、F、C.33243和L46—1503交配群体的第二周期		1971	"	褐	"	"	黄褐	"	中	中	高抗	高抗	—	中	感	高感	抗	感
Yellow Marvel	奇迹黄	I	不 详		约1941	"	黄褐	黄	淡浅黄	灰	"	—	—	—	—	感	—	—	—	—	—
Yelnanda	耶尔南达	VII	南达×耶尔雷多		1947	"	"	"	浅黄	"	"	—	中	—	—	高感	—	—	—	—	抗
Yelredo	耶尔雷多	VII	马莫斯黄×拉雷多		1929	"	"	"	"	"	"	—	感	—	—	"	—	—	—	—	感
York	约 克	V	多尔曼×霍德		1967	紫	"	"	"	"	"	—	感	高抗	—	—	—	高抗	—	—	抗

常汝镇 译自: INTSOY Series Number 9, January 1976 (国际大豆丛刊9号)

作者: T.Hymowitz S.G.Carmer. and C.A.Newell

