

农业科学实验资料汇编

(内部资料 仅供参考)

1981

安徽省六安地区农业科学研究所

勘误: 156页的表应与162页的表对调

目 录

1981年南方稻区早稻(早熟组)良种联合区域试验(安徽六安点)小结.....	(1)
安徽省1981年早稻(迟熟组)良种联合区域试验总结.....	(5)
1981年安徽省早稻(早中熟组、迟熟组)良种联合区域试验(六安点)小结.....	(14)
安徽省1981年杂交中粳新组合预备试验总结.....	(24)
1981年安徽省双季晚粳(糯)联合区域试验小结.....	(28)
六安地区双季晚粳(糯)新品种联合区域试验汇总.....	(36)
1981年六安地区双季晚粳(糯)联合区域试验(三里桥点)小结.....	(44)
晚稻品种资源特征特性鉴定.....	(49)
粳型水稻株型遗传参数的研究.....	(50)
——兼论水稻株型问题	
安徽省淮南组及六安地区小麦良种区域试验.....	(62)
安徽省及六安地区小麦品系鉴定试验总结.....	(70)
六安地区小麦良种区域试验总结.....	(77)
✓小麦高产栽培理论基础的研究续报.....	(85)
小麦高产栽培总结.....	(97)
小麦根外喷施磷酸二氢钾的试验小结.....	(103)
✓关于小麦粒重的观察分析.....	(105)
1981年《长江流域夏大豆品种区域试验》六安点总结.....	(111)
安徽省1981年夏大豆良种区域试验.....	(124)
夏大豆品种鉴定试验总结.....	(132)
省、地甘兰型油菜新品种鉴定总结.....	(140)
1980—1981年度油菜新品种试验示范及引种观察试验小结.....	(149)
江淮地区油菜品种、播期、密度综合栽培技术研究汇总(1980—1981).....	(152)
油菜品种、播期、密度综合研究技术总结.....	(160)
1980—1981年度油菜越冬防冻保苗技术的观察总结.....	(166)

接茬棉优、丰、抗品种选育和利用.....	(171)
安徽省1981年红麻新品种联合区域试验汇总.....	(178)
安徽省红麻新品种联合区域试验小结.....	(183)
糖分浓度对不同杂交组合油菜花药诱导率的影响.....	(190)
氮磷钾化肥长期定位试验小结.....	(196)
水稻叶枯型白叶枯病晚粳稻桩带菌传病初报.....	(201)

☆ ☆ ☆

野败型杂交稻雌性不育性及其恢复性和杂种后代主要经济性状的遗传研究

《安徽农业科学》1981年专辑

籼稻数量性状遗传参数的研究 《安徽农业科学》1981年专辑

籼稻主要数量性状配合力的研究 《安徽农业科学》1981年专辑

籼稻数量性状遗传距离的测定及其在杂种优势预测上的应用

《安徽农业科学》1981年专辑

水稻理想株型的初步探讨

——兼论水稻的大穗育种 《安徽农业科学》1981年第2期

小麦杂种后代主要性状的遗传与相关分析 《安徽农业科学》1981年第3期

油菜花药培养研究 《安徽农业科学》1981年第3期

玉米螟虫态历期和有效积温的研究 《中国农业科学》1981年第4期

多元分析方法(译文) 《安徽农业科学》1981年专辑

☆ ☆ ☆

附录: 主要气象资料表(1980.10—1981.11六安台)

1981南方稻区早稻(早熟组)

良种联合区域试验(安徽六安点)小结

为了及时鉴定、交流南方稻区各省、市近年来选育的早稻优良品种,根据1981年南方稻区良种联合区域试验实施方案要求,我所承担早稻(早熟组)区试。现将试验结果总结如下:

一、供试品种及来源:

品种名称	品 种 来 源	供 种 单 位
二九青 CK	二九矮7号×青小金早	浙江农科院水稻所
苏籼1号	广陆矮4号×二九青	江苏苏州地区所
岳矮早1号	新农1号×早熟广矮6号	湖南省岳阳地区所

二、试验设计及实施过程:

采用随机区组排列,三次重复,小区面积0.03亩(24尺×7.5尺=180平方尺),重复间走道1.5尺,区间走道1尺。

育秧:秧田冬闲亩,砂质壤土,肥力中等,播前机耕机耙各两次,台式秧田,注宽四尺。

清水浸种48小时,起水后用清水冲洗干净,温水淋种,温室蒸气催芽。4月2日播种,每亩播量160斤,随播随塌谷,薄膜复盖育秧。秧苗2.5叶时,揭膜通风。4月27日每亩施尿素7斤(送嫁肥),拔稗草两次。

本田:本所13号田。前茬红花草,砂质壤土,肥力中等。每亩鲜草1000斤。4月20日耕翻,机耕机耙各两次,耖1次。每亩施耖口肥碳酸氢铵和磷肥各30斤。5月2号栽秧,栽后天气晴好,气温适宜,秧苗活棵早,返青快,分蘖早。5月14日薅第一次秧,每亩施尿素13斤。5月23日薅第二次秧,每亩施尿素7斤。接着烤田,烤至田面开裂。6月8日施穗肥,每亩施尿素7斤。6月9日用666粉3斤加呋喃丹1.5斤拌成毒土撒施,防治二化螟。6月12日以后田间保持湿润。去劣两次。

三、试 验 结 果:

1、产量:参试两个品种比对照减产7.61%和14.83%,差异达显著标准。

2、生育期：参试两个品种全生育期都是109天，比二九青长一天。

3、主要经济性状：3个品种株高都在70厘米以下，二九青最高68.1厘米，苏粳1号最矮只有61.8厘米，高矮相差6.3厘米。

穗部性状：二九青穗长和总粒数都占领先地位。苏粳1号穗长只有15.27厘米，岳矮早1号每穗总粒数只有68粒。不实率岳矮早1号22.06%为最高。二九青13.85%为最低（详见表2）

千粒重：3个品种都在22—22.5克，只相差0.5克。

有效穗和成穗率：3个品种有效穗在31.8万的有二九青和岳矮早1号两个品种。苏粳1号只有28.2万穗，相差3.6万穗。成穗率平均在78—78.6%。

病虫害：田间观察，3个品种都有不同程度感染纹枯病，二九青中度感染。其余两个品种轻度感染，3个品种均遭受二化螟危害。（详见表2）。

品 种 简 评：

苏粳1号：系江苏苏州地区农科所用广陆矮4号×二九青杂交育成，平均亩产810斤。比对照二九青减产7.61%，居第二位，日产量7.43斤，本品种有效穗28.2万/亩，成穗率78.6%每穗总粒数69粒，不实率17.4%，千粒重22.5克，植株生长整齐，熟期转色好，株型较紧凑，株高61.8厘米，较抗病，抗倒，无早衰现象，全生育期109天，比对照种长一天，建议明年继续参试。

岳矮早1号：系湖南省岳阳地区农科所用新农1号×早熟广矮6号杂交育成，平均亩产746.7斤比对照减产14.83%，方差分析差异显著，日生产量6.85斤，在本试验中居末位。

本品种有效穗31.8万/亩。成穗率78.6%。每穗粒数68粒，不实率达22.06%，千粒重22.4克。植株生长整齐，熟期转色较好，全生育期109天，比对照种长1天，建议明年继续参试。

宗清明执笔

1981.10.

表 1 生育期及抗性记载表

项 目 品 种	播 种 期 月/日/月/日	移 栽 期 月/日/月/日	基 本 苗 万苗/亩	最 高 苗 万苗/亩	抽 穗 期		整 齐 度		熟 期 转 色	成 熟 期 月/日	播 种 至 齐 穗 (天)	全 生 育 期 (天)	耐 寒 性		病 虫 害		倒 伏
					始 穗 月/日/月/日	齐 穗 月/日/月/日	植 株	抽 穗					前 期	后 期	纹 枯 病	二 化 螟	
二九青 CK	4/25/3		31.8	78.0	6/18/6/21	6/18/6/21	正	校正	好	7/19	80	108	中	强	中	中	伏
苏倒 1 号	"	"	28.2	78.6	6/16/6/20	6/16/6/20	正	正	好	7/20	79	109	中	弱	轻	重	
岳矮早 1 号	"	"	31.8	78.6	6/17/6/21	6/17/6/21	正	正	好	7/20	80	109	中	中	轻	轻	

表 2 经济性状及产量记载表

项 目 品 种	株 高 (厘米)	穗 长 (厘米)	有 效 穗		每 穗 粒 数			千 粒 重 (克)	小 区 产 量 (斤)				折 合 亩 产 (斤)	日 生 产 量 斤/亩	糙 米 率 %	与 对 照 二九青 ±(斤)	谷 型	芒	米 色	腹 白、心 白
			万苗/亩	成 穗 %	总 粒 数	秕 粒	空 秕 %		I	II	III	平 均								
二九青 CK	68.1	17.2	31.8	78.0	72.2	10.0	13.85	22.2	27.7	25.5	25.7	26.3	3876.7	8.12	78.0		卵 园	无	中 珀 琥	中
苏籼 1 号	61.8	15.3	28.2	78.6	69.1	12.0	17.37	22.5	25.0	24.0	23.9	24.3	3810.0	7.43	76.0	-66.7	"	无	"	中
岳矮早 1 号	65.8	16.3	31.8	78.6	68.0	15.0	22.06	22.4	21.7	21.2	22.4	22.4	745.6	6.84	77.8	-131.0	"	无	"	小

表 3 方差分析表

变 因	自由度	平方和	均 方	F	显 著 平 准	
					F0.0	F0.01
品 种 间	2	23.21	11.61	7.442*	6.94	18.00
区 组 间	4	2.63	1.32	0.846		
机 误	4	6.24	1.56			
总 和	8	32.08				

P	LSR0.05、4	LSR0.05、4
2	2.83	4.69
8	2.89	4.90

表 4 产量差异比较表

产量位次	品 种 名 称	小区平均产量(斤)	22.37	24.30
1	二九青 CK	26.30	3.93*	2.00
2	苏粳 1 号	24.30	1.93	
3	岳矮早 1 号	22.37		

*本试验品种数少，机误自由度小，方差分析仅供参考。

安徽省1981年早稻(迟熟组) 良种联合区域试验总结

为了尽快鉴定我省新选育水稻良种的适应性和应用价值, 1981年全省水稻科研协作会议商定, 组织安徽省水稻良种联合区域试验, 早籼迟熟组由我所负责致系汇总。本试验参试11单位, 收到试验资料6份, 缺当涂、宣城、霍邱、宿松、歙县5个点县所。现就6个单位试验结果汇总如下。

一、供试品种及参试单位:

供试品种5个为7638(省院作物所)、科广(安徽农学院)、7244和1055(巢县所)、广陆矮4号(太湖县所供种)为对照种。

参试单位: 省院作物所、安徽农学院、六安地区所。宿松、贵池、当涂、宣城、霍邱、肥西、歙县、巢县县所。

现有6份资料中, 除省院作物所缺7244和1055个两品种外, 其余5个试验单位基本上是按照试验实施方案要求进行的(详见表3)。各试验单位自增的品种均未统计。

二、试验概况及设计:

小区面积均为0.03亩(180平方尺), 3次重复, 随机区组排列。多数采用薄膜育秧, 栽插密度 4×5 、 3×5 、 5×4 、 5×3 等。本田多数为绿肥田, 试验总结多数采用方差分析。进行显著性测验。试验概况详见表1。

三、试验结果:

根据6个单位试验资料统计: 7638平均亩产853.9斤比去年820.4斤, 亩增产33.5斤, 比对照种广陆矮4号平均亩产847.8斤, 增产0.72%, 在本试验名列第一。3个点增产, 幅度1.25—5.24%, 平均增产2.99%, 减产亦有3个点, 幅度0.12—2.5%, 平均减产1.65%。科广平均亩产831.1斤比去年756.0斤, 亩增产75.1斤, 比对照种减产1.79%在本试验名列第三位。增产点3个, 幅度0.84—3.56%。平均增产2.11%, 减产点亦是3个, 幅度1.25—9.68%, 平均减产6.75%, 达显著水平。7244和1055两个品种平均亩产为

792.9斤和641.3斤，分别比对照种减产6.48%和24.39%均达显著水平。

虽然我省稻区地跨大江南北，地势、土质和气候条件复杂，由于今年气候条件特别好，晴朗天气多，气温、光照等方面对水稻生长发育均有效益，所试品种都比去年表现增产。

生育期和经济性状详见表4、表5。

抗逆性：6个点统计，5个品种感染纹枯病的有3个点，只是感病轻重程度不同而已。巢县所记载3个品种有白叶枯病，但很轻（详见表4）。

四、小 结：

7638和科广两个品种已通过两年区域试验，两年结果7638平均亩产837.2斤。比对照种广陆矮4号798.9斤增产4.6%。科广平均亩产763.6斤，比对照种减产0.66%。两品种两年平均亩产与对照种增减产均不甚显著。抗逆性和生育方面均与对照种相似，可以因地制宜进行试种种示范，建议明年不再继续参试。7244和1055两品种表现均不理想，明年亦不必参试。建议下年推荐新品种重新组织试验。

宗清明执笔

1981.12.25.

表 1 各参试单位试验情况

参 加 单 位	项 目	参试品种	排列方式	重复次数	小区面积(亩)	育秧方式	播种期(斤)	播种期月/日	移栽期月/日	规格(寸)	土 质 与 肥 力	基 肥 (斤/亩)	追肥次数	追肥量	中耕次数	治虫次数
六安地区所		5	随机	3	0.03	膜薄育秧	160	4/2	5/2	4×5	砂壤土中肥	红花草1000斤/亩、 碳铵和磷肥各30斤	3	尿素27斤/亩	2	1
贵池县所		5		3				3/31	5/1	3×5						
肥西县所		5	随机	3	0.03	膜薄育秧	300	3/26	4/29	5×4	黄浆土中下等	菜饼200斤、磷肥50斤、 碳铵30斤	3	碳铵80斤/亩	3	1
安 农		5	随机	3	0.03	露地	200	4/10	5/14	5×4	粘壤土中	红花草5000斤/亩、 菜饼54斤/亩	1	尿素15斤/亩	2	多次
省院作物所		3	随机	3	0.03			4/6	5/4	3×5	粘 土 等	红花草2664斤/亩、 菜饼100斤、磷30斤、 碳铵30斤	2	尿素18斤/亩	2	4
巢 县 所		5	随机	3	0.03	薄膜育秧	200	4/13	5/15	5×3	中上等	红花草3500斤/亩、 尿素40斤、磷肥40斤	1	尿素18斤/亩	1	

表 2 供试品种在各试点产量统计表

品种 参试项目 单位	7 6 3 8			科			广陆矮 4 号 (CK)			7 2 4 4			1 0 5 5		
	亩产 (斤)	位次	与对照 ± %	亩产 (斤)	位次	与对照 ± %	亩产 (斤)	位次	与对照 ± %	亩产 (斤)	位次	与对照 ± %	亩产 (斤)	位次	与对照 ± %
六安地区所	810.0	1	1.25	806.7	2	0.84	800.0	3		770.0	4	-3.75	570.0	5	-28.75
贵池县所	866.7	3	-2.50	877.8	2	-1.25	888.9	1		788.9	4	-11.25	650.0	5	-26.88
肥县所西	700.0	2	-2.33	650.0	5	-9.31	716.7	1		696.7	3	-2.79	653.0	4	-8.89
安 农	916.7	3	-0.12	935.6	1	1.94	917.8	2		905.6	4	-1.33	703.3	5	-23.37
省院作物所	870.0	1	5.24	746.7	3	-9.68	826.7	2							
巢 县 所	960.0	2	2.49	970.0	1	3.56	936.7	3		803.3	4	-14.24	630.0	5	-32.74
$\bar{X}$	853.9	1	0.72	831.1	3	-1.79	847.8	2		792.9	4	-6.93*	641.3	5	-24.73*

*为与 CK 5 点平均852.0斤比。

表 3 试供品种和增减产统计表

项 目 品 种	参试 点数	产 量 幅 度 斤/亩	平均亩产 (斤)	平 均 较 对照±%	产 量 位 次	增			减		
						点 数	幅 度 %	平 均 %	点 数	幅 度 %	平 均 %
7 6 3 8	6	700~960	853.9	0.72	1	3	1.25~5.24	2.99	3	0.12~2.5	1.65
科 广	6	650~970	831.1	-1.92	3	3	0.84~3.56	2.11	3	1.25~9.68	6.75
广陆矮4号	6	716.7~936.7	847.8		2						
7 2 4 4	5	696.7~905.6	792.9	-6.93	4				5	1.33~14.24	6.67
1 0 5 5	5	570~703.3	641.3	-24.73	5				5	8.89~32.74	24.73

表 4 供试品种生育期及抗逆性在各试点表现

品 种	参 加 单 位	项目	播种期 月/日	移栽期 月/日	秧龄 (天)	抽穗期 (月/日)		成熟期 月/日	生育期 (天)	病 害	
						始	齐			纹枯病	白叶枯病
7 6 3 8	六安地区所		4 / 2	5 / 3	30	6 / 30	7 / 4	8 / 1	110	轻	
	贵池县所		3 / 31	5 / 1	31	6 / 26	6 / 30	7 / 28	119		
	肥西县所		3 / 26	4 / 29	34	7 / 3	7 / 6	7 / 31	127		
	安 农		4 / 10	5 / 14	34	7 / 4	7 / 8	8 / 7	119	中	
	省院作物所		4 / 6	5 / 4	28	6 / 30	7 / 4	8 / 1	117	中	
	巢 县 所		4 / 13	5 / 15	32	7 / 4	7 / 8	8 / 4	113		
	$\bar{X}$								119		轻
科 广	六安地区所		4 / 2	5 / 3	30	6 / 30	7 / 4	8 / 2	121	轻	
	贵池县所		3 / 31	5 / 1	31	6 / 26	6 / 30	7 / 28	119		
	肥西县所		3 / 26	4 / 29	34	7 / 5	7 / 8	8 / 1	128		
	安 农		4 / 10	5 / 14	34	7 / 4	7 / 8	8 / 7	119	重	
	省作物院所		4 / 6	5 / 4	28	6 / 29	7 / 2	8 / 1	117	中	
	巢 县 所		4 / 13	5 / 15	32	7 / 8	7 / 8	8 / 1	110		
	$\bar{X}$								119		轻

续表 4

广矮陆4号	六安地区所	4/2	5/3	30	7/5	7/9	8/8	123	轻	轻
	贵池县所	3/31	5/1	31	6/26	6/30	7/28	19	中	
	肥西县所	3/26	4/29	34	7/3	7/6	7/31	127	中	
	安 农	4/10	5/14	34	7/4	7/8	8/7	119	中	
	省院作物所	4/6	5/4	28	6/30	7/2	8/4	120		
	巢县所	4/13	5/15	32	7/3	7/8	8/1	110		
$\bar{x}$										120
7244	六安地区所	4/2	5/3	30	6/24	7/2	7/30	119	中	中
	贵池县所	3/31	5/1	31	6/26	6/29	7/28	119		
	肥西县所	3/26	4/29	34	7/2	7/5	7/31	127		
	安 农	4/10	5/14	34	7/2	7/7	8/6	118	中	
	省院作物所									
	巢县所	4/13	5/15	32	7/1	7/6	7/30	108		
$\bar{x}$										118
1055	六安地区所	4/2	5/3	30	7/5	7/9	8/3	123	轻	轻
	贵池县所	3/31	5/1	31	6/30	7/4	7/29	120	中	
	肥西县所	3/26	4/29	34	7/6	7/9	7/31	127		
	安 农	4/10	5/14	34	7/11	7/14	8/14	126		
	省院作物所									
	巢县所	4/13	5/15	32	7/12	7/15	8/5	114		
$\bar{x}$										122

表5 供试品种各试验点的经济性状在

品 种	项 目 单 位	株 高 (厘米)	穗 长 (厘米)	基本苗 万/亩	最高苗数 万/亩	有效穗 %	成穗率 %	平均每穗粒数			千粒重 (克)	糙米率 %	米 质	
								总粒数	实粒数	空秕率 %			腹白 大小	等级
7638	六安地区所	74.99	17.85	27.0	87.6	42.6	48.63	90.0	76.3	15.22	22.2	78.6	小	
	贵池县所	74.5	16.8	25.3	75.3	36.6	48.6	65.9	46.2	29.9	22.9			
	肥西县所			36.0	61.6	34.0	55.0	68.5	56.5	12.0	24.0			
	安 农	73.6	17.0	18.0	57.6	36.0	62.2	68.0	50.5	25.7	24.0	78.0		中上
	省院作物所	72.5	16.3	31.8	66.6	35.0	52.55	61.0	41.5	32.0	23.7	78.4		中下
	巢 县 所 X	72.4 73.6	 16.99	26.8 28.32	75.6 70.77	32.0 36.03	42.3 51.55	46.6 66.7	35.4 51.1	24.0 23.14	26.0 23.8	78.33		
科 广	六安地区所	71.87	17.04	19.8	69.0	36.0	52.17	78.2	65.6	16.11	24.6	80.0	大	
	贵池县所	78.3	17.7	21.3	78.0	38.4	49.2	67.3	44.1	34.5	25.9			
	肥西县所			32.0	74.0	35.0	47.0	79.9	45.8	28.1	27.0			
	安 农	76.0	16.1	18.6	62.7	39.6	63.2	62.5	46.2	26.1	26.3	78.0		中下
	省院作物所	79.8	16.0	32.0	68.4	36.4	53.22	58.3	41.1	29.5	25.0	78.4		中上
	巢 县 所 X	71.3 75.5	 16.7	21.6 24.22	73.6 70.95	38.8 37.37	52.7 52.62	38.9 64.18	21.6 44.1	44.5 29.8	27.2 25.97	78.8		

续表 5

广陆矮 4 号	六安地区所	66.28	16.8	24.0	78.6	51.0	64.89	77.3	66.2	14.37	22.5	79.2	大	中 下
	贵池县所	75.8	17.4	24.6	65.4	35.4	54.1	68.0	48.9	28.1	22.5			
	肥西县所			36.0	68.8	32.0	46.1	67.6	52.6	15.0	23.8			
	安 农	73.0	16.4	20.1	60.6	39.0	64.4	67.3	51.1	24.1	23.8	77.0		
	省院作物所	72.6	16.2	33.6	68.4	38.0	55.56	53.4	37.3	40.1	22.5	78.2		
	巢 县 所	77.6		27.6	80.8	37.2	46.4	52.8	40.1	24.1	27.5			
	$\bar{X}$	73.1	16.8	27.65	70.43	38.77	55.28	64.4	49.4	24.3	23.8	78.1		
7 2 4 4	六安地区所	72.16	18.5	23.4	71.4	48.6	68.07	88.4	71.4	26.3	26.4	81.4	小	中
	贵池县所	77.7	16.9	23.1	57.9	31.2	53.9	72.0	46.5	35.0	24.9			
	肥西县所			28.0	67.2	35.0	52.0	85.7	66.5	19.2	25.5			
	安 农	73.0	16.1	19.2	52.1	84.8	66.8	66.1	42.8	35.2	27.0	76		
	省院作物所													
	巢 县 所	72.8		25.2	67.2	38.4	57.5	56.0	45.5	18.8	27.1			
	$\bar{X}$	73.92	17.2	23.78	63.16	37.6	59.65	73.6	54.5	26.9	26.2			
1 0 5 5	六安地区所	82.00	20.6	24.0	91.8	48.6	52.94	99.3	61.3	38.27	25.2	83.0	小	中 下
	贵池县所	90.2	22.4	22.2	74.1	34.2	46.2	82.9	37.5	55.0	23.7			
	肥西县所			24.0	63.2	33.0	52.2	88.8	55.2	33.6	26.8	76.8		
	安 农	89	20.7	19.2	61.8	33.6	54.4	91.0	40.2	55.8	26.0			
	省院作物所													
	巢 县 所	92.9		29.6	75.6	28.4	37.6	93.7	39.8	57.5	2.73			
	$\bar{X}$	88.5	21.2	23.8	73.3	35.56	48.63	91.1	46.8	48.03	25.8	79.9		

1981年安徽省早稻(早中熟组、迟熟组) 良种联合区域试验(六安点)小结

为了进一步鉴定、交流本省、地、市县近年来选育的早稻优良品种。根据1981年省水稻良种联合区域试验实施方案要求,我所承担早籼稻(早中熟组、迟熟组)区试。现将试验结果汇总如下。

一、供试品种及来源:

类型	品 种 名 称	品 种 来 源	供 种 单 位
早 中 熟 组	7502	原丰早×反修1号	六安地区所
	广越1号	广陆矮4号×反越南早籼	"
	7608	7025×献党	省作物所
	78-200	二九九青×IR24	安庆地区所
	7361	双陆青×陆才号(系选)	巢县所
	团龙2号	团粒矮×龙革10号	安徽农学院
	竹广29CK	竹莲矮×广陆矮4号	广德县所
	72-2-1	二陆青×广选3号	舒城县所
	原丰早CK		"
	7509-17	古巴×矮南早1号	宁国县所
	早糯94	竹广23×(菲革14)×IR26	广德县所
	青广2号	二九青×广陆矮4号	宣城地区所
	7305-1	桂陆矮8号×IR837-7-2	滁县地区所