

亟齋急應奇方二



# 亟齋急應奇方 二之二

治氣壅鼓脹

蛤蜊大者七隻每隻用磚仁裏甲如蒜粒將放炮

頭用黃泥封橫穿火煨為茶加羅卜子炒末一兩每服茶飯下

整脹

老絲瓜一箇去將絲控淨入巴豆四十粒同炒待黃色去巴豆不用入

陳倉米三四合同瓜攪炒去穰不用將米為茶滴水為

孰每服二小神

治鼓脹方

其即老李牛頭赤砂仁五粉同入雄豬肚內下

大蒜裝滿線扎入砂鍋內酒煮爛取大蒜隨意食之茶其大便

刻放石不絕漸寬奉其大便內去黃水如不去水將高良

飲一小杯即去

治一切肚腹脹不拘鼓脹氣脹水脹食脹乾雄雞屎一酒漿



責任編輯：劉國正

图书在版编目 (CIP) 数据

亟斋急应奇方/ (清) 亟斋居士编. - 北京: 中医古籍出版社, 2005.10

(中医古籍孤本大全)

ISBN 7-80174-387-3

I. 亟... II. 亟... III. 验方-汇编 IV. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 098585 号

ISBN 7-80174-387-3



9 787801 743879 >

中醫古籍孤本大全

亟齋急應奇方

原著 清·亟齋居士

選編 薛清錄 劉國正

出版發行 中醫古籍出版社

北京市東直門內南小街十六號 郵編 100700

杭州蕭山古籍印務有限公司

二〇〇五年十月第一版第一次印刷

二百五十套

ISBN 7-80174-387-3/R · 386

定價 二五〇圓



治氣蠱鼓脹

蛤蚧大者六七隻每隻用砂仁塞其口線扎縛放烟筒內而

頭用黃泥封橫架火煨為末加雞卜子炒末一兩每服葱姜椒煎湯下忌糖醋

蠱脹

老絲瓜一箇去將穰挫碎入巴豆四十粒同炒待黃色去巴豆不用入

陳倉米三四合同瓜穰再炒穰黃色去穰不用將米為末滴水為  
執每服二小神効

治鼓脹方

兵部末

牽牛頭

錢末各

砂仁

五粉

同入雄猪肚內再用整頭

大蒜裝滿線扎入砂鍋內酒煮爛單取大蒜隨意食之飲汁二杯少

刻放屁不絕漸寬泰其大便內去黃水如不去水將高良姜煎湯

飲一小杯即去

治一切肚腹腫脹不拘鼓脹氣脹水脹食脹

乾雄鷄屎

斤

酒漿





碗煮一碗濾過澄清飲之少頃腹中响動瀉一二遍即日脚下皮皺

腹脹及四肢腫脹 白色鷄屎料為末酒調下二錢

治十種水氣 鯉魚重一斤加葱白冬瓜作羹食之不可加鹽

治鼓脹服藥未盡消者用 甘遂為細末津調或水調塗腹腫處令通

內服甘草湯便消

治下午發熱而又畏冷小便急脹眼睛黃額上黑足下熱因成黑疸其

腹脹大如水鼓狀其大便必黑時常溇瀉此女勞瘵之症非水脹也

用 明礬燒枯火硝炒極透各等分為末以大麥粥和服一二錢日三服

治食麵多腹中飽脹 熱酒和生姜汁飲一二杯少頃又飲即消

吃瓜果過多腹脹氣急用 肉桂兩射香分二研細飯丸菜豆大白湯下

五丸服二三次

粽子傷 白酒麴炒一九 朮香少共末作一服酒下



凉粉索粉傷

杏仁去皮尖二十粒淡湯研細服

熟菱角傷

生姜汁數茶匙射香一厘和服

若生菱角傷用上瓜藥方

牛肉傷

乾稻草煎濃湯飲之

誤食桐油

熱酒飲之

食魚傷

陳皮兩煎湯飲之

吞酸嘈雜呃逆門

呃逆俗名打呃又名打呃頻

治吞酸及胸前嘈雜痛

生白朮四兩

黃連

姜汁浸炒五錢

陳皮

神曲各一兩

右末將神曲打糊丸粟米大每三五分食後及臨睡津液嚥下

吞酸

俗名醋心

川黃連

切

吳茱萸

各一兩二味用水拌濕同炒焦

為末

好益元散七錢

米糊丸每服一錢食遠白湯下

治常吐酸水怕吃飲食

猪牙皂角

二個火中罌煨

白礬

錢二共末搗飯為丸

葡萄子大每空心滾水一口送下三五丸



五更時嘈雜因思慮太過而血虛也

熟地一錢五分當歸

白芍五錢

香付

童便浸

黑枝子錢一川貝

川芎各錢

黃連炒五分

水煎服

又方歸脾湯加黃連三分亦妙

打呃

箬葉蒂

錢三五

水煎服之如神

虛人及病後發呃者加人參服之

更妙

又方用硫磺乳香各錢酒煎入酒壺內以壺嘴向鼻熏之

下痢日久發呃逆

好益元散用人參白朮煎湯調下二錢立止

○ 膈噎反胃嘔吐門

膈噎屢驗三方

戒惱怒薄滋味斷房闈省勞碌

生地

熟地

自製

麥冬

茯苓

香付

春去皮童便浸三次

白朮

飯上蒸過土炒

白芍

炒

川芎

錢各一

桃仁

去皮

紅花

陳皮

甘草

各錢

當歸

半錢黑炙

三棱

水煎食後服

仍用蘆根煎水代茶





末藥方 麻子仁新白者白脂麻去皮共炒黃色研末加白鹽錢三開

口濺吃或同飯吃吃完再合勿缺

又以老雄鴨一隻禁于籠中

餓一日夜連水勿與吃將揀淨小麥喂之令飽畧過一刻即將鴨宰利

出肚中麥不見水攤在新瓦數片上以火焙燥研極細末重羅去麤將此鴨

水煮濃湯調麵三錢一日三服完再製以愈為度 以上三方逐日

並進寬腸通氣屢奏神功果係仙傳者 此症食入盡吐糞如羊屎

治胃熱而嘔喜寒飲怕熱飲是也用乾葛半下姜汁煮各三錢甘竹錢二每服五錢加竹

茹新青竹刮去外面姜錢一黑枣個一水煎溫服

嘔吐頭痛忽寒忽熱者 柴胡錢四半下二錢黃芩錢二甘竹錢三青

黛一錢過病多日者加土沙參錢三人參錢一更好共末生姜汁打麵糊丸

藟子大白湯下三錢

隔噎及胃熱嘔吐不止者

蘆根用土茅草根各四

俱搥碎水四碗煮



至二碗服 孕婦惡阻單用蘆根一味

翻胃及乾嘔不止 甘蔗汁碗姜汁碗和勻每次一碗細啣之

治嘔吐利膈氣止嘔噦又治卒嘔吐不食 枇杷葉洗淨水煎飲之

治胃腕有死血乾燥枯槁食下作痛翻胃便秘者 薤汁牛乳

等分和勻不時細啣之 甘蔗常吃亦好

忽然嘔吐不止及久病聞藥即吐聞食即吐無法可治 錫齊下龜

心土研細水調為丸塞兩鼻孔再用赤石脂研細末以人參湯和用

茶匙緩挑入喉中少刻又挑數匙俟吐止氣回靜定之後方用

人參湯對入米湯內亦以匙挑飲則新愈矣

嘔吐不止或類膈噎反胃用此止吐 烏藥兩錢沉香錢五甘草錢四人參錢三

共極細末用生姜切薄片粘藥末少許連姜細嚼嚥少時又用

絡索米 治脾胃虛弱不思飲食食入不消與膈噎相似用 清明柳樹

枝一大把熬成綠湯又用北方小米不拘多少煮撈乾飯置匾內晒白  
麵拌勻如法晒乾袋盛懸通風處用時先燒滾湯以米投下住火其  
米浮起則熟可食不可久煮久則成糊矣

治膈氣反胃嘔吐梅核氣胃脘中痛者 陳皮一兩 生薑二兩 水三碗煎一  
碗細溫服

渴欲飲水水入即吐名曰水逆 澤瀉二錢 猪苓 白茯苓 白朮土

肉桂錢各一水煎冰冷服之 嘔吐而思飲凉水者即與之再服後藥

猪苓 澤瀉 白朮土各一兩為末米飲調一錢一日三服

嘔吐者往往作渴今反不渴因心中有痰飲也 半夏一兩 生薑錢五水

二碗煎一服

治起居飲食如常但時常吐清水甚多者用 蒼朮米泔浸換三日刮去

白脂麻一兩水浸研爛取汁 大黑枣三十枚煮上將麻汁同枣搗成稀膏入米拌

勻入臼搗熟丸梧桐子大每空心溫水下五十九漸加至百丸 忌桃李雀鴿

冷涎翻胃 其症欲發時先流冷涎次則吐食治之不早必危 胸中

必痛以有積血故也

生姜自然汁

一茶鍾

大黃

二兩于火上四面炙透

以汁盡為度切

每用一錢另用陳米一把葱白二莖水一碗煎

分先將葱白嚼食再將湯調末服之不十日除根

治吐冷涎如泉湧者 此飲食如常但吐涎者用之

吳茱萸

揀淨滾水

次泡三每三錢煎湯待涎流盡即飲之二三次即愈

嘔濃

別無他病

古今無治法惟調其飲食適其寒溫膿盡自愈

傷酒嘔吐

蓋元散生姜自然汁為丸每溫水送下一二錢

治虛弱及老人嘔吐惡心中煩燥不寧者 人參一枚細嚼緩嚥可以立止

又翻胃方

藕風乾去頭二段不用只取稍爛一日一枝細嚼緩嚥

治人無他病只覺胸中滿悶時噫氣不能食

真神曲 赤石脂各

等分為末不拘時白湯送下三錢



○ 洩瀉門

治暑濕停飲暴瀉小便不利

蒼木

泔炒一錢五分

厚朴姜炒陳皮

猪苓

澤瀉

茯苓各一錢

白朮分

甘草分

砂仁各五分

木香分煨姜二錢

水煎溫服

熱瀉 口渴小便短赤糞如黃糜肛門火熱者是也

益元散燈心湯或井水調下二三錢

香連丸更好

治暑天暴瀉壯脾溫胃及治飲食所傷胸膈痞悶

真神曲炒蒼朮

米泔

等分為末麵糊丸米飲下五十九不拘時服

外用生薑膏藥節

食便愈

方在小兒門

治食積瀉

肚臍一塊痛或臍旁有一條硬手按之更痛二而瀉後痛

止少刻又痛又瀉是也

只實熱炒

白朮

土炒二兩

砂仁

炒去壳七錢

木香

錢荷葉

包飯灰火內煨焦和藥末為丸菜豆大每三錢空心白湯下節食自愈





治腹痛作瀉瀉後痛不減者 此非傷食

白朮

土炒

白芍

肉桂水

陳皮

炒過

防風

一兩

為末

每三錢

空心

滾水

調

下

調

下

淺瀉方

紅米

炒

黑豆

炒各

一把

煎湯

飲之

治水瀉

脾虛瀉

用雄猪肚

一具

入蒜

十數頭

自早煮

至晚入

平胃散

散

散

散

散

散

散

散

三兩

搗九

梧子

大每服

百九

空心

米飲下

飲下

飲下

飲下

飲下

飲下

飲下

飲下

飲下

飲下

脾瀉用

白朮

切片

大黑枣

半斤

層木

層木

層木

層木

層木

層木

層木

層木

層木

層木

層木

層木

晒乾為末

再加

松花粉

炒黃

一兩

米糊

每三錢

米湯下

湯下

湯下

湯下

湯下

湯下

湯下

湯下

湯下

治五更侵晨定瀉

一二次者

破故紙

鹽炒

肉苁蓉

二兩

比五味

吳茱萸

吳茱萸

吳茱萸

吳茱萸

吳茱萸

吳茱萸

吳茱萸

吳茱萸

吳茱萸

吳茱萸

莢

鹽水泡三

次各一兩

共末用

生薑

而紅

冬

同煮

爛取

冬肉

同藥

搗勻

為

為

為

為

為

為

九桐子

大每服

三錢

米飲下

飲下

飲下

飲下

飲下

飲下

飲下

飲下

飲下

飲下

飲下

飲下

飲下

飲下

治老人虛人久瀉

不止

胃虛

難受

藥者

此方

救

人

多矣

陳

臘

肉

骨

灰

二

兩

兩

鍋

心

飯

焦

而

真

松

花

粉

一

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩



實用多少煎湯送下一錢一日三服

洩瀉膏藥

治久瀉

酸石榴皮一味水燉成膏加香射少許貼臍以帛縛之

洩瀉三五年不愈者

灸法

用稻草一根從面而前頭髮盡處抵髀再分中

對摺比至頭頂心當中以筆點記以艾茸搓如菜豆大放上點灸三

五壯即效 此即百會穴也



清水瀉用車前子揀淨炒為末空心或食前白湯服二不

水瀉不止 枯礬 風化石灰 乾麴 等分為末九如菜豆大每服一不即止

水瀉方用 烏梅仁 烏藥 赤青鹽 車 白水煎滾吃

○ 痢疾門 荆廷實痢疾四方

第一方 川黃連 條芩 生白芍

山查肉 各一錢 小青皮 炒

只壳 炒 紫厚朴 姜汁 兵郎 各八分 當歸

甘草 地榆 醋 炒 各 桃仁 炒

皮一 紅花 細木香 分 水 碗 煎 空心服 純白者 去 地榆 桃仁

錢 加 桶紅 分 木香 分 滯澁之甚者 加大黃 酒 炒 服一二劑仍除大

黃 此方用于三五日神效十日內亦效惟半月之後用第二方

第二方 川黃連 條芩 白芍 以上三味各生 四分酒炒四分 山查肉 錢 當歸 分 青



皮 橘紅 兵即 厚朴姜汁炒 甘草生二分 桃仁分六 地榆分四

酒紅花分木香 分水煎 又有延至月餘覺脾胃弱者用

第三方 白芍 黃芩酒炒各六分 橘紅 薑炒 木香各三分 地榆醋炒四分

人參 白木土炒 當歸 甘草各五分 紅花分二 水煎服 以上三方收

效最奇惟婦人有孕者戒去紅花桃仁兵即

噤口痢毒在胃口也用第一方煎分五六次服令胃口毒氣漸開服完

一劑不惟藥可進食飲亦漸可進不必更用他藥

第四方 蘼艾搗如綿以粉打漿拌 陳香薷 苦參略 烏藥六分 木香三分

甘草兩 牽牛頭末 兵即各四 石共四十二兩為細末水疊成丸外用鬱金二

研末為衣磁罐密封每服三錢量人大小用之姜湯送下惟血痢砂

糖湯下此痢疾之神藥也

血痢不止用 木耳炒 研末五錢溫酒調下

治赤白痢膿血相雜裏急後重腹痛一服效

川黃連

四兩用酒洗淨

全炒乾揀去黃不用

陳只壳三兩右細末每服三錢空心酒調下

噤口痢陳倉米湯下

又方

金星鳳尾草

皆有黃點者是連根一大把

陳米撮姜片

葱白連鬚

水三碗煎一碗入好燒酒半杯蜜三匙調和每乘熱服一小杯少刻再

服約一日服盡忌口味

如白痢多者姜片葱根

噤口丹方

大水紅菱角

連壳蒂一兩

老生姜

錢黑砂糖

半酒杯

同搗爛

絞汁茶匙挑細二潤下

痢疾腸鳴小腹痛如刀割

乳香油去油各一錢

溫酒調下

暑月熱痢

白蘿蔔連皮搗碎拌蜜食之

外用砂土鋪地以水潑濕

令病人下便肛門得其涼氣可以清入臟腑矣

治痢日久不止或噤口勢重者

初起者勿服

金色鯉魚

一二斤

如常用鹽醬蔥必

用胡椒末

錢盛在面前聞其香氣欲食即聽意食之若連魚和湯飽食即愈

