

傷寒要旨藥方

二



傷寒要旨藥方



炮灸煎煮例



凡湯皆咬咀謂剉如麻豆大利湯欲生宜少水而多取也補湯欲熟

凡散皆杵羅細末

凡用生薑大棗竹葉粳米苦蕒實皆煎時入也膠飴朴硝麝阿膠皆湯成去滓後再入煎一沸令勻

凡方稱熬者皆為炒篩者謂羅

厚朴去皮生薑汁炙

甘草炙

枳實去穰麩炒宜用商州大枳殼佳

牡礪熬

大黃本法用清酒洗今或於飯甑中略蒸

過或濕紙裹微煨

杏仁去皮尖

犀角鎔取屑

棗擘破煮

麥門冬去心杵

半夏湯洗七遍

鱉甲湯浸刮洗淨醋炙焦黃

生地黄如無即用乾地黄五兩當生者一斤
桂削去厚皮至有味處止

芒硝如無只用朴硝

橘皮去穰

附子炮裂去皮每箇作八片

麻黃去根節

脉浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛
寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼可發其汗
陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脇下
及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥
一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦耳
前後腫刺之小差外不解過十日脉續浮
者與小柴胡湯脉但浮無餘證者與本湯
不溺腹滿加噦者不治

大青龍湯

二證



太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗
出而煩躁者本湯主之若脉微弱汗出惡
風者不可服之服之則厥逆筋惕肉瞤此
為逆也

傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少
陰證者以本湯發之

小青龍湯二證

傷寒表不解心下水氣乾嘔發熱而欬
或渴或利或噎或小便不利小腹滿或喘

各隨證加減用藥
有法見本方中

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服
湯已渴者此寒去欲解也本湯主之

乾薑附子湯 一證

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安
靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者

新加湯 一證

發汗後身疼痛脉沉遲者

麻黃杏子甘草石膏湯 一證

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者與本湯

白虎加人參湯 五證

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者

傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾躁而煩欲飲水數升者

傷寒無大熱口躁渴心煩背微惡寒

陽明病若渴欲飲水口乾舌躁

傷寒脉浮發熱無汗其表不解不可與白
虎湯渴欲飲水無表證者本湯

桂枝甘草湯 一證

發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得
按者

茯苓桂枝甘草大棗湯 證

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚

厚朴半夏生薑甘草人參湯 一證

發汗後腹脹滿者

伏苓桂枝白朮甘草湯 一證

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胃起則
頭眩脉沉緊發汗則動經身為振振搖者

芍藥甘草附子湯 一證

發汗病不解反惡寒者虛故也此湯王之

伏苓四逆湯 一證

發汗若下之病仍不解煩躁者

五苓散 七證

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者發汗已脉浮數煩渴者

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐名曰水逆本湯主之

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口躁煩小便不利者

一方云忍之一日乃愈

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復



梔子豉湯

梔子甘草豉湯梔子
生薑豉湯附六證

發汗後水藥不得入口爲逆若更發汗必
吐下不止發汗吐下後虛煩不得眠若劇
者必反覆顛倒心中懊懣本湯主之若少
氣者梔子甘草豉湯若嘔者梔子生薑豉
湯

發汗若下之而煩熱胃中窒者

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結
痛者未欲解也

陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤反譟語若加溫針必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊懣舌上胎者

陽明病下之其外有熱手足溫不結胃心中懊懣飢不能食但頭汗出者

厥陰下利後更煩按之心下濡者爲虛煩也

梔子甘草豉湯

太陽病發汗吐下後虛煩不得眠若劇者
必反覆顛倒心中懊懣梔子豉湯主之若
少氣者本湯

梔子生薑豉湯

太陽病發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必
反覆顛倒心中懊懣梔子豉湯主之若嘔
者本湯

梔子乾薑湯 一證

傷寒醫以圓藥大下之身熱不去微煩者

梔子厚朴湯

傷寒下後心煩腹滿卧起不安者

真武湯

二證

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣其人或欬或小便利或下利或嘔

有加減法見方中

禹餘糧圓

本方關一證

汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰腫者

四逆湯

十三證

傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏本湯

病發熱頭痛脉反沉若不差身體疼痛當救其裏

陽明病脉浮而遲表熱裏寒下利清穀

少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胃中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之

自利不渴者屬太陰以其臟有寒故也當溫之

少陰病脉沉者急溫之

厥陰病大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者

