

丹
溪
摘
玄

四

丹溪摘玄卷之七

秘結門

丹溪先生云秘結者人所有何也彼有七情之氣而結於五臟故不能流通大便秘結亦有太腸暴熱以秘結者更脾胃不和氣血所受故醫者亦不能施治然則何以治之但先看病之所受根原之所來則可下藥或有脾胃中伏火大便乾燥不通不思飲食而乃風結血結亦有小便婦人新產失血耗氣走脫津液令人秘結當隨証施治之

三和散治七情之氣結於五臟不能流通以故脾胃不和心腹



痞悶大便秘結

羌活

紫蘇

木匠

沉香各兩

木香

白朮

檳榔

甘草

陳皮

各錢五分

芎藭三兩

大腹皮

大二兩

右剉每伍錢水煎

蜜導法凡便秘結服藥不能通利宜此導之苦土灰根

猪膽汁皆可為導蜜肆兩

右置銅器中微火煎之稍凝如飴狀攪之勿焦熱

而急捻作挺子如指許大納於谷導中以手按住

大便來時乃去之

一方入猪膽汁皂角末簿等各少許入內更効



試効潤腸丸

治脾胃中伏火大便秘澁或乾燥不通全不思食此乃風結
秘血結秘皆令秘澁而不通也風以潤之血以和之和血疎風
自然通也

桃仁炮 羌活 大黃煨 當歸 金銀 麻子仁半升

右以桃仁麻仁研如泥入羅末藥勻蜜丸每五六十丸至一百
丸空心白湯下以通為度如不通而茲其榮盛者急以
酒洗大黃以利之

一方加郁李仁半兩木香檳榔各二錢五分
如血澁大便秘者加桃仁酒洗大黃如風結燥大便不

行加麻仁大黃如風澀大便不行者皂角秦艽大黃
以利之如脉澀覺身氣澀而大便不通加郁李仁大黃
以除氣澀

當歸潤燥湯

升麻 生地黄^{各錢} 麻子仁^{研如泥} 當歸 熟地黄

葶草 桃仁^{泥子研} 大黃^{煨各錢} 紅花^{伍分}

右剉入另研藥郁作一服水二鍾煎去粗食消尽時熟服之
導滯通幽湯治大便唯幽門不通上衝吸門不開噎塞不

便燥閉上下治在幽門以辛潤之

當歸 升麻 桃仁^{泥各錢} 生地黄 熟地黄



紅花 炙甘草 各二分

右剉作一服水煎去粗調栲櫨細末伍分稍熟服之
活血潤燥丸治大便風秘不通常常燥結

當歸 錢 防風 一錢 羌活 大黃 用濕紙煨各兩 桃仁 泥 兩

麻仁泥 一兩五錢 皂角仁 燒存性去皮二兩五錢

其性得溫滑則燥結自除用之勿悞

右除桃仁麻仁另研外余亦之勻以蜜丸每五十九三兩後大
便自然潤日久不結燥貯紙封之無令見風

升陽瀉溫湯治膈咽不通逆氣裏急大便不通

青皮 二分 甘草 當歸 各二分 槐子 黃柏 生地黃

熟地黄 各五分 黄芩 二分 升麻 七分 桃仁 二錢 另研 蒼朮

右剉作一服水煎空心熱服之

神弓丸治熱氣為病大便秘結

大黃 黃芩 各兩 牽牛 頭末 滑石 各兩 各藏用丸 黃連

薄芎 川芎 各五錢 右末之水丸每二三十九水下

大承氣湯治濕熱結大便不通心腹作痛

大黃 乾姜 巴豆 各兩

右末之蜜丸如棗豆大每服三丸

木香枳榔丸治食傷太陰氣滯不通

木香 枳榔 黃連 枳殼 青皮 陳皮



蓬朮 各兩 黃芩

黃柏

香附 各兩 牽牛

頭朮 大黃 煨各四兩

右末之水丸每五六十九姜湯下

婦人加當歸一兩大便不通鼠婦五箇研水調半鍾服之即通

覆盆散

治大便不通草烏頭朮之以老葱頭火燒涎出蘸草烏味

小便不通門有血虛

氣虛

有疾

氣閉塞

實熱

丹溪云病有閉有格則不得小便格則吐逆閉乃無出之由皆邪熱為病也分在氣在血渴與不渴如渴而小便不利者邪熱在上焦氣分也因肺燥不得生治宜清肺金滋虛化源此隔二也如不渴而小便不通者邪熱在下焦血分也



因熱閉腎與膀胱治宜補腎瀉穴用純涼之藥感此方
正化補重陰之不足也因脾濕不願而精氣不升故肺不
能生水則當燥脾健脾此膈三也凡病居上焦則渴居下
焦則不渴虛脈人迎大四倍於氣口則曰格氣口天四倍人
迎則曰關治法試效甚詳清肺用草麻子茯苓之類瀉
膀胱穴用黃柏知母之類燥脾健脾用蒼朮之類
又諸治而不通即用吐法吐以提其氣氣升則水自下
蓋氣承載其水也

探吐法

氣虛人參黃芪升麻之類先服之後吐或參芪藥

中探吐

血虛四物湯先服後吐芎歸湯探吐亦可

痰多二陳湯先服後吐皆用探藥

痰氣閉塞二陳湯加木通香附或加木香先服後吐亦用

探吐之法實熱當和之

一婦人脾疼後大小便不通此是痰隔中焦聚下焦二陳湯

加木通先服後煎粗吐

八正散治心經邪熱一切蘊毒咽乾口渴渴飲心訟面熱煩

燥不敢寧目赤睛痛疼唇焦鼻衄口舌生瘡咽喉

腫痛人治小便赤澀或痞閉不通及熱淋血淋並宜治之加

枳殼 車前子 地膚子 藿麥 篇蓄 滑石

炙甘草 山梔子 木通 大黃 如煨各等分

右剉每一兩水二鍾燈心一結煎

血淋諸淋去大黃加當歸鬱金海金沙青肺用

車前子茯苓之類瀉膀胱大用黃柏知母之類

燥脾健脾用蒼朮白朮之類

石薺散治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宣

臍腹急痛蓄作有特勞倦即發或尿如豈汁或

便出砂石出少起數

白芍 白朮 滑石 葵子 藿麥 石薺去毛



木通 各兩 當歸 炙甘草 王不留行 各兩

右末之煎小麥湯調下

白花散治膀胱有熱小便不通

朴硝 右末之每二錢煎茴香湯調下

再以朴硝一包放臍中外以土坭圍定臍外用水澆滲
朴硝入臍中即通

黃芩清肺湯治因肺燥而得之小便不通

黃芩 二錢 梔子 二個 右作一服水煎加鹽豉二十粒

滋陰化氣湯治因服熱藥過多小便不利或臍下悶痛不可忍

黃連 炒

黃柏 炒

炙甘草 各等分

如盡不通加知母右劉每五錢水煎

紅淋散治小便不通上喘

篇蓄二兩五錢灯心二根紅林參根二兩

右劉每二兩以河水二鍾煎

東垣曰此痰如何得利潔古曰無陽者陰無以生無
陰者陽無以化云膀胱者津液之府氣化則能出焉
因服熱藥過多乃亡陰也二藥助陰使氣得化故小
便得以通也或以滋腎丸服之其效更速

滋腎丸治不渴而小便閉熱在下焦血分也老人氣短

小便不通四物加參芪吞滋腎丸



知母酒制去皮 黃柏酒焙去肉 肉桂錢

內經曰熱者寒之遂用知母黃柏大苦寒為主治肉桂
辛熱與熱同體乃寒因熱用也

右木之熟水丸如茱實大每丸至二百丸沸湯空心
宿食清盡服之頃兩足令藥易下行也如小便利

前陰中如刀刺痛有惡物下為驗

清肺飲子治渴而小便不利邪熱在上焦氣分也

茯苓 楮苓 白朮各錢 澤瀉五錢分 琥珀五錢 燈心一錢

木通分 通草二錢 車前子炒錢 瞿麥五分 篇蓄分 肉桂五分

右細末每兩水煎或用八正散五苓散並宜



導氣除燥湯治小便閉澀不通乃血澀致氣不通而致澀也

知母酒制三錢 黃柏酒制三錢 滑石炒黃為末 澤瀉 茯苓各三錢

右剉每壹兩水三大盞煎

治大小便不通

連鬚葱白不得洗淡豆豉二十一粒一撮生姜一小塊同搗

爛炒溫填臍內絹縛之即通

又方

酸漿草大把車前子草一大握二件搗取汁入砂糖壹

錢右內調大鍾先喫半鍾不通在喫半鍾立效

治小便不通



單麻子^{三粒}春細熬於紙熬內插入莖眼立通

又方封臍

赤皮耳遂^題果浸水中半日末之入麝香少許葱汁調付臍內

治婦人小便不通將茹葉爲丸入陰戶內即通

急通小便方

芋麻根洗淨爛研攤紙上貼上腹連陰際須臾即通

附子散

治小便不通兩尺脉俱沉微乃陰虛故也用淋閉通滑之劑不效者附子鹽水炮兩澤瀉各剉每兩灯心一結水煎

琥珀散治老人虛人心氣悶塞小便不通

琥珀和心同研水飛為末每一錢煎人參湯下

轉胞滑石散治胞為熱所迫或忍小便俱冷水氣迫於

胞屈辟不得先漲水外應入不得入內澀應出不得出

小腹急痛不得小便小腹漲

寒水石兩 葵子 亂頭髮 白滑石 車前子

木通度節各兩 右劉水斗煮五升時時服之升即利

苓白湯治小便卒暴不通小腹彭急氣上衝心悶絕欲

死此由暴氣乘膀胱或從驚憂氣無所伸鬱閉

而不流氣衝胞系不正

