

傷寒論參注
二



傷寒論目錄

長沙公自序卷之首

辨太陽病脉證第一

上篇

桂枝湯 五苓散 桂枝加附子湯 桂枝去芍藥湯 桂枝

枝人參湯 葛根黃連黃芩湯 桂枝加芍藥湯 桂枝

去芍藥加附子湯 桂枝加厚朴杏仁湯 桃核承氣湯

抵當湯 十棗湯 大陷胸湯 大陷胃丸 蜜蛤散

白散

共十四方

中篇



麻黃湯 小建中湯 茯苓甘草湯 芍藥甘草附子湯

禹餘糧丸方缺 桂枝新加湯 麻黃杏仁甘草石膏

湯 桂枝甘草湯 茯苓桂枝甘草大棗湯 厚朴生薑

甘草半夏人參湯 生薑瀉心湯 甘草瀉心湯 大黃

黃連瀉心湯 附子瀉心湯 半夏瀉心湯 赤石脂禹

餘糧湯 大柴胡湯 旋覆代赭石湯 小陷胸湯 柴

胡桂枝湯 柴胡加龍骨牡蠣湯 炙甘草湯 四逆湯

梔子厚朴湯 梔子乾薑湯 梔子豉湯 梔子甘草

豉湯 梔子生薑豉湯 乾薑附子湯 茯苓桂枝朮甘

草湯 抵當丸 桂枝附子湯 桂枝附子去桂枝加朮

湯 甘草附子湯 麻黃連軀赤小豆湯 梔子蘘皮湯

共三十一方

下篇

大青龍湯 真武湯 桂枝麻黃各半湯 桂枝二越婢

一湯 桂枝二麻黃一湯 桂枝湯去桂加茯苓朮湯

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯
桂枝甘草龍骨湯
桂枝甘草湯
芍藥甘草湯
茯苓四逆湯
黃連湯
小青龍湯
白虎湯
白虎加人參湯

共一十五方。篇中有證象陽旦句而原文未著陽旦湯
方喻氏因謂桂枝湯加黃芩則名陽旦湯加桂則名陰旦
湯意近傳會
姑存其說
見後麻象陽旦條下

辨陽明病脉證第二

上篇

小承氣湯
調胃承氣湯
猪苓湯
茵陳蒿湯
共四方

中篇



蜜導煎方

猪膽汁方

土瓜根方

大承氣湯

麻

丸

共五方

下篇

辨少陽病脉證第三

小柴胡湯

柴胡桂枝乾薑湯

共五方

附合病併病第四

附字頂格予寫

桂枝加葛根湯

葛根湯

葛根加半夏湯

黃芩湯

黃芩加半夏薑湯

共五方



壞病第五

痰病第六

似低一字

瓜蒂散

辨太陰病脉證第七

桂枝加芍藥湯
共二方

桂枝加大黃湯

辨少陰病脉證第八

前篇

麻黃附子細辛湯
黃湯 白通湯

白通加人尿

麻黃附子甘草湯
吳茱萸湯
通脉四逆湯

目次

四逆湯



共七方

後篇

黃連阿膠湯 桃花湯 豬膚湯 甘草湯 桔梗湯
半夏散及湯 苦酒湯 四逆散

共八方

辨厥陰病脉證第九

烏梅丸 當歸四逆湯 當歸四逆加吳茱萸生薑湯
麻黃升麻湯 乾薑黃連黃芩人參湯 白頭翁湯

共六方

過經不解第十



柴胡加芒消湯

差後勞復食復陰陽易病第十

枳實梔子豉湯 牡蠣澤瀉散 理中丸 竹葉石膏湯

燒裨散

共五方

以上三行俱低一格

溫病第十

傷寒論後編目錄

辨痙濕暍病脉證第十

辨霍亂病脉證第十四

辨脉法第十五

另作一頁
後編之前

平脉法第廿六

可汗第廿七

不可汗第廿八

可吐第廿九

不可吐第卅

可下第卅一

不可下第卅二

序例附卷末



傷寒論參証

王更生求正錄

中篇
辨太陽病脈證 中篇

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者
從汗出不使停留也
此篇所載皆

名曰傷寒

原也

營為表之陰寒屬陰邪須待閉鬱而始發熱故有或已或未之辨或未者將然之辭非終不發熱也必者一定之辭言無不惡寒體痛之傷寒也太陽之上寒氣主之其經則網維周身故惡寒體痛也寒性勁急故脈緊舒氏曰嘔逆

太陽中篇



者寒飲上僭也不可發汗且非太陽的對之證
或兼見者有之未可云必也此二字疑有錯誤

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃

湯主之

太陽經脈起於目內眥上額交巔入絡腦還出別下項循
肩膊內挾脊抵腰中至足小指出其端寒邪客於其經則
營血凝泣所經之處無不痛也惡風義見上篇無汗者傷
寒實邪腠理閉密雖發熱而汗不出不似中風虛邪發熱
而汗自出也陽氣被寒邪所遏故逆而為喘
主之以麻黃湯者解表發汗逐邪安正也

麻黃湯方

麻黃 三兩 桂枝 二兩 甘草 一兩 杏仁 七十個
湯 去節 炙 浸去皮尖



右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取
升半去渣溫服八合覆取微似汗不須歠粥餘如桂枝法將

息

舒氏曰桂枝湯中用芍藥以內護於營麻黃湯中用桂枝
以外導於衛此陰陽互根之妙也後人謬謂麻黃性猛必
使桂枝以監之不知營行脉中衛行脉外營邪出表必假
道於衛用麻黃發出營分之邪用桂枝於衛外接應正所
以助麻黃而成發表之功何為監耶胸中為太陽所主寒
邪外束營衛閉固氣不得泄壅而為喘方中杏仁取其利
氣也用麻黃者必當察其人本氣無虧方可徑用若元陰
不足方中宜加當歸地黃真陽素虛宜加附子脾胃素有
蓄熱者宜加石膏

傷寒一日太陽受之脉若翕者為不傳頗欲吐若躁煩脉數急者為傳也傷寒二三日陽明少陽症不見者為不傳也

傳經之論不一程氏以按日傳經內經為熱病言非為傷寒言故證則躁煩傷寒一日無此證也脉則數急傷寒一日無此脉也所以為躁煩數急者皆熱之為之也若寒邪多滯故經氣阻而壅逆不傳或邪久不罷只有向裏之虞謂此經之病不除彼經之病又曰此經之病而起故或從太陽而解或從陽明而解不必遍及或數餘日仍在太陽或數餘日方過陽明不必刻期或從太陽而陽明或從太陽而少陽不必挨經且寒熱各隨經氣而變見不必有熱無寒此之謂轉屬非傳經也張令韶曰寒暑燥濕風火乃天之六氣人與天同體亦有此六氣以相應太陽之上寒氣主之人感於寒必首傷太陽膚表之第一層所為兩寒相得也然亦有不從太陽而竟至陽明少陽以及三陰者如

靈樞中於面則下陽明中於項則下太陽中於頰則下少陽
陽其中於膺背兩脇亦中其經中於陰者常從跗臂始此
皆不必拘於首傷太陽者也至於傳經之法則無病之人
其氣自順由裏而外一日厥陰二日少陰以次傳至太陽
週而復始者此為正傳傷寒之人其氣則逆由外而裏一
日太陽二日陽明以次傳至厥陰一定不移者為氣傳皆
正傳非病傳也病邪之傳則不拘時日無分次第傳某經
則見某經之證當隨其經而治之也張氏主此說以註直
解所以於論中二三日七八日十三日各條按氣傳之期
以參合經義雖不無牽強之處然頗多合解但治法究以
病傳為主所論氣傳者無甚關於病症之出入是編以簡
潔為期不敢多錄泛義故僅於柴胡湯條下存藉少陽之
樞以轉達太陽之氣一節其他亦可按期而會其說矣再
按傳足不傳手乃無稽之謬談明者多鄙之景岳張氏辨
駁尤詳故以文多
不復贅當另參之考以明其義



傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之

傷寒二三日未經誤治亦無傳變之證但心中悸而煩者由其人腎氣素弱營血枯泣故不能作汗而見此證也宜重加熟地黃當歸於麻黃湯內則腎氣鎮定而悸除營血充周而煩止自然得汗而解矣小建中湯倍用芍藥之酸寒恐營氣益滯而汗愈不可得此必有錯誤處不合仲景法也

小建中湯方

桂枝

三兩

芍藥

六兩

甘草

二兩

生薑

三兩切

膠飴

一升

大棗

十二枚擘

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火稍解溫

服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故也

太陽傷寒者加溫鍼必驚也

喻氏曰溫鍼欲以攻寒不知鍼用火溫營血得之反增其熱營氣通於心引火氣以內逼神明必致驚惶而神亂也

脉浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰以下必

重而痺名火逆也

痺閉也血氣為邪所閉不得通行而病也上篇微數之脉本為陰虛多熱誤以火攻之則致焦骨傷筋之逆此條脉浮病全在表不從內驅邪使出而外用火攻以閉塞邪氣是為火逆病在腰以下者氣閉於上故不運於下因重着而為痺與雜症之痺不同也再按逆邪因火而盛病氣本虛可知非如太陽中風以火發汗邪風被火熱兩陽相灼



舒氏曰此證必從腰以下未得汗故但下身增劇其相其元氣津液以去其邪而必從其二便中以求消息也

條之病氣本實也有餘者上炎故口乾咽爛頭汗噦逆不足者下竭故腰以下必重而痺

脈浮者病在表可發汗宜麻黃湯脈浮而數者可發汗宜麻黃湯

劉宏璧曰但脈浮不緊何以知其表寒實也必然無汗始可發也脈數何以知其未入裏也以脈本浮故可汗也

傷寒發汗已解半日許復煩脈浮數者可更發汗宜桂枝湯

傷寒發汗以麻黃湯發之也復煩方氏謂發汗或不如法或汗後不謹風寒是也桂枝湯本太陽驅風發汗之劑今

傷寒汗解半日許復煩而脈浮數為邪復集於表而有欲傳之象正宜用桂枝湯復發其汗而自愈耳更去聲作更

復解若依舊說作平聲更換義脈浮數者下何不直言宜更桂枝湯

