

永類鈴方

四



求類鈴方卷第六

碧山李

仲南

集成

青

原孫

允賢

校定

傷寒自汗

附盜汗頭汗手足汗無汗

心之所藏任內者為血發於外者為汗蓋汗乃心之液自汗之證皆由腎俱虛所致陰虛陽必勝發熱而自汗陽虛陰必乘發厥而自汗此陰陽偏勝致之傷寒有自汗者和氣干衛氣不因發散無問昏醒浸浸自出有盜汗者謂不睡則不出方睡則湊出覺而又不出也雜病中盜汗實其陽虛傷寒盜汗非若雜病之虛是由邪氣在半表半裏使然也此邪氣侵行於裏外連表邪及睡則衛氣行於裏眾表中陽氣不絀津液得泄故但睡而汗出覺而氣散於表而汗止矣然面紅而已有手足汗者實主四肢陽明之證也陽明和振傳供陽明為津液之主病則自汗出有頭汗者亦屬陽明蓋邪搏諸陽津液上蒸見於頭也必寒表活潑利為先

脉病證

傷寒有汗者九證

治

風邪干衛發熱自汗出此衛不和 寒邪傷榮發熱汗及其傳裏為熱亦自汗也 暑邪干衛太陽暈汗出惡寒身熱而渴溫邪干衛汗多而濡此其風濕 暑者

浮緩

衛氣不和自汗太陽病發熱汗出此榮弱衛強為不和 傷風自汗太陽發熱汗出惡風為中風

欲救其和用桂枝湯自汗而煩不可服 桂枝湯脉弱而煩不可服



太陽病項背強几反汗出惡風
汗出而渴五苓散汗出不渴

自汗不止惡風四肢拘急足屈難伸小便難

自汗小便數不可用桂枝湯加附子宜

自汗小便數或渴誤用桂枝附子及表即

咽乾煩躁服逆嘔吐

若脈逆嘔吐食逆是陽虛與芍藥甘草湯脚即健

自汗喘不利汗後微喘表尚未解

發熱汗出復惡寒者下之若下後惡寒者或心下

痞復惡寒汗出者為表虛

發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者為表實

發汗大下後身乾煩躁不得眠欲飲水但與之胃和即

發熱汗出未解中痞微嘔下利

陽明病自汗不惡寒反惡熱者微汗自出若汗多則

胃燥而渴或大便秘潮熱不可與下必致發熱

陽明自汗小便應少而小便自利不可下汗之即死

若汗出多微惡寒表未解

陽明法多汗若熱汗而喘發汗則愈

冬月陽明病潮熱發作有時但欲淨者

風溫自汗太陽證頭眩身熱自汗不解身重喘

桂枝加乾薑湯

茯苓甘草湯

桂枝湯加附子

芍藥甘草湯

甘草乾姜湯以復其陽

此藥補虛退熱通滯服桂枝證猶存者

桂枝加厚朴杏仁湯微汗解

附子瀉心湯

五苓散若陽明多難治不可而

自愈

太陰胡湯多陽明病汗多者急下之

而證悉下之太陰胡湯調胃承氣湯

外禁承氣湯服之九種

宜桂枝湯小汗之

宜麻黃湯

必盜汗黃芩湯

浮

浮

浮

陰陽俱浮

大陽通目是
賊寒奇汗
實
脈實不可汗

浮

浮

浮

陰陽俱浮



微而

尺寸緊或
暴而欲絕

沉細

沉弦

沉緩
欲絕

惡多汗者謂之常汗在少陰陽不可汗汗則散
語煩躁不眠驚悸自汗

中者自汗太陽中熱者咽若汗出惡寒身重而渴
或手足冷而心倦怠而不痛重

中濕自汗汗出不止腎主濕故知汗出不止

亡陽自汗太陽病發汗多遂漏不止其人惡風當溫其經

傷寒汗出亡陽此屬少陰當咽病吐利其人執
不去內拘急而脈微逆而惡寒

若汗多不止惡風煩躁不得卧先服

柔症自汗太陽病與傷寒相似搖頭目眩背反

張發癰之狀有汗出而不惡寒

霍亂自汗吐利汗出發熱而又拘急手足厥逆

三陽合病汗後譫語之則微汗手足厥冷者自汗

身涼汗出心膈下鞅痛或乾嘔頭皮煩赤此表解

裏未和尚有水

陰毒證汗出手足逆冷胸腹滿痛咽疼吐

下利煩渴身如被杖

病人腹間有動氣不可汗發汗則頭眩汗不止筋

惕肉瞤為逆難治

中脘有痰食憎食發熱惡風自汗胃滿氣衝

姜糖湯

白虎湯

表虛桂枝加附子湯

四逆湯汗多更以溫粉撲之

防風梔子湯次服建中湯

桂枝加葛根湯

小續命湯至麻黃加葛根

四逆湯

白虎加人參湯

十棗湯

四逆湯等辛熱之藥

先服防風白朮牡蠣湯汗止

服建中湯

前胡半夏湯金沸草散

細或沉

不得息頭不疼項不強有似傷寒

大半夏湯

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足心下滿不大便

小柴胡湯

輒為陽鬱熱有表復有裏脈雖沉緊結為陰病

柴胡桂枝乾姜湯

傷寒五六日汗下胸膈滿微結不利渴而不嘔頭

汗出往來寒熱心煩者此表未解也

五苓散茵陳散

若但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水

小柴胡去半夏加人參桂枝湯

將水此證熱在裏身必發黃

梔子豉湯

陽明病之其外有熱手足溫結胸中懊憹不食口出

小半夏加茯苓湯

若心下緊滿無大熱頭汗出者此水結在胃脇

刺期門隨其氣而瀉之或然汗出則愈

陽明病下血識語者此熱入血室也頭汗出者

亂表實裏虛故也

淡伏滑

若汗出識語有燥屎也過經乃可下之早語必

承氣湯

頭汗證有熱厥蓋下證悉具凡四逆者是失下後

諸藥凡逆冷皆屬厥陰不可汗下此則

氣血不通更便厥醫不識便疑是陰厥誤用熱

仲景所謂厥深熱亦深應下之若反

藥大抵熱厥厥沉伏而滑頭上有汗手雖冷時後

發汗必口傷爛赤

淨發熱急

指心以掌足掌心皆溫非正厥逆也消消息之

脈尚浮緩者桂枝湯

細家不可汗汗出額上而面微紅不得眠汗而妨

下之愈

手足汗出為熱於胃津液傷逆出大便必難或識語

不可下者

若陽明中寒不能食小使不利手足汗出者

不可下者

太便秘後後澀知胃冷水谷不別故也

陰陽爭則戰邪氣將出邪與正爭其人本虛戰正氣

勝則戰也後復熱而為汗解矣



傷寒無汗者七證

太陽傷寒 剛瘧病 太陰病 少陰病 厥陰病

冬陽明病 陰陽病 仲景云陰不得有汗

寒邪中榮膠理緻密津液內滲或水飲內蓄與太陽少陰皆無汗

寒邪在表而無汗者經至陽病惡風無汗而喘及脈浮緊無汗發熱及不出汗而煩

躁陽明病及無汗而便利三日嘔而咳手足厥者頭痛鼻乾不得汗脈浮無汗而

喘與其剛瘧無汗是也

邪氣行於裏而無汗者經云陽明無汗小便不利心中懊憹身必發黃及傷寒發熱

無汗渴飲水無表證者白虎加參湯與三陰為病不得有汗是也

水飲內蓄而無汗者經云服桂枝湯或下之仍頭痛項強發熱無汗心下滿微痛小便不

利桂枝去桂加茯苓白朮湯是津液內滲其陽虛而無汗也

陽虛無汗者諸陽為津液之主陽虛則津液少經云脈浮而遲遲為無陽不能作汗其

身必痒陽明病及無汗身如虫行皮中之狀此又虛故也用木附湯建中湯溫之

或當汗而不汗服湯至三劑而不得汗者死病也

或熱病脈躁盛而不得汗者黃帝謂陽脈之極也死此者為真病不治

雜病自汗

汗者元氣至陽之液也

明理論曰雜病中盜汗多責其陽虛陰虛陽必虛故發熱自汗陽虛陰必乘故發厥

自汗心腎俱虛以得之無問昏醒浸浸自出名曰自汗睡著汗出即名盜汗心虛所致

後因動汗出非自汗也內因多脈多微而瀉瀉而虛虛而弱弱之致心氣溢腎水升降水汗自止

夷堅志有僧喜于年用桑葉味帶露採摘焙乾為末空水飲調一錢收效奇乾落者亦可傷風

脉病證

風 惡風發汗不為漏風

暑 煩渴

濕 體重

真怒驚心 陰陽偏盛發厥

房室虛勞

瘰癧腸癰

產毒

治

桂枝湯汗不熱附子局方麥煎散落察撫弓湯

濟生消暑元究石玉屏風散治腰理不密

防已黃芪湯濟生木附湯

局方元散濟生痼黃芪湯其則三建湯加芪桂通見疾門

黃芪湯局方房散黃芪建湯濟生芪附湯寒散

十宣散附子建中湯

局方當歸黃芪湯外等清者再當歸羊肉湯

傷寒怔忡

太湯便利多飲水陽明煩嘔小便難少陽嘔下仍清悸誤下煩而胃裏乾汗過自冒甘桂證內轉自武其津液散氣同治

怔忡者即悸也血不足所致其由有氣虛者陽氣內弱心不安氣內動也有停飲者水停心下為火而惡水水既內停心不自安正氣內虛邪氣交擊而悸者虛而悸者又加其美或鎮固或化散尤當益其氣血耳

脉病證

治

浮數

太陽病汗不解發熱悸頭眩身動

欲擗地者例不可發汗

弦數

嘔吐發熱胸脇滿心下怔忡小便不利

小柴胡湯去黃芩加茯苓

真武湯



弦細而長結代

傷寒厥逆下利者宜先治水却治厥不爾則水氣散而無不矣

茯苓甘草湯若渴於肺必喘咳於胃必噦噎作利於皮膚為腫漬於腸則下利

傷寒心動悸

炙甘草湯

少陰病四逆或悸者氣虛也

四逆散加桂五分

傷寒飲水過多水停心下氣乘則悸

濟生茯苓飲子

傷寒三三息中悸而煩

小建中湯三因茯苓補心湯

雜病怔忡

即忪悸

怔忡者心血不足蓋心主血當則心君安多由汲汲富貴戚戚賤貧久思所愛慮失所重觸事不意其血虛耗氣鬱凝聚遂致怔忡在脾經脾主意意思所主屬內所因經損其心者養榮法當建補其血君有輔美或胃氣滯閉塞諸經令人怔忡此外邪替因心病况五飲停蓄壅塞中脘亦令怔忡

脉病證

治

心脉浮大而數為平脉弦為虛緩為失性忡則血不為虛必弦細而長是肝之象心母

風寒暑濕各明所因

思慮傷心血

痰飲停蓄

三因茯苓補湯清蓮子飲溫膽湯濟生排風湯加杏仁小便不調委散散如辰砂生薑湯加減參苓白朮散濟生養榮湯補元氣附子心丹局方平補鎮心丹十四元蘭易腎神散荆芥香散雄朱元龍齒元人參固本元溫膽湯壽星元濟生茯苓飲子龍齒丹二陳湯加早仁麥門冬本事衣衾遠志元馬香散

之屬子為虛
邪難病易治

經絡蓄熱

雜病驚悸

驚悸者心虛膽怯所致者君主官神明出焉膽者中正之官決斷出焉或因事太驚氣與痰
鬱變生諸證或氣悸之休倦自汗四支浮腫飲食無味心虛煩悶坐臥不安皆其候也驚膽
寒治之當寧心壯膽無不瘥矣

脉病證

治 通見心虛損門

氣鬱生痰自汗

肝氣虛

心氣弱

鬱證

動而弱

因事太驚

夢寐不祥
登高陟險

房事失精

今入悵悶
驚悸

溫膽湯簡易雄朱元鎮心養神湯

自汗沉香靈砂半夏退奇熱先交感丹三

濟生遠志元氣志膏酸早仁湯濟生補心元

簡易抱膽元龍煎湯煎心腹痛濟生加減七氣湯

十四卷元龍服空元太史絲元王開元氣志膏

簡易雄雞補元百選猪腰子補神效元簡易腎元

鍾乳靈砂法本益腎羊肝糊元

季冬余得怔悸之疾夜臥不安五流汗精神恍惚空忪茶湯食後參香散臨臥酸早仁湯或溫
膽湯噉心丹并灵砂丹先有寒戰背心發冷瘧收效既首大補湯煎導引升降之方逾月而愈
靈樞巨氣不足下氣有餘脾胃虛而心肺虛虛則營衛留於下之不以時故善忘也

雜病健忘

清蓮子飲執勞勞生驚中地黃湯局方清神散生黃清元
簡易集本事清元酒過吐逆古燥而悸生面黃早仁素



健忘者常帶善忘也意食不清神官不眠或心火熱甚則腎水衰而志不精皆能健忘治之當先理脾使神意清寧可也三因云健忘者善忘方思慮未定也又云恍然而忘其反也

脉病證

治

脾主意心善忘慮過度脾旺神不守眠濟生歸脾湯寧志養心散元壽星膏集事繁驚恐虛寒實其脾悅惚失面時黃補湯早仁湯三因小定元壽星膏補益智元

脾風易於令秋神早仁門冬參黃芪白芍連肉當歸遠志各半兩甘草一錢姜早煎

補心湯龜甲龍骨遠志葛蒲細木空酒調孔聖枕中方
豫知散治神思虛弱健忘白龍骨生虎骨酥炙遠志南等分細末生薑湯下日服令人聰慧

養生男子勿忘首神鬼不安多愁忘
心孔昏塞多忘善忘酒日密自至市買遠志軍市角中還為末服之勿令人知肘後方

傷寒不得眠臥

葉氏云傷寒夜陰主則今熱氣未散陽盛陰虛病後不眠陰氣未復也

脉病證

治

手

太陽證發大汗胃中乾煩躁不得眠欲飲水少與之
胃和自愈若脉浮小便不利發渴者

下後復發汗晝煩夜靜不嘔不渴無表證

脉沉微身無大熱者

汗出後虛煩不得眠其則反覆更倒心懊憹

五苓散

干姜兩附子不用仲景以干姜為主
恐其反陰姜有和陽生兩毒其傷寒

梔子豉湯吐之



大

傷寒大熱乾嘔呻吟錯語不得眠

黃連解毒湯

傷寒吐下後心煩氣多晝夜不得眠

酸棗湯

陽明病身熱目疼鼻乾不得眠

目疾門

汗多不惡風煩躁不得眠

自汗門

少陰病得之三日已心中煩不得眠

黃連阿膠湯

少陰病三日利而渴者而嘔心煩不得眠

朱苓湯

傷寒後發熱氣與諸陽相并陰氣未復病後不得眠

梔子烏梅湯

發汗後下之病仍不解煩躁者

茯苓四逆湯

風濕發汗已譫語煩擾不得眠者驚悸目亂無時

萎蕤湯

傷寒多眠但欲寐

脉病證

治

浮細

太陽證頭項強痛惡寒身重者外已解

小柴胡湯脉但浮者麻黃湯

尺寸浮

風溫證頭疼身熱自汗體重息喘身重不得眠

萎蕤湯不可發汗

微細沉遲

少陰證心煩欲吐不吐但欲寐或自利而渴小便白

理中湯乾姜甘草湯

若口燥舌乾而渴急下之又須看脉

寸微沉細

但欲寐者少陰證也急作四逆湯以復其陽若狀如傷寒四逆沉重忽忽喜眠須看
脣上下有瘡虫蝕五藏下脣有瘡虫蝕下部作狐惑證此濕毒所致



狐惑傷寒嘿嘿欲眠目不能開起者不安重者其喉為惑其聲啞也蝕下部為狐

桃仁湯黃連犀角湯
雄黃散散雄黃燒熏肛門

傷寒譫語一又作譫

傷寒胃中熱盛乘於心為熱胃則神昏亂而成譫妄有譫語者有獨語者有狂語者有譫言休有言亂者必見其熱之輕重也狂語言亂為重也

脉病證

治

傷寒不煩汗而汗大便秘小便赤手足溫譫語也傷寒四五

調胃承氣湯

日脉沈而喘滿沉為裏發其汗津液越出大便難表虛裏實

清矣

三陽合病腹滿身重難轉於中下利譫語清矣

白虎湯不可發汗

汗則譫語下之則額上汗手足厥逆若自汗者

白虎加參

凡諸諸脉

汗出譫語此為風也須下過經可之若之早言必亂表虛裏實

柴胡桂枝湯和胃通津液

極細逆

發汗多傷陽譫語此津液不和不可下

小承氣湯其則

微熱脉浮

下利譫語者有屎屎

柴胡加龍骨牡蛎湯

傷寒之食之腹滿煩驚小便不利譫語身重不可轉側

小柴胡湯黃芩合燒成炭服

婦人傷寒發熱經水適來者閉了暮譫語此熱入血室

小便利與抵當湯

此並未有熱非胃家實若犯胃氣晝夜譫語者急下小腹痛

姜豉湯詳見自汗門



共受膏浸

傷寒大熱乾嘔呻吟錯語不得眠

陽毒發狂往來妄言面赤身斑或下利赤黃

仲景云實則謬語虛則鄭聲大便秘小便赤是溫熱洪熱證語大便利手足冷脉微細鄭聲鄭重也重語也

黃連解毒湯

苦參大青苦酒厚麻黃苦之藥

傷寒發狂

經界於陽則狂之白重陽則狂諸經之狂為陽盛也傷寒熱毒在胃併於心至於狂為邪熱至極天於下則不能狂言言皆視為腎絕汗出復熱狂言不食失志死

脉病證

治

實

弦生瀋死

微而沉

太陽病熱結勝脫其始狂血且下者愈不愈其外不解

桂枝湯外解小腹急結桃仁承氣湯

陽毒煩躁狂走妄言面赤咽痛潮熱獨語死見鬼狀

陽毒狂脈湯大黃散桃仁湯

其者不識人循衣摸床惕不自安直視喘發狂語語

天承氣湯

無表裏證無寒熱燥渴不欲啗腹脹滿便反利大便

桃仁承氣湯

必無身黃發狂狂此血證為陰分

熱畜在裏熱狂為血毒近狂中逆則善忘惡言則內狂輕則邪承氣湯等用地黃湯其前抵當湯九

或大熱浮大對而反邪陽煩躁驚狂起卧不安狂投龍骨湯其胡加龍骨牡蠣湯

雜病癲癇

附鬼語狂邪邪鬼顛尸注

癲屬陽全歸於心癇屬陰歸於五藏癲者神不守舍狂言如有所見經年不得愈心經有損



夏為真病起經常執此清陰如痰涎發常下痰寧志癰則卒然眼倒口眼手口引攣脊脊強直身凝凍食頃方醒又當以輕痰順氣為先陽虛陰虛發癰陰虛陽實故狂

脉病諸

治

癰瘡者治之夏自安有肋心氣之藥

脈搏大

滑者生

緊急不治

熱狂脉实

全沉少死

顛厥虛可

治實則死

五癰

馬心羊脾皆難
牛肺作五種癰痰也

風痰

肺伏而緊面紅白赤
飲食不常氣不舒而稠

婦癰

經血不調或室女當
行不行風血而心

電胎中

多胎氣邪痰結胸
中升降不常

不治

狂走神聖自貴人多會風也當自重致顛與呻吟為邪所憑非狂也燒香紙酒水下寸已

平狂言語針大母指甲下即止風顛引脅痛發則耳作蟬鳴用天門冬末乾作末酒服方寸已

風癰抵住凡皂用燒存性著耳根並葉自乾四兩蜜陀僧不兩為末糊元朱砂為衣三四元早湯

鵝頭元見小兒方

朱砂遠志等并益本膏琥珀調經散經行自愈

冷證半黃清元灯湯下

溫膽湯竹茹湯小柴胡加姜附冬枳實羌活濟生蛇黃元

楊氏虎睛元胃弱嘔時服蘇合香元熱癰大便秘胃黃惡湯

白丸戒半為丸薄荷湯

濟生控涎丹百退歸神小青山白元子加全蠍皂角姜蘇括

蘭防驚氣元還元滾去單肝元香砂元備急神砂散

夏為真病起經常執此清陰如痰涎發常下痰寧志癰則卒然眼倒口眼手口引攣脊脊強直身凝凍食頃方醒又當以輕痰順氣為先陽虛陰虛發癰陰虛陽實故狂



下日服相退作二十元斷稠元然石英醋半煨七次兩白飛過兩作本酒稠元白湯下十元

尸注脉沉而不至或三部皆緊急用保附者兩手脉下大者小生短長

諸尸飛口道沉口風五五之氣挾外邪流注身注在也驗之以紙覆痛處燒病者頭髮令病者

以紙紙若若注髮粘着紙此注氣引之也脉浮大可治細數難治若果是鬼邪尸注有霍亂異

證者死入枕服之效鬼注勞瘵相傳受癰肝具陰乾為末水服方寸匕未知再作本事

巢氏導引法定神驗圖三過輒咽氣三過如此三百通乃止為之一日邪氣悉去不日病愈百日大病

除俗皆去面体光澤

傷寒勞復

勞為勞動之勞復為再發也傷寒新差後血氣未平餘熱未盡勞動其熱熱氣還經復熱有勞動外傷者非止強力持重遠行如梳頭洗面則動氣要悲思慮則勞神皆能復也况其過用者乎有飲食內傷者以執病已愈而強食熱有所藏因谷氣留滯兩陽相合故有所遺又曰病已差尚微煩設不了者以新虛不勝谷氣故令微煩損谷則愈夫傷寒邪氣之傳自表至裏發汗吐下自輕至重有次第差等不同其勞復則不然見其邪氣之復來必迎而奪之不待其傳經曰大病新差後勞復者枳實梔子豉湯吐之豈待虛煩懊懷之證如大黃則下之豈待腹滿讞語之候經曰傷寒新差後更發熱小柴胡湯主之脉浮者以汗解之脉沉實者以之亦欲便折其邪也蓋傷寒之邪自外入勞復之邪自內發發汗吐下隨宜施用也勞復食復諸勞尚同治若御內則死矣若男女相易則為陰陽易其不易自病者謂之勞復以資內損真氣外動邪熱真虛邪盛不可治矣

昔賢郵顧子獻不信華敷之診臨死吐舌數寸可戒也

雜病五勞六極

五勞者非傳尸骨蒸之謂由用意施為過傷五藏之氣本有虛實因其虛實而生寒熱

脉病證

若憂多弦

浮大沉緩

尚堪治氣

衆耗六

未弱弦

肝胃侵

脾如數則

涼休用藥

肝勞盡力謀慮而成

勞曲運神機而成

脾若意外致思而成

肺勞預事而憂而成

腎勞矜持忘即而成

虛寒則骨蒸筋脈煩悶

熱則關格不通毛悴色天

虛寒驚悸恍惚神志不甯

熱則口苦生瘡大便秘結

虛寒氣脹咽滿食不下噎氣

熱則腹不和脹滿氣急不安

虛寒心腹冷氣胸滿背痛吐逆

熱則氣喘面目苦腫

虛寒遺精白濁腰脊痠折

熱則小便赤澀痛陰生瘡

治

經曰形不足者溫以氣精不足者補以味用乎和滋補藥也

濟生續命湯十全補湯參肝俞

濟生參茸角散

濟生參志飲子酸棗仁湯

濟生黃芩湯

濟生白朮湯生薑未散大建脾散

濟生小甘露元

濟生溫肺湯

濟生二母湯

濟生羊腎元

濟生地黃元

脉病證

六極者由肺虛致臟虛葉衛失度無以養筋脉肉氣骨精六物雖極亦有虛實不同

治



肝傷筋極

虛則手足拘攣腹痛指甲痛轉筋
實則咳而脇痛肺心痛不可忍手足青黑

濟生木公散當歸拘攣續斷
濟生五加皮散

心傷脉極

虛則咳而心痛咽腫喉中介介如梗
實則無痰多渴唇舌赤語澀肌瘦

濟生秋神湯遠志仁朱砂龍齒
濟生麥門冬湯

脾傷肉極

虛則四肢倦悶即痛不食腹引肩背皆強
實則肌痺痿痺開汗泄泄緩弱急痛

濟生辛夏湯白豆蔻厚朴陳皮藿香
濟生薏苡仁散

肺傷氣極

虛則喘急肺痿腹滿熱煩喘燥咽乾
實則喘急胸腹脹滿熱煩喘燥咽乾

濟生則胡湯
濟生鹿角元益智五味鹿茸

腎傷骨極

虛則兩膝痠痛脊痛氣衰髮落枯槁
實則面焦耳鳴小便不通手足痛

濟生去冬湯
濟生鹿角元益智五味鹿茸

藏行盡
精相
視色即

虛則遺精滑泄小便急遺精移小
實則目昏耳鳴虛熱煩悶泄精

濟生石斛湯
濟生石斛湯

骨蒸勞瘵

瘵疾者數脾也... 骨蒸勞瘵... 其傳變為五種... 三六種... 九種... 其實所傷口在五藏... 此證不皆由氣虛弱勞傷... 腎而得或感六淫... 先為瘵疾... 以致咳嗽寒熱... 裏失於調治過於勞傷飲食所致其證... 令人肌肉羸瘦皮枯寒... 汗遺泄白濁或腰有塊或腦後兩邊有小結核或聚或散咳... 痰唾血卑用濟生羅氏... 法有驗今姑具其傳於五藏之六者其瘵至於六行極而至於筋... 脉肉氣骨精為六種... 治矣治法未極安嗽養脾或生肺金此治也

有瘵者所具藥味者可用矣... 補肺養脾湯內加棗仁元氣... 補肺肥化食則飲食生精血矣

