



醫學綱目卷之十一

肝膽部

大法

眩 癩癩 子癩

〔成無已〕云眩者非眩而見其眩。謂眼黑眩也。運者。運爲運轉之運。世謂之頭旋是也。

〔內經〕論眩皆屬肝木。屬上虛。丹溪論眩主於補虛。治痰降火。仲景治眩亦以痰飲爲先也。

諸風掉眩皆屬於肝。全文見診治

肝木作眩

〔河〕掉搖也。眩昏亂旋運也。風主動故也。所謂風氣動而頭目眩運者。由風木旺。必是金衰不能制木。而木復生火。風火皆屬陽。多爲兼化。陽主乎動。兩動相搏。則頭目爲之眩運而旋轉。故火本動也。焰得風則自旋轉。人或乘舟車。及作環舞而眩運者。其動不止。而左右紆曲。故經曰。曲直動搖。風之用也。眩運而嘔吐者。風熱甚故也。狗蒙招尤。目瞑耳聾。下實上虛。過在足少陽。厥陰甚則入肝。全文見治虛實法

〔本〕治肝厥頭暈。清頭目。鉤藤散。

鉤藤

陳皮

半夏

麥門冬

茯苓

各半兩

石膏

人參

甘菊

防風

各半兩

甘草

一分

右爲龜末。每服四錢。水一鍾半。生薑七片。煎至八分。溫服。

治肝厥狀如癰疾。不醒。嘔吐。醒後。頭虛。運發熱方。

麻黃

鉤藤取皮

石膏

乾葛

半夏麴

柴胡

甘草

枳殼

甘菊

右爲龜末。每服四錢。水一鍾半。生薑三片。棗一枚。同煎至八分。去渣溫服。

婦人患頭風者。十居其半。每發必掉眩。如在車上。蓋因血虛。肝有風邪熱故耳。素問云。狗蒙招搖。目眩耳聾。下實上虛。過在足少陽厥陰。甚則歸肝。蓋謂此也。余常取此方以授人。比他藥捷而效速。芎藭散。

川芎一兩

當歸三分

羌活

旋覆花

蔓荊子

細辛

石膏

橐本

荊芥穗

半夏麴炙

防風

熟地

甘草

各半兩

右爲末。每服二錢。水一大鍾。生薑三片。同煎至七分。去渣溫服。不拘時服。

右甘寒瀉風木。

〔羅〕風疲治驗

參政楊公。七旬有二。有風疲。於至元戊辰春。忽病

頭旋眼黑。目不見物。心神煩亂。兀兀欲吐。復不吐。心中如懊懣之狀。頭偏痛微腫。面赤色。腮頰亦赤色。足胫冷。命予治之。余料之。此少壯之時。喜飲酒。久積濕熱於內。風痰內作。上熱下寒。是陰陽不得交通。否之象也。經云。治熱以寒。雖良工不敢廢其繩墨。而更其道也。然而病有遠近。治有輕重。參政今年高氣弱。上熱雖盛。豈敢用寒涼之劑。損其脾胃。經云。熱則砭之。又云。高巔之上。射而取之。余以三稜針約二十處。刺之。其血紫黑。如露珠之狀。少頃。頭目便覺清利。諸症悉減。遂處方云。眼黑頭旋。虛風內作。非天麻不能除。天麻苗謂之定風草。此草獨不爲風所搖。故以爲君。偏頭痛者。乃少陽也。非柴胡黃芩酒製不能治。黃連苦寒。酒炒以治上熱。又爲因用。故以爲臣。橘皮苦辛溫。炙甘草甘溫。補中益氣爲佐。生薑半夏辛溫。能治風痰。茯苓甘草利小便。導濕熱引而下行。故以爲使。服之數劑。邪氣平。生氣復而安矣。

天麻半夏湯。治風痰內作。胸膈不利。頭旋眼黑。兀兀欲吐。上熱下寒。不得安臥。

天麻

半夏各一錢

橘皮白去

柴胡七分

黃芩酒浸炒

甘草炙

白茯苓皮去

前胡名五

黃連三分

右吹咀。作一服。水二鍾。薑二片。煎至一鍾。溫服。食後忌酒麵生冷物。

〔垣〕羌活湯。治風熱壅盛。上攻頭目昏眩。

羌活

防風

黃芩 各一兩 酒洗

柴胡 七錢

黃連 酒煮 一兩

黃柏 酒炒 半兩

瓜蒌 酒洗 半兩

甘草 炙七分

白茯苓 五錢

澤瀉 六錢

右爲籠末。每服五錢。水煎。取清。食後或先臥通口。熱服之。日二服。右苦寒瀉風木。

外感風邪眩

〔靈〕筋骨血氣之精。而與脈并。爲目系。上屬於腦。後出於項中。故邪中於項。因逢其身之虛。其入深。則隨眼系。以入於腦。入於腦。則腦轉。腦轉。則引目系急。目系急。則目眩。以轉矣。大藏篇

〔本〕治一切頭旋。本因體虛。風邪乘於陽明經。上注頭面。遂入於腦。亦因痰水在於胸膈。上犯大寒。使陽氣不行。痰水結聚。上衝於頭目。令頭轉旋。鈴羊角散。

鈴羊角

扶神 各一兩

芎藭

防風

白芷

半夏 湯洗七次 各半兩

枳殼

附子 各一分

甘草 三錢

右爲籠末。每服四錢。水一鍾半。生薑五分。慢火煎至七分。去渣。不

拘時候溫服。

〔百一〕都梁丸。治風吹項背。頭目昏黑眩痛。

香白芷 大塊者用沸湯泡洗四五次焙乾

右爲末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一九。細嚼。用荊芥湯點茶下。

〔無〕大豆紫湯。治中風頭眩惡風。自吐冷水有汗。方見

〔聖〕治風頭旋。用蟬殼二兩。微炒爲末。非時下溫酒一鍾匕。針經胃

風篇云。上虛則眩。又五臟生成篇云。狗蒙招尤。目瞑耳聾。下實上虛。

蓋蒙昏冒也。招搖掉也。瞑黑眩也。皆謂昏冒搖掉。眼黑眩。屬下實上

虛也。

〔丹〕陳客婦人近五十。頭痛麻木眩運。脈甚虛。宜補氣益血。去風行

濕。

天麻 酒一錢

歸身尾 酒半錢

黃芪 三分

右作一劑。水煎服。

賈鼻因勞役。眼眩倦怠。頭不爽。肚帶溏滑。

黃芪 半錢

白朮 一錢酒浸

人參 半錢

川芎 半錢

半夏 五分

人參 半錢

陳皮 半錢

白朮 二錢

陳皮 半錢

生薑 片三

當歸 一錢

蔓荊子 五粒

黃芩 半錢

甘草 一分

生薑 片三

黃柏 炒三分

甘草 一分

水煎稍熱飲之。丑卯時各一次。去枕眠。少時已申時。又各一次。瘥。男子因作勞成病。發熱脚酸。口苦頭暈。

白朮

茯苓

黃連

川芎

兩半

白芍藥

人參

生地

陳皮

當歸

各一兩

甘草

錢一

杜仲

炒六兩

分十八帖。食前熱下。抑青丸二十二粒。

丈夫患熱。頭眩脈大而散。此是辛苦中來。

陳皮

錢三

柴胡

錢三

人參

錢二

白朮

錢二

黃芪

錢三

木通

錢一

甘草

些

分三帖服。

〔本〕治風眩頭暈。川芎散。

山茱萸

兩一

山藥

甘菊花

人參

川芎

茯神

各半兩

爲末。每服二錢。酒調下。不拘時候。日三服。不可誤用野菊花。

〔三因〕芎歸湯。治產後去血過多。眩暈不省。及傷胎去血多。崩中去

血多。金瘡去血多。拔牙齒去血多。不止。懸虛心煩。眩暈頭重。目暗舉

頭欲倒。

方見婦人大法條

〔丹〕頭眩屬氣虛挾痰。無痰作眩。不得治痰爲主。挾補氣藥。并降火

藥。濕痰多者。用二陳湯。痰多因火動者。二陳湯加酒芩。眩暈火動

補虛
降火
治痰

血虛
眩

其痰。二陳湯加黃芩、蒼朮、羌活、散風行濕。水煎金花丸治頭眩。力見痰飲
〔丹〕眩運不可當者。大黃三次酒炒乾爲末。茶調下。每服一錢至二錢。一男子年七十九歲。頭目昏眩而重。手足無力。吐痰口口相續。左手脈散大而緩。右手緩而脈大。不及於左。重按皆無力。飲食略減。而微渴。大便三四日一行。衆人皆與風藥。至春深必死。予曰。此皆大虛證。當以補藥作大劑服之。衆怒而去。余教用人參、黃芪、當歸身、芍藥、白朮、陳皮、濃煎作湯。使下連柏丸三十粒。如此者。服一年半。而精力如少壯時。連柏丸冬加乾薑少許。餘三時皆依本法。連柏皆薑汁炒爲細末。又以薑汁煮糊爲丸。

〔本〕治虛風頭旋吐痰涎不已。養正丹。

黑鉛

水銀

硫黃

硃砂各二兩

右用鐵盞一只。火上溶鉛成汁。次下水銀。用柳杖子打勻。取下放少時。下二味末。令冷。研爲粉。用米飲丸。或用棗肉丸。如梧子大。每服三十丸。鹽湯下。

此藥升降陰陽。補接真氣。非止頭旋而已。

〔垣〕范天麟之內素有脾胃之病。時顯煩躁。胸中不利。大便不通。初冬出外而晚歸。爲寒氣拂鬱。悶亂大作。火不得伸故也。醫疑有熱。治以疎風丸。大便行。而病不減。又疑藥力少。復加七八十九丸。下雨行。前

症仍不減。復添吐逆。食不能停。痰唾稠粘。湧出不止。眼黑頭旋。惡心煩悶。氣短促。上喘無力。不欲言。心神顛倒。兀兀不止。目不敢開。如在風雲中。頭苦痛如裂。身重如山。四肢厥冷。不得安臥。予謂前症。乃胃氣已損。復下兩次。則重損其胃。而痰厥頭痛作矣。製半夏白朮天麻湯治之而愈。

天麻

分五

半夏

湯洗一錢半

人參

分五

白朮

錢一

蒼朮

分五

橘皮

黃芪

分五

澤瀉

錢一

白茯苓

各五分

神麴

炒一錢

大麥蘖

一錢半

乾薑

分三

黃柏

分二

右件咬咀。每服半兩。水二盞。煎至一盞。去渣。帶熱服食前。此頭痛甚。謂之足太陰痰厥。頭疼。非半夏不能療。眼黑頭旋。風虛內作。非天麻不能除。其苗爲定風草。亦治內風之神藥也。內風者。虛風是也。黃芪甘溫。瀉火補元氣。人參甘溫。瀉火補中益氣。二朮俱甘苦溫。除濕補中益氣。澤瀉茯苓。利小便導濕。橘皮苦溫。益氣調中。升陽。神麴消食。蕩胃中滯氣。大麥蘖寬中助胃氣。乾薑辛熱。以絛中寒。黃柏苦大寒。酒洗以主冬。天少火在泉發躁也。

右氣虛挾痰眩暈。余嘗治一人。臥則稍輕。但舉足則頭旋眼黑。以天麻半夏茯苓陳皮白附僵蠶參芪草歸生薑黃芩煎湯服之。五

停者
兼行
水不
痰閉
之者
吐

大小
便微
利之

六日愈。蓋做此方加減之也。

〔濟〕芎朮湯。治胃中濕痰。眩暈嘔逆。頭重不食。

川芎

半夏酒洗

白朮各一兩

甘草炙半兩

一方有附子桂心無半夏

右咬咀。每服四錢。水一盞。生薑七片。煎服不拘時。

〔嚴〕旋覆花湯。治中脘伏痰。嘔逆眩暈。

半夏

橘紅

乾薑各一兩

檳榔

人參

甘草

白朮各半兩

右剉碎。每服一兩。薑水煎服。

〔仲〕卒嘔吐。心下痞。膈間有水。眩悸者。半夏加茯苓湯主之。方見嘔吐

令瘦人臍下有悸。吐涎沫而頭眩。此水也。五苓散主之。方見傷寒

〔子和〕青黛散。搐鼻取涎。治眩神效。方見頭痛

頭風眩暈。可用獨聖散吐之。吐訖。可用清上辛涼之藥。防風通聖散。

加半夏等味。仲景云。此痰結胸中而致也。通聖散見癰

獨聖散

瓜蒂不以多少

鬱金各等分

右爲細末。每服一錢。或二錢。薑汁調下服之。用鷄翎探吐。

〔河間〕搜風丸。治邪氣上逆。風熱上攻。頭目眩暈。大小便結滯。

人參

茯苓各半兩

滑石二兩

藿香二錢半

乾薑

白礬

生各一兩

蛤粉

二兩

南星

大黃

黃芩

各二兩

牽牛

四兩

薄荷

半兩

半夏

一兩

寒水石

一兩

右爲末。滴水丸。小豆大。每十丸。生薑湯下。加至二十丸。日三服。

〔仲〕白朮附子湯。治風虛。頭重眩苦。極不知食味。暖肌補中益精氣。

白朮

二兩

附子

一兩半

甘草

一兩

右三味。剉。每五錢。薑五片。棗一枚。水鍾半。煎至七分。去渣溫服。

〔本〕治體虛有風。外受虛濕。身如在空中。二生散。

生附子

去皮

生南星

各等分

右二味。咬咀。每服四大錢。水一鍾。生薑十片。慢火煎至八分。去渣

服。戊午年。予在新安。有此疾。名醫傳授此方。三服愈。

〔仲〕心下有支飲。其人苦冒眩。澤瀉白朮主之。

短氣倚息形如腫爲支飲

用澤瀉五

兩。白朮二兩。以水二升。煮一升。分溫再服。

運氣眩有二。

一曰。風助肝盛眩。經云。厥陰司天之政。風行太虛。雲物搖動。目轉耳

鳴。三之氣。風乃時舉。民病掉眩。又云。厥陰司天。客勝。則耳鳴掉眩。又

云。厥陰之勝。耳鳴頭眩。又云。厥陰之復。筋骨掉眩。治以諸涼是也。

二曰。濕邪傷腎眩。經云。太陰司天。濕淫所勝。頭項腰痛背痛而眩。治以

體虛有溫之者

倚息形腫者利運氣

苦熱是也

〔河〕神妙散。搐鼻。治頭目昏眩。偏正頭痛。方見頭痛門

腦爲髓之海。其輸上在於其蓋。下在風府。髓海不足。則腦轉耳鳴。脛

痠眩冒。目無所見。全文見針灸蓋者百會穴也。補百會風府一穴則眩愈。上氣不足。頭爲之苦傾。目爲

之眩。補足外踝下留之。全文見針灸邪在腎。肩背頭項痛時眩。取湧泉崑崙。

視有血者。盡取之。全文見針灸

怪穴 頭目眩運 至陰

〔標〕 金門 申脈

〔桑〕 風池 神庭 內風池通玄同 金門 滿 三里 補

〔心〕頭暈怕寒。些少風寒。則目暗。殭仆。不分冬夏。常用綿帽包。日夜

不離。一去帽卽發。百會 惺惺 一分恐上星 風池 二寸半主頭大熱 豐隆 二寸半

〔桑〕頭熱 上顙 風門 攢竹 百會

〔甲〕風眩善嘔。煩滿神庭主之。如顏色青者。上星主之。取上星者。先

取譙譙。後取天牖。風池。如頭痛顏青者。顙會主之。風眩引領痛。上

星主之。先取譙譙。後取天牖。風池。風眩目暝。惡風寒。面赤腫前頂

主之。風眩目眩。顙上痛。後項主之。風眩驚。手腕痛。泄風。汗出至

腰。陽谷主之。腦風目暝。頭痛。風眩目痛。腦空主之。風逆暴。四肢

腫。濕則唏然寒。飢則煩心。飽則眩。大都主之。頭眩目痛。至陰主之。

〔丹〕左手脈數熱多。脈澁有死血。右手脈實痰積。脈大必有久病。

癲癇

癲癇卽頭眩也。痰在膈間。則眩微不仆。痰盜膈上。則眩甚仆倒於地。而不知人。名之曰癲癇。徐嗣伯云。大人曰癲。小兒曰癇。其實一疾也。然與中風中寒中暑尸厥等。仆倒不同。凡癲癇仆時。口中作聲。將省時。吐涎沫。省後又復發。時作時止。而不休息。中風中寒中暑尸厥之類。則仆時無聲。省時無涎沫者。後不復再發。間有發者。亦如癲癇之常法也。

大法

〔丹〕癲屬驚。與痰宜吐。大率行痰爲主。黃芩 黃連 瓜蒌 半夏 南星 尋火尋痰。分多少治之。無有不愈。分痰與熱。有熱以涼藥清其心。有痰必用吐藥。吐後用東垣安神丸。此證必用吐。吐後用平肝之藥。青黛柴胡川芎之類。

〔海〕治長洪伏三脈。風癲驚癲發狂惡人與火者。灸第三椎第九椎。服局方妙香丸。以針穿一眼子透冷水內浸少時服之。如本方若治弦細緩三脈。諸癲似狂者。李河南五生丸。妙香丸方見虛煩條氣亂于頭。則爲厥逆。頭重眩仆。全文見針灸厥成爲癲疾。厥氣上逆也邪搏陽。則爲癲疾。見診法下同針經九針云邪入

上實

於陽轉
爲癲疾

〔素〕帝曰。人生而有病癲疾者。病名曰何。安所得之。岐伯曰。病名爲胎病。此得之在母腹中時。其母有所大驚。氣上而不下。精氣并居。故令子發爲癲疾。奇病論

凡癲癇。及中風。中寒。中暑。中濕。氣厥。尸厥。而昏眩倒仆。不省人事者。皆由邪氣逆上陽分。而亂於頭中也。癲癇者。痰邪逆上也。中風寒暑濕。及氣厥尸厥者。亦風寒暑濕等。邪氣逆上也。邪氣逆上。則頭中氣亂。頭中氣亂。則脈道閉塞。孔竅不通。故耳不聞聲。目不識人。而昏眩無知。仆倒於地也。以其病在頭顱。故曰癲疾。治之者。或吐痰。而就高越之。或鎮墜痰。而從高抑之。或內消痰邪。使氣不逆。或隨風寒暑濕之法。用輕劑發散上焦。或針灸頭中脈絡。而導其氣。皆可使頭顱脈道流通。孔竅開發。而不致昏眩也。是知癲癇之癲。與厥成癲疾眩冒癲疾之癲。一疾也。王太僕誤分癲爲二疾。獨孫真人始能一之。今特冠此氣亂頭顱等經文。於癲癇篇首。使人知疾有所歸。而治有所據也。

〔局〕碧霞丹。治五癲疾。方見虛實門

〔世〕治暗風。天麻。南星。半夏。僵蠶。白附子。防風。各半兩。白礬二兩。用木瓜一個。切去頂取穰。納前藥末。用原頂覆住。麵包煨熟。就搗如泥爲丸。又用皂角二寸。敲細。酒半盞。浸一宿。如發時。取前藥一十九粒。

納口中。用酒灌下。取出痰即愈。自省後。日服三十粒薑湯下。

治風癰及心風病。用皂角三挺搥破濾汁。熬如稀糊。攤紙上晒乾。取雨葉如小錢大。用溫漿水浸。洗去紙。注於兩鼻孔。各一蜎殼許。須臾涎下。咬筋屢盡。涎後服祛痰丸。

代赭石生一兩

白礬生二兩

右爲細末。稀糊爲丸。如梧子大。每服三十丸。冷水送下。不拘時。

〔仲〕風引湯。治癰疾瘕瘕。方見後

〔無〕礬丹丸。治五癰百癰。無問陰陽冷熱。

號丹

晉礬各一兩

右用磚鑿一窠。可容二兩許。先安丹在下。次安礬在上。以炭五斤。熾令炭盡。取出細研。以不經水猪心血爲丸。如菉荳大。每服十丸。至二十九。橘皮湯下。

〔世〕治暗風。遠年日久不愈。皆可服。用地黃。廣南道地者。不計多少。火煨醋燂七次。爲細末。每服二錢。溫酒調下。年深者亦治。

〔羅〕參珠丸。治風癰。大有神效。

人參

蛤粉

珠砂各等分

右爲細末。獾猪心血爲丸。如梧子大。每服三十丸。金銀花湯下。食遠服。

心少血益之

上皆抑之行之

右爲末。薑汁煮麵糊丸。如梧子大。每服三十丸。薑湯下。

〔丹〕治癰疾。

川芎二兩

防風

猪牙皂角

鬱金

明礬各一兩

蜈蚣一條

右細末。蒸餅丸。如梧子大。空心清茶下十五丸。一日除根。

〔羅〕治癰病。心風病。用天南星。九蒸九曝。爲末。生薑汁打糊爲丸。如梧子大。每服二十丸。煎人參麥門冬菖蒲湯下。亦可。

〔素〕春脈者肝也。春脈太過爲病。在外善怒。忽忽眩冒而癰疾。全文見治法服

〔丹〕治巡檢夫人癰。通聖散。二錢半。薑三片煎。下犀角丸三十粒。

〔保〕防風通聖散。

來弦實而強爲太過。歲木太過。甚則忽忽善怒眩冒而癰疾。全文見運氣類註

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

芒硝

連翹

薄荷

麻黃不去節各五錢

桔梗

黃芩

石膏各二兩

白朮

山梔

荊芥穗各二錢半

滑石三兩

甘草一兩

右爲籠末。每服一兩。生薑煎。溫服。日再服。

若勞汗當風。寒薄爲皴。鬱乃痙。此勞汗出於玄府。脂液所凝。去芒