

典 秘 證 臨

張 黻 卿 編 譯

商 務 印 書 館 發 行

臨證祕典目次



流產(小產).....	一	失語症、廢讀症、失書症、	四〇
膿瘍(膿腫).....	五	卒中(腦出血).....	四一
耳垢堆積(耵聍栓塞).....	七	動脈硬化症.....	四七
胃液缺乏症.....	八	尿酸性關節炎(痛風)....	四七
酒齋鼻.....	八	蛔蟲.....	四九
尋常性痤瘡.....	九	腹水.....	五一
放線狀菌病.....	一五	眼精疲勞症.....	五三
橫痃(魚口便毒).....	一六	支氣管喘息.....	五三
指端知覺異常症.....	一九	指振顫.....	五六
先天性白病.....	一九	龜頭淋.....	五七
酒精中毒.....	二〇	胃弛緩症.....	五七
鬼舐頭(圓形禿髮).....	二〇	膀胱痲痹.....	五八
弱視及黑內障.....	二三	初生兒膿漏性結膜炎....	五九
無月經.....	二三	淋病.....	六〇
急性貧血.....	二四	眼瞼緣炎.....	六六
腦貧血.....	二五	吐瀉病.....	六八
慢性貧血.....	二六	支氣管擴張症.....	六九
進行性惡性貧血.....	二六	急性支氣管炎.....	六九
十二指腸蟲病.....	二七	慢性支氣管炎.....	七五
動脈瘤.....	二九	纖維素性支氣管炎.....	七六
白喉.....	三〇	癰疽.....	七七
扁桃體炎.....	三五	乳癌.....	七七
血管腫.....	三八	子宮癌腫.....	七九
鵝口瘡(雪口).....	三九	胃癌.....	八〇

胃痛.....	八四	結膜加答兒.....	一三四
神經性心悸亢進.....	八六	格魯布性結膜炎.....	一三八
骨瘍.....	八六	白喉性結膜炎.....	一三八
白內障.....	八六	濾胞性結膜炎.....	一三九
急性腸加答兒.....	八七	顆粒性結膜炎(一名沙眼).....	一四〇
慢性腸加答兒.....	九二	水泡性結膜炎.....	一四一
咽加答兒.....	九三	攣縮及關節強直.....	一四四
急性胃黏膜炎.....	九七	打撲傷.....	一四四
慢性胃黏膜炎.....	九九	股關節炎.....	一四四
膀胱加答兒.....	一〇三	纖維素性肺炎.....	一四五
霰粒腫.....	一〇七	毛樣體炎.....	一五〇
萎黃病.....	一〇七	淚囊炎.....	一五一
膽石症.....	一一〇	尋瘡.....	一五一
霍亂.....	一一二	頭髮脫落.....	一五三
小兒吐瀉.....	一一六	酒客譫妄症.....	一五四
疼痛性陰莖勃起.....	一一九	生齒困難.....	一五六
小舞蹈病.....	一二〇	單純性尿崩.....	一五六
面皰.....	一二二	糖尿病.....	一五七
肝硬化症.....	一二二	胃擴張.....	一六〇
風氣疝痛.....	一二三	赤痢.....	一六一
月經性疝痛.....	一二五	月經困難.....	一六四
鉛毒疝痛.....	一二五	鹽酸過多症.....	一六六
火傷.....	一二六	小兒急性消化不良.....	一六七
腦震盪.....	一二九	小兒慢性消化不良.....	一六九
尖圭濕疣.....	一二九	神經性消化不良.....	一六九
扁平濕疣.....	一三〇	呼吸困難.....	一七〇
凍傷.....	一三〇	小兒急癰.....	一七一
膿漏性結膜炎(淋病性結膜炎 又風眼).....	一三二	妊婦產婦及褥婦急癰.....	一七三
		濕疹.....	一七四

頑癬.....	一八一	血友病.....	二二一
腦動脈血塞及血栓.....	一八三	咯血.....	二二一
肺氣腫.....	一八四	痔核.....	二二四
急性心臟內膜炎.....	一八六	夜盲症.....	二二八
子宮內膜炎.....	一八八	偏頭痛.....	二二八
遺尿症.....	一九〇	脫腸(偏墜).....	二三一
夏日斑.....	一九一	水疱症.....	二三二
副睪丸炎.....	一九三	截髮疱症(寄生性匍行疹).....	二三三
癩癧.....	一九五	眼瞼麥粒腫.....	二三六
衄血.....	一九七	角膜翳.....	二三七
齒齦息肉.....	一九八	陰囊水腫.....	二三八
丹毒.....	一九九	水頭症.....	二三八
紅斑.....	二〇一	腦充血.....	二三九
顏面神經麻痺.....	二〇二	結膜充血.....	二四〇
黃癬.....	二〇三	妊婦嘔吐.....	二四一
肛門皸裂.....	二〇五	多汗症.....	二四三
痔瘻.....	二〇七	臟躁症.....	二四五
白帶下、陰道膿漏、陰道黏膜 炎.....	二〇八	魚鱗癬.....	二四八
癰.....	二一一	加答兒性黃疸.....	二四九
泌乳過多.....	二一二	吐糞症.....	二五一
肺壞疽.....	二一二	傳染性膿疱疹.....	二五二
胃下垂症.....	二一三	陰痿.....	二五三
齒齦炎.....	二一四	流行性感冒.....	二五四
綠內障.....	二一五	肋間神經痛.....	二五五
舌炎.....	二一六	瘧疾一名間歇熱.....	二五七
膝關節炎.....	二一七	間擦濕疹.....	二五八
吐血.....	二一八	虹彩炎.....	二六〇
血尿.....	二二〇	坐骨神經痛.....	二六一

脚氣.....	二六四	齒痛.....	二九八
角膜炎.....	二六六	聲門水腫.....	三〇一
疝痛.....	二六七	急性肺水腫.....	三〇二
急性喉炎.....	二六八	臍炎.....	三〇三
慢性喉炎.....	二七一	卵巢炎.....	三〇三
義膜性喉炎.....	二七三	睪丸炎.....	三〇五
肝二口蟲.....	二七六	骨髓炎.....	三〇五
肝膿瘍.....	二七六	急性中耳炎.....	三〇六
肝梅毒.....	二七六	慢性中耳炎.....	三〇七
癩病.....	二七六	外聽道炎.....	三〇七
白血病.....	二七七	卵巢囊腫.....	三〇七
口舌白斑病.....	二七八	蟻蟲.....	三〇八
苔癬.....	二七九	惡臭鼻漏.....	三〇九
肺二口蟲.....	二八〇	癰疽.....	三一—
狼瘡.....	二八〇	努肉攀睛 (血管發生性角膜炎)	三一—
淋巴管炎.....	二八一	全眼珠炎.....	三一—
狂犬病.....	二八二	痲痺.....	三一—
馬鼻疽.....	二八三	振顫痲痺.....	三一—
躁鬱狂.....	二八三	進行性痲痺狂.....	三一—
乳腺炎.....	二八四	腦性痲攣性小兒痲痺.....	三一—
乳房痛.....	二八五	偏執狂.....	三一—
憂鬱症.....	二八五	嵌頓包莖.....	三一—
腦膜炎.....	二八六	副傷寒.....	三一—
三叉神經痛 (顏面痛).....	二八九	腮腺炎.....	三一—
神經衰弱症.....	二九一	夜驚症.....	三一—
水痘.....	二九三	天庖瘡.....	三一—
肥胖病.....	二九四	心囊炎.....	三一—
便秘.....	二九四	子宮外膜炎.....	三一—
動眼神經痲痺.....	二九八		

發作性血色素尿症.....	三二二	風疹.....	三五四
骨膜炎.....	三二二	疥癬.....	三五四
腹膜炎.....	三二三	紅痧(猩紅熱).....	三五六
凍瘡.....	三二六	日本住血吸蟲.....	三五六
鼠疫.....	三二七	鞏膜炎.....	三五七
包莖.....	三二九	壞血病.....	三五八
蜂窩織炎.....	三二九	腺病.....	三五九
癩風.....	三三〇	皮脂漏.....	三六〇
肋膜炎.....	三三〇	暈船.....	三六一
黏膜炎性肺炎.....	三三三	敗血病.....	三六二
急性前脊髓灰白質炎... ..	三三四	呃逆.....	三六二
氣胸.....	三三六	硬性下疳.....	三六三
遺精.....	三三六	日射病.....	三六四
直腸黏膜炎.....	三三七	鵝口瘡(雪口).....	三六四
肛門及直腸脫.....	三三八	聲門痙攣.....	三六五
痒疹.....	三三八	精液漏.....	三六五
陰門瘙痒症.....	三三九	心臟痙攣(絞心症).....	三六六
鱗屑癬(乾癬).....	三四〇	食管狹窄.....	三六七
產褥熱.....	三四二	潰瘍性口內炎.....	三六八
惡性膿疱.....	三四三	甲狀腺腫.....	三七〇
膿毒症.....	三四四	汗疹.....	三七一
腎盂炎.....	三四五	鬚瘡.....	三七一
佝僂病.....	三四六	遺傳性梅毒.....	三七二
蝦蟆腫.....	三四七	後天梅毒.....	三七三
視網膜炎.....	三四八	脊髓癆.....	三七九
關節風寒濕痺.....	三四九	絲蟲.....	三八〇
肌肉風寒濕痺.....	三五〇	破傷風.....	三八一
急性鼻炎.....	三五一	旋毛蟲.....	三八二
慢性鼻炎.....	三五二	肺結核及喉結核.....	三八三

腦腫瘍.....	三八八	角膜潰瘍.....	四〇二
百日咳(疫咳).....	三八八	胃潰瘍.....	四〇四
胼胝(鷄眼).....	三九一	尿毒症.....	四〇六
蚓突炎.....	三九一	蕁麻疹.....	四〇七
腸傷寒.....	三九三	水痘.....	四〇八
發疹傷寒(斑熱、發疹熱).....	三九六	痘瘡.....	四〇九
回歸傷寒(再歸熱).....	三九七	心臟瓣膜病.....	四一〇
潰瘍.....	三九八	創傷.....	四一五
喉潰瘍.....	三九九	陰門炎.....	四一七
結核性腸潰瘍.....	四〇〇	腓腸肌痙攣.....	四一八
軟性下疳.....	四〇一	乾燥眼(疳眼).....	四一八

附錄目次

第一章 急性中毒症狀及療法.....	一	醇精麻醉.....	五
酒精中毒.....	二	克遼瑣忒中毒.....	五
克羅羅封中毒.....	二	石油或揮發性油中毒.....	六
嗎啡中毒阿片中毒.....	二	阿尼林中毒.....	六
番木鱉鹼中毒.....	三	石炭酸中毒.....	六
煙草中毒.....	三	萘酸及其鹽類之中毒.....	六
阿忒羅品中毒.....	四	斑蝥中毒.....	六
毛地黃葉中毒.....	四	腐肉中毒.....	七
麥角中毒.....	四	河豚中毒.....	七
散安紐中毒.....	四	菌類中毒.....	七
抱水克羅拉耳中毒.....	五	苛性鉀中毒.....	八
規甯中毒.....	五	碓精中毒.....	八

臨證祕典

流產（小產）(Abortus)

原因流產，即妊娠二十八星期以前分娩者，易而言之，即胎兒尚未能在于宮外營生活而分娩者也。其原因有種種：（一）胎兒死亡，如梅毒痘瘡等之傳染，窒息，高熱，血壓低降等病，並胎兒畸形臍帶異常，胎盤疾病，子宮內膜炎，胞狀胎等。（二）當初胎兒雖無害，後因妊婦或卵之疾病，使子宮收縮，如高熱急性貧血，子宮後曲，子宮卵巢腫瘍，及妨礙子宮增大之癥痕愈着等。生殖器異常，雙胎，胎盤變位，子宮內膜炎，羊水過多症等。（三）外傷及精神感動，如顛墜，及驚愕。（四）藥品，如麥角、蘆薈、薩比那油（*Oleum Sabinæ*）等。若原因久存不去，則反覆流產，此曰常習性流產。

症狀妊娠三四月內之流產，以出血為主徵。數星期內流產者，稍疼痛，而兼出血，與多量之通經無異，卵由血塊中排出。第二月之終第三月之始流產者，除多量出血外，兼有陣痛樣疼痛，卵與卵膜完全排出者，曰全流產；卵膜破裂，而留於子宮內者，曰不全流產。有卵產出後，而出血久不止者。

豫後母體良，胎兒不良。

療法清潔妊婦之身體，食易消化之物，安靜其精神，避劇烈運動，（乘車、乘馬、跳舞、提舉重物等），慎房事，嚴守妊娠攝生法。有梅毒，則用驅梅法。熱性病者，用解熱法。流產一次者，治其子宮內膜炎，子宮後屈等之流產原因。常習流產者之原因不明者，當檢查夫婦有否瓦瑟曼耳（*Wassermann*）氏反應，有則用驅梅療法，即注射汞劑，及六百零六（*Salvarsan*）。

處方

1. 阿魏 *Asafoetida*.....3.0
 亞拉伯樹膠 *Gummi arabicum*..... 適宜
 上爲五十丸,最初每二日數丸,漸次隔多日與數丸,
 後每十日與一次,至分娩止。
2. 梅葉莢蒾流動膏 *Extr. Viburni prunifolli fluid.*...50.0
 橙皮糖漿 *Sirupus Aurantii Corticis*.....50.0
 上調和一日三至四次,每同一茶匙(每月經期由四日
 前,服用十二日間)。
3. 水楊酸汞 *Hydrargyrum salicylicum*.....1.4
 流動石蠟 *Paraffinum liquidum*.....10.0
 上每星期,注射一至二筒。
4. 昇汞 *Hydrargyrum bichloratum*0.4
 阿片醇 *Tinctura Opii*.....0.7
 甘草膏 *Extractum Liquiritiae*適宜
 甘草末 *Pulv. Liquir.*.....適宜
 上爲三十丸,每夕一丸,服二至三個月。

若既呈流產之兆而卵尙健全時,務須設法止其排出,即安靜其精神及身體,而用阿片劑。卵之健否,不能確知者,宜作爲健全處置之。

- 5 阿片醇 *Tinctura Opii*.....15至20滴
 溜水 *Aqua destillata*30.0
 上一回服用。
6. 阿片膏 *Extractum Opii*.....0.3
 乳糖 *Saccharum lactis*.....4.0

上爲十五包，每一點鐘一包。

7. 阿片末 Pulv. Opii0.3

白糖 Saccharum alba3.0

上爲十包，每二至四點鐘一包。

8. 阿片 Opium.....0.5

可可脂 Oleum Cacao適宜

上爲坐藥五個，每二點一個。

若不能防止流產，而出血劇甚時，必先限制其出血，且令其卵全然排出，即用陰道栓塞法。本法不但能止血，且能使陣痛增劇，以催迫卵之排泄，用本法時，先以一%利瑣耳 (Lysol) 水。或三%石炭酸溶液，洗滌陰腔，次送入一條長殺菌紗布，至多放置十二點鐘，其後再換以新者，其他內服麥角。

9. 愛耳戈汀 Ergotin0.05

麥角末 Pulv. Secal. cornuti0.5

上爲十丸，每日二至四丸。

10. 麥角膏 Extractum Secalis cornuti.....2.0

甘草末 Pulv. Liquir.....適宜

上爲二十丸，一日二至四丸。

11. 麥角膏 Extractum Secalis cornuti1.0

橙皮糖漿 Sirupus Aurantii Corticis30.0

溜水 Aqua destillata100.0

上每二時一食匙。

12. 麥角膏 Extractum Secalis cornuti2.0

李蘭地酒 Vinum cognac.....20.0

純糖漿 Sirupus simplex.....10.0

溜水 Aqua destillata120.0

上每一至二點鐘一食匙。

13. 麥角末 Pulv. Secal. cornuti5.0

吐根末 Pulv. Rad. Ipecac.0.5

上研和爲十二包，每一時至二時一包。

14. 麥角膏 Extract. Secal. cornuti1.0

水楊酸 Acidum salicylicum0.08

溜水 Aq. dest40.0

上濾過，皮下注射一筒。

15. 亨旻耳氏麥角膏 Extractum Secalis cornuti (Denzel)

.....2.5

硼砂 Borax.....0.25

溜水 Aq. dest7.25

上濾過，皮下注射十分之一筒。

16. 愛耳戈汀 Ergotini5.0

水楊酸 Acidum salicylicum0.1

甘油 Glycerinum10.0

溜水 Aqua destillata.....35.0

上一茶匙混於二食匙之溫湯中，一日一回，便通後灌

注於直腸內。

17. 愛耳戈汀 Ergotin3.0

可可脂 Oleum Cacao.....9.0

上爲坐藥六個，一日三回，各一個。

18. 斯台潑替頃 Stypticin 1.0

桂皮水 Aqua cinnamomi20.0

上每日四至五回，各以二十滴，滴於砂糖水中用之。

19. 斯台潑替頃 Stypticin0.025-0.05

上爲一包，一日三回，各一包。

20. 斯台潑替頃 Stypticin1.0

溜水 Aqua destillata10.0

上一筒，臀部注射。

若反覆用栓塞子法，子宮口雖充分開大，而卵之娩出，尙遲滯時，外方由腹壁，內方由前陰道穹窿部，行雙合壓出法。若子宮內容分解，而放惡臭，或體溫昇騰時，速將內容充分除去，其法與除去殘留卵膜無異。胎兒附屬物殘留於子宮內者，若子宮口開大，以指剝除之，卽令患婦橫臥，用一%之石炭酸溶液，或一%之利瑣耳(Lysol)溶液，或三%之硼酸溶液，先滌陰道及子宮，嚴重消毒，以左手由腹壁向下壓其子宮，將右手之示指中指，送入陰道內，至中指達於子宮底，將胎兒之附屬物剝離之。若妊娠三個月之流產，胎盤之一部份殘留時，卽用銳鉗(Scharfe Kurette)搔除其遺殘於子宮之卵膜。

膿瘍(膿腫)(Abscessus.)

原因 釀膿菌、結核、扁桃體炎、甲狀腺腫、乳腺炎、腎石、腎炎、膀胱炎、尿道炎、子宮周圍炎、梅毒、脊椎炎、衰弱、膿毒症、惡液質等。

症狀 (一)熱性(急性)膿瘍爲波動性之軟隆腫，潮紅、熱灼、疼痛，亦有體溫昇騰者。(二)寒性(慢性)膿瘍，灼熱疼痛皆缺如，僅呈波動性之軟隆腫然以上爲膿瘍之通有性，因其發生部位，而起種種障礙，例如皮下膿瘍，不過略有症狀，而腦或肺膿瘍，常發危險症狀。又因其發生之組織，有種種區別，如蜂窩織膿瘍，

肌膿瘍、骨膜膿瘍等。又因其發生之部位，有種種名稱，如頭皮膿瘍、腦膿瘍、扁桃體膿瘍、腋窩膿瘍、肺膿瘍、腎周圍膿瘍、膀胱周圍膿瘍、前列腺膿瘍、尿道周圍膿瘍、肛門周圍膿瘍、肝膿瘍、子宮周圍膿瘍、肌膿瘍、流注性膿瘍等是也。流注膿瘍、因脊椎之結核或梅毒而生。

豫後因原因不同，故豫後亦不定。

療法若熱性膿瘍，則切開排膿，以制腐法洗滌，或送入膠皮管，或充填沃度封紗布。若寒性膿瘍，用穿刺法，或穿刺吸吮法，排膿後，注入適量之乳劑，施以壓定防腐綑帶，或用 Bier 氏鬱血療法。

處方

1. 沃度封 Jodoformum10.0
- 甘油 Glycerinum100.0

上調和爲注入劑。

2. 沃度封 Jodoformum10.0
- 甘油 Glycerinum80.0
- 橄欖油 Oleum Olivarum40.0

上爲乳劑，注入劑。

3. 夸乍科耳 Guajacolum.... 20滴
- 沃度封 Jodoformum5.0
- 甘油 Glycerinum100.0

上爲注入劑。

4. 沃度封 Jodoformum10.0
- 橄欖油 Oleum Olivarum90.0

上爲乳劑注入。

5. 沃度封末 Pulv. Jodoformum.....	10.0
甘油 Glycerinum.....	80.0
忒拉加坎他 Tragacantha.....	0.5
溜水 Aqua destillata.....	20.0

上爲乳劑注入

耳垢堆積 (聾聾栓塞) (Accumulatio cerminis.)

原因慢性外聽道炎,聾聾分泌過多.

症狀若聾聾將外聽道全閉塞時,則起重聽、耳鳴、疼痛、充塞感、眩暈等症.時有發嘔吐、卒倒、咳嗽、心臟絞窄症者.

療法用微溫湯甘油點耳,或用下方.

處方

1. 炭酸鈉 Natrium carbonicum	1.0
溜水 Aqua destillata.....	100.0

上微溫,一日三回點耳,放置十分鐘.

2. 碘化鉀(鉍碘) Kalium jodatum	2.0
甘油 Glycerinum	15.0
溜水 Aqua destillata.....	15.0

上點耳.

3. 硼酸 Acidum boricum.....	0.3
橄欖油 Oleum Olivarum	15.0

上點耳.

4. 重炭酸鈉 Natrium bicarbonicum.....	0.5
甘油 Glycerinum	3.0
溜水 Aqua destillata.....	15.0

上點耳。

以上無論何藥，將耳垢軟化後，用洗耳唧筒，以微溫之二%硼酸水，或一%石炭酸水，或二千倍昇汞水，以適度之強力，注射於外聽道以洗之。若耳垢固着，不易剝離時，則以此法，反覆洗之，叮嚀栓塞除去後，以綿花小球插入於外聽道，放置一日，即可。

胃液缺乏症 (Achyilia gastrica)

原因神經質者多生此病，然健康者亦有之。

症狀鹽酸之分泌減少，或缺乏，但非因胃腺之縮萎而來，無著明之消化障礙。

療法在胃部用灌溉法，或電氣療法，或冷水摩擦法，消化時，內服稀鹽酸，如下：

處方

1. 稀鹽酸 Acidum hydrochloricum dilutum.....2.0
- 陪潑辛 Pepsini4.0
- 純糖漿 Sirupus simplex.....20.0
- 溜水 Aqua destillata180.0

上一日三回，二日分服。

酒齧鼻 (Acne rosacea)

原因飲酒過度、慢性胃腸黏膜炎、寒冷、血行障礙、婦人生殖器病。

症狀顏面、尤於鼻部之脈管擴張，呈瀰蔓性紅斑，病重者，起毛細管擴張症，或生痤瘡、皮脂腺炎性之滲潤，及組織肥厚、鼻瘤。自覺症，患部有溫熱感，若發膿胞，則覺疼痛，經過緩慢。

療法先去原因，其局部療法，輕症者與痤瘡同，或用左開軟膏，水銀石英燈亦有效。

處方

1. 沈降硫黃 Sulfur præcipitatum10.0
- 甘油 Glycerinum5.0
- 酒精 Spiritus5.0
- 醋酸 Acidum aceticum5.0

上塗布。

2. 沈降硫黃 Sulfur præcipitatum.....10.0
- 炭酸鉀 Kalium carbonicum10.0
- 甘油 Glycerinum10.0
- 橙花水 Aqua Florum Aurantii.....10.0
- 酒精 Spiritus.....10.0

上每夕塗布。

重症者、亂刺其擴張之血管、或以小烙白金灼燒、或貼水銀古他怕卡(Guttapercha)硬膏、內服鐵劑。雅大松(Jadassohn)氏法、每夕以石鹼與熱水洗面、次用十分鐘至十五分之熱電法、再次用下方、至翌朝以熱湯洗淨後、再以酒精洗之。

處方

1. 伊希焦耳 (魚石油) Ichthyoli1.0-5.0
- 利璣耳金 Resorcinum1.0-3.0
- 橄欖油 Oleum Olivarum10.0
- 亞拉伯樹膠 Gummi arabiae25.0
- 溜水 Aqua destillata50.0

上混和塗布,若兼有痤瘡者,同時亦治其痤瘡。

尋常性痤瘡 (Acne vulgaris)

原因當春機發動期、皮脂分泌過多、排泄管內皮脂滯留或閉塞、
 皮脂變性、萎黃病、婦人生殖器諸病、消化不良、梅毒性惡液