

世醫通變要法

二



加減冬參湯 治傷寒已經汗下表裏俱虛津液枯

竭心煩發熱氣逆欲吐諸虛煩熱

麥門冬

去心四兩

甘草

各二兩

半夏

泡

石膏

各一兩

淡竹葉

五錢

赤茯苓

一兩

右咀每服五錢加粳米一撮薑三片水煎服小便

自利去茯苓熱甚加前胡知母嘔加陳皮

一法經驗 治傷寒發汗吐下後虛煩不得眠反覆

顛倒心下懊膿者用梔子五箇豆豉五錢水煎豆

鼓後去渣溫服即愈



加減苓連解毒湯 治傷寒雜證燥熱毒煩悶乾嘔
呻吟喘滿陽厥極深畜熱內甚俗妄傳於陰毒者
及汗下吐後寒涼諸藥不能退熱者

黃芩

黃連 各二兩

黃柏

梔子 各一兩

半夏 五錢

右咀每服五錢水煎如腹滿嘔吐或欲作利者如
無痰去半夏有痰加半夏厚朴白茯苓生薑

少陽十二

主方經驗二活湯 治少陽傷寒頭疼惡熱惡寒脉
弦而數及風痰咳嗽三陽之證並治之



羌活

獨活

各一兩半

人參

桔梗

柴胡

前胡

各二兩

枳殼

川芎

赤茯苓

各一兩

黃芩

七錢

右咀每服五錢薑三片水煎服如舌不乾去黃芩

加薄荷少許

加味柴黃湯 治傷寒十餘日不解邪熱結在裏身

熱煩燥語言譫妄耳聾脇痛大便不通繞臍刺痛

重則用太極門實黃湯下之

枳實

半兩

大黃

半兩

柴胡

二兩

赤芍藥

一兩半

半夏

泡

黃芩

一兩

竹瀝

一合

右咀每服五錢薑三片水煎此藥治傷寒內實裏

熱若表證未解身軀痛者不可服之

加減知母湯

治傷寒大汗後表證已解或吐後邪

未除脉滑熱結在裏心腦煩渴甚劇欲飲水并三

陽之證並治之

知母

四兩

石膏

五兩

甘草

炙二兩

人參

一兩半

右咀每服五錢入粳米七十粒水煎如無班去人



參瘟疫秋感熱者加蒼朮

加減柴苓湯

方見陽明門

治少陽發熱如瘧耳聾脇

痛口苦

太陰十三

主方經驗

治太陰傷寒腹滿噎乾其證與太陽相

似誤下之故有腹痛脉細是也

桂枝

五錢

白芍藥

五錢

甘草

四錢

右咀每服五錢薑五片水煎服

又方經驗

治陰證之下早者如心下緊痛滿而按

之如右

半夏一兩

黃連五錢

枯菱子四錢

右咀每服五錢薑三片水煎溫服以微吐黃涎者

為愈也

加減苓朮散

方見暑門

治陰證傷寒去硃砂如陽證

熱甚去桂加黃芩柴胡加減服之

一法治傷寒下痢膿血用乾薑三錢赤石脂七錢粳

米一撮水煎服

少陰十四

主方經驗 治少陰傷寒脉沉口燥舌乾

乾姜泡二兩

甘草炙一兩

人參



白朮

各一兩半

枳實

赤茯苓

各二兩半

右各為末煉蜜為丸如彈子太熱湯化下如渴加

瓜蒌根下痢加牡蠣粉

加減川歸散

方見寒門

治傷寒陰證皆可服此方宜

加減用之

厥陰十五

主方經驗 治厥陰傷寒自利脉沉欲絕者

甘草

炙

乾姜

各二兩

附子

一兩去皮

白茯苓

一兩

右咀每服五錢水煎溫服或去茯苓亦可血少脉

沉者加人參如腹痛者加芍藥肉桂嘔者加生薑
咽痛者加桔梗下後厥逆除附子加當歸桂枝為
藥細辛吳茱萸

加減實黃湯 治傷寒潮熱如有所見大便六七日

一不通者是有燥糞結滯脉浮而細及陰陽二證皆
可服

枳實

二兩

大黃

二兩半

厚朴

一兩

右咀每服五錢水煎服以利為度如或腹滿實痛
及大渴脉實而數而傷胃燥甚番飲不散其痛甚
而不可忍者且面赤不識人者宜加用芒硝下之

以利為度如若燥糞結滯甚而未通者再服

一法經驗 治狐感多眠聲嘔及唇口生瘡可用此

藥主之尤妙

桃仁

槐子

艾

各一兩

棗子

十五箇

右咀每服五錢水煎溫服

加減夏實湯 治傷寒一切病後虛煩不得眠卧無

心膽虛怯

半夏

枳實各二兩

陳皮

一兩半

赤茯苓

一兩

甘草

五錢



右咀每服五錢薑五片棗一枚水煎如有餘熱
退者加前胡竹茹無熱者守本分或加香附米人
參竹茹柴胡麥門冬桔梗治心虛夢寢不詳異動
或遂致氣鬱生涎涎與氣搏短氣驚乏或復自汗
四肢浮腫飲食無味

一法治百合病不令吐下發汗病形如初者用百合
七箇生地黃二升水洗百合漬一宿爲末以水二
升煮取一升去渣內地黃汁煮取一升服中病勿
服便如漆瘟疫

夫瘟疫者衆人病一般乃天行時疫也治有三法宜



補宜散宜降然瘟疫者有三因治法當推歲運惟冬
病之病非其時而有其氣者冬氣當閉藏而反泄於
外非其時矣其脉左寸浮大於右寸浮緩而按之無
力宜補帶表可也

主方經驗 治瘟疫通用

大黃

黃連

黃芩

各二兩

人參

桔梗

防風

蒼朮

各一兩半

滑石

香附米

人中黃

各一兩

右爲末神麯糊爲圓如梧桐子大每服七十九氣

虛四君子湯血虛四物湯痰二陳湯各送下執甚

加童便

加減芎藭湯

方見傷寒門

治瘟疫衆人病一般春夏

可用

大頭腫十六

夫大頭腫痛者陽明邪熱太甚實由小陽相火而爲之也熱爲之腫或爲病痛治之當視其腫勢在何部分隨經而處治之此天行之病也

主方經驗 治頭大腫痛脉弦而短即蝦蟆瘟也

黃連

黃芩

各二兩

甘草

炙



黃耆加款冬花久嗽去人參氣泄加青皮木香寒
月加益智仁草豆蔻夏加岑連痞悶加芍藥腹脹
加枳殼砂仁寒加姜桂腹痛加芍藥
加減參黃湯方見虛損門治內傷加減用之三尺脉
滑而澁下虛也

瘡疾十八

夫夏傷於暑秋必瘡瘡此四時之氣自然也或乘涼
過度露卧湿地飲冷當風飢飽失時致令脾胃不和
痰積中脘遂成此疾所謂無痰不成瘡者是也其病
之始必先起於毫毛欠伸畏寒戰慄頭痛如渴欲飲

冷或先寒後熱或先熱後寒或熱多寒少或寒少熱多或但熱不寒或一日發或三日發者難愈有所謂脾瘡寒食溫熱但瘡之類皆寒熱二氣之所變化也但多進飲食截脾驅疾之藥而後截之則愈三日一發者受病一年二日一發者受病二月一日一發者受病一月二日住一日者氣血俱受病一日間一日者補藥帶表可也其脉弦數者風熱也弦遲者寒也弦少緊者可下之弦遲者溫之緊數者汗之浮大者吐之飲食消之風宜汗之寒宜溫之痰宜吐之瘡病多端不可不察也

