

重刊孫真人備急千金要方

二十六



醫刊孫真人備急千金要方卷之二十四

解毒并雜論

解食毒第一

論一首

方二十九首

論曰凡人跋涉山川不諳水土人畜飲啖誤中於毒素不知方多遭其斃豈非枉橫耶然而大聖又設其法以救活之正為貪生嗜樂忽而不學一朝逢遇便自甘心竟不識其所以今述神農黃帝解毒方法好事者可少留意焉

治諸食中毒方

飲黃龍湯及羣角汁無不治也飲馬尿亦良

治飲食中毒煩瀉方

苦參二兩咬咀以酒二升半煮取一升頓服取吐愈

治食百物中毒方

掘側傍地深一尺以水滿坑中取側壽七枚燒令煙

以投坑中乃取水汁飲四五升即愈急者不可得但
掘地著水即取飲之

方

服生韭汁數升

方

含貝子一枚須臾吐食物瘥

治食六畜肉中毒方

各取六畜乾屎為末水服佳若是自死六畜肉毒水
服黃蘗末方寸匕須臾復與佳

方

燒小豆一升為末服三方寸匕神良

方

水服竈底糞土方寸匕

治食生肉中毒方

掘地深三尺取下土二升以水五

糞土五六沸服

上浮清者飲一升立愈

治食牛肉中毒方

治食毒

狼牙燒灰水服方寸匕良

又方溫湯服猪脂良

又方水煮甘草汁飲之

治食牛馬肉中毒方

飲人乳汁良

治食馬肉血洞下欲死方

豉貳伯粒

杏仁貳拾枚

右二味以咀蒸五升米下飯熟擣之再服令盡

又方蘆根汁飲以浴即解

治生食馬肝毒殺人方

牡鼠屎一七枚兩頭尖者是以水研飲之不瘥更作

治食野菜馬肝肉諸脯肉毒方

取頭垢如棗核大吞之起死人

良方 燒狗屎灰水和絞取汁飲之立愈

良方 燒猪骨為末水服方寸匕日三

治食百獸肝中毒方

類服猪脂一斤佳亦治陳肉毒

治食狗肉不消心中堅或腹脹口乾大渴心急發熱狂言妄語或洞下方

杏仁一升合皮研以沸湯三升和絞取汁分三服狗肉完片皆出即靜良驗

治食猪肉中毒方

燒猪屎為末服方寸匕犬屎亦佳

治漏脯毒方

張文仲云茅室諸水迷脯為漏脯

擣韭汁服之良大豆汁亦得

解毒方



治齧肉濕肺毒方

張

燒狗屎為末水

密蓋不泄氣皆

亦殺之

治脂在黍米中毒方

麴一兩塩兩搗

治中射罔肺毒及餅

取貝子為末水

人以雉肉作餅臃因

犀角為末服方

治食鵝鴨肉成病實

服秫米甘良

何云肉閉在密器中細化者

方寸匕凡生肉熟肉皆不用深

久又肉汁在器中密蓋氣不泄者

水一升煮服之良

中毒方

如豆佳不瘥又服

皆吐下治之方

已得靜其良

面赤不下食者方

治食魚中毒方

煮橘皮停極冷飲之立驗附後方云治食魚中毒面腫煩亂者

治食魚中毒面腫煩亂及食鱷魚中毒欲死者方

劉蘆根春取汁飲良并治蠶毒亦可取蘆葉耳汁

飲之愈

治食魚鱸及生肉在腸中不化吐之不出便成癰瘕方

厚朴三兩 大黃貳兩

右二味以酒二升煮取一升盡服立消人強者

大黃用酒二升煮取二升再服之

治食魚鱸不消方

大黃參兩切 朴消貳兩

右二味以酒二升煮取一升頓服之仲景方有附後方云治食魚

附後方



猪肉偶食不消必成
腹下之方亦無橘皮

又方春馬鞭草飲汁一升即消生薑亦良用後方云亦
宜服諸汁藥

又方鮐魚皮燒灰水服無完皮壞力裝取之一名鮐魚皮

古今錄驗云治
食鮐魚傷毒

又方魚皮燒灰水服方寸匕

又方魚鱗燒灰水服方寸匕食諸鮐魚中毒亦用之

治食蟹中毒方

冬瓜汁服二升冬瓜亦可食

治食諸菜中毒方

甘草 貝齒 胡粉各等分

右三味治下篩水服方寸匕小兒取乳汁共服二升

治食山中樹菌中毒方

人果汁服一升良

解百藥毒第一

論一首

解毒二十八條

論曰甘草解百藥毒此實如湯沃雪有同神妙有人中烏頭巴豆毒甘草入腹即定中氣廣毒熱湯下咽便愈中野葛毒土漿飲訖即止如此之事其驗如反掌要使人皆知之然人皆不肯學誠可歎息方稱大豆汁解百藥毒余每試之大懸絕不及甘草又能加之為甘豆湯其驗尤奇有人服玉壺丸治嘔不能已百藥與之不止藍汁入口即定如此之事皆須知之此則成規更不須試練也解毒方中條例極多若不指出一二學者不可卒知餘方例爾

石藥毒用

白鳴屎

人參汁雄黃毒用防己

鐵粉毒用礞石

礞石毒用大豆汁

白無名

防藥毒用葵根汁

枯師毒用白粥

甘遂毒用大豆汁

大戟毒用葛蒲汁

鰕蟧毒用棗子汁

劉李毒用海醋

馬牙毒用清水

野芋毒用土漿

人糞汁

杏仁毒用藍子汁

百藥毒用甘草

薺危

大小豆汁

藍葉根實汁

金銀毒用

水銀服數兩即

山雞子汁及屎白燒猪脂和

水淋雞屎汁煮葱白汁鴨血及屎汁

芫花毒用

防已

防風

甘草

桂汁

野葛毒用

雞子清

葛根

汁

甘草汁

鴨頭熱血

猪膏

雞屎

人屎

藜蘆毒用

雄黃

溫湯

葱汁

烏頭天雄附子毒用大豆 遠志 防風 棗肉 飴糖

射罔毒用藍汁 大小豆汁 竹瀝 大麻子汁

藕支汁 六畜血 貝齒屑 蚯蚓屎

半夏毒用生薑汁及煮乾薑汁

葶苈毒用薤白 甘草 羊角 蟹汁 升麻

狼毒毒用杏仁 藍汁 白飲 鹽汁 木占斯

巴豆毒用黃黃連汁 大豆汁 生薑汁用後

菖蒲汁 煮寒水石汁

蜀椒毒用葵子汁 蒜 桂汁 豉汁 人尿 冷水

土漿 雞毛燒吸煙及水調服

斑蝥元青毒用猪膏 七豆汁 戎鹽 藍汁

鹽湯煮猪膏 巴豆

諸毒



服藥過齊心亂者

水

和

葛粉

地漿

水

襲荷汁

粳米

水

豉汁

乾薑

乾薑

乾薑

乾薑

黃連

飴糖

飴糖

飴糖

飴糖

飴糖

飴糖

飴糖

飴糖

飴糖

解諸菌毒

掘地作坑以水沃中

攪令濁澄清飲之各地漿

解

一切毒藥發不問草石

始覺惡即服此方

豉

參升

葱白

葱白

葱白

葱白

葱白

葱白

葱白

葱白

右三味咬咀以水七升

煮取一升半分三服

雞腸草

解諸毒方

雞腸草

雞腸草

雞腸草

雞腸草

雞腸草

雞腸草

雞腸草

雞腸草

雞腸草

雞腸草

雞腸草

雞腸草

雞腸草

雞腸草

雞腸草

雞腸草

雞腸草

雞腸草

雞腸草

當歸

當歸

當歸

當歸

當歸

當歸

當歸

當歸

當歸

當歸

當歸

當歸

右八味治下篩水服方寸匕多飲水為佳若為蜂蛇等

毒蟲所螫以針刺螫上血止著藥如小豆許於瘡中令
濕瘡為射罔箭所中削竹如以股長一尺五寸以綿纏
繞水沾令濕取藥內瘡中隨瘡深淺令至底止有好血
出即休若服藥有毒水服方寸匕毒解痛止愈

解毒藥方

薺若 壹分

藍井花貳分

右二味七月七日取藍井花搗篩水和服方寸匕日三

又方 中毒者取秦煎毛二七枚燒灰服

解一切毒方

母猪屎水和服之又水三升二合和米粉飲之

解鴆毒及一切毒藥不止靈應方

甘草

蜜各肆分

銀米粉 壹升

解毒藥

右三味以水五升煮甘草取二升去滓散大熱內粉湯中攪令勻調內白蜜更煎令熟如薄粥適寒溫飲一升治食食若悶亂如卒中風或似熱盛狂病服藥即劇方飲甘草汁藍青汁即愈

治野葛毒以死口噤者方

取青竹去兩節挂兩脇臍上內冷水注之暖即易須臾口開開即服藥立活惟須數易水

治鉤吻毒困欲死面青口噤逆冷身痺方附後方云鉤吻毒藥後食芥和以

薺老八兩咬咀以水六升煮取三升冷如人體服五合日三夜一凡薺薺老惟令濃佳

又方煮桂汁飲之

又方噉葱涕佳葱涕法用葱毒

治腹中有鐵方

白折炭刮取末并花水服三錢不過再服

解五石毒第二論二首方二十一首

論曰人不服石以無事不佳惡瘡疥癬溫疫瘡疾年年常患寢食不安興居常惡非止已事不康生子難育所以石在身中萬事休泰要不可服五石也人年二十已上可服石藥若素肥充亦勿妄服四十已上必須服之五十已上三年可服一劑六十已上二年可服一劑七十已上一年可服一劑

又曰人年五十已上精華消散服石猶得其力六十已上轉惡服石難得力所以常須服石令人手足溫暖骨髓充實能消生冷舉措輕便復耐寒暑不著諸病是以大須服

服藥法



之凡石皆熟煉用之凡石之發當必惡寒頭痛心悶發作
有時狀如溫瘧但有此兆無過取冷水淋之得寒乃止
切冷食惟酒須溫其諸解法備如後說其發背疽腫方見
前二十一卷中

又曰凡服石人其不得雜食口味雖百品具陳終不用重
食其肉諸雜既重必有相賊聚積不消遂動諸石如法持
心將攝得所石藥為益善不可加余年二十八九嘗服五
六兩乳自是以來深深體悉至於將息節度頗識其性養
生之士宜留意詳焉然其乳石必須土地清白光潤羅紋
鳥翻一切皆成白可入服其非土地者慎勿服之多皆殺
人甚於鴆毒紫石白石極須外內映徹光淨皎然非此亦
不可服寒石五石更生散方舊說此藥方上古名賢無此

漢末有何侯者行用自皇甫士安已降有進餌者無不發背解體而取顛覆余自有識性已來親見朝野仕人遭者不一所以寧食野葛不服五石明其大大猛毒不可不慎也有識者遇此方即須焚之勿久留也今但錄主對以防先服者其方以從煙滅不復須存為含生害也

葱白散湯鍾乳對木又對枯婁其治主肺上通頭骨木動鍾乳胃塞短氣鍾乳動木頭痛目疼又鍾乳雖不對海蛤海蛤能動鍾乳鍾乳動則目疼短氣有時木動鍾乳直頭痛胃塞然鍾乳與木為患不過此也雖所患不同其治一矣發動之始要有所由始覺體中有異與上患相應宜速服此方

葱白

半斤

豉

一升

人參

外洗用吳茱萸湯洗

甘草

各二兩