

世醫通變要法

四



世醫通變要法卷上

頭痛五十一

夫頭痛之爲病亦非一端也靈樞雲厥頭痛取足六經手少陰真頭痛其腦盡痛手足寒過至節手三陽之脉受風寒伏留而不去則名厥頭痛入骨入腦者名真頭痛旦發夕死夕發旦死非藥物之可療矣今之體氣虛弱者或風寒之氣所侵邪正相搏伏留不散發爲偏正頭疼其脉多浮緊又有停痰厥而頭疼蓋厥者逆也逆壅而充於頭也痰厥之脉時伏時見亦固有腎虛之氣厥并之新沐之後當風露卧皆能

令人頭痛治之審其所因風邪則驅散之痰聚則溫利之腎虛則補煖之尋常感冒頭疼發熱又宜隨證治之大抵脉浮而滑易治短瀯難也

主方經驗 治風寒伏留陽經氣厥痰飲頭疼

川烏

防風

各一兩

南星

天麻

乾姜

川芎

各一兩半

半夏

泡

荊芥穗

甘草

各一兩

右各為末滴水作餅每服一餅用葱頭茶嚼下

又方經驗 治諸風上攻脉浮而緊偏正頭疼

荊芥

川芎

各二兩

香附米

薄荷各一兩

白芷

羌活

防風各一兩半

右末每服三錢食後茶清調下

加減消風羌活散 治頭目疼痛寸口脉浮鼻塞

人參

羌活

川芎

赤茯苓各二兩

羌活炒

藿香

荊芥

防風各一兩

甘草五錢

蟬蜋三錢

厚朴

陳皮各七錢

右咀每服五錢姜三片葱頭三箇水煎服如頭痛

甚者加細辛白芷葉本天麻有痰加半夏南星

奇効止痛太陽丹用川烏天南星細辛川芎各為末
又用連根葱白共拌作餅貼於太陽穴處右邊屬
痰屬熱用蒼朮半夏黃耆左屬風用荊芥防風薄
荷左邊屬血虛用川烏川當歸白芍藥熟地黃各
等分右咀每服五錢姜三片水煎服

頭風五十二

主方經驗 治頭風頭痛

藿香

防風

各二兩

丹砂

龍腦

各一兩

天麻

白附子

白芷

白朮

各一兩半



右爲末糊爲丸如梧桐子大每服三十丸白湯送

下

眩暈五十三

夫眩暈者乃肝風上攻必致眼花屋轉起則倒仆是
也由六淫外感七情內傷皆能致病風則有汗項強
不仁寒則無汗筋脉痙病暑則煩悶濕則重着吐逆
及七情所感遂使臟氣不平鬱而生涎結而生痰虛
氣上逆令人眩暈眉稜骨痛不可開眼有此爲異與
夫疲勞過度上實下虛金瘡吐血衄便利及婦人崩中
出血皆令人眩暈詳其所因乃活法也

主方經驗 治氣虛血虛眩暈脉沉而緩

半夏

陳皮

白茯苓

各一兩半

當歸

川芎

各二兩

宿砂

各一兩

甘草

木香

各五錢

右咀每服五錢姜三片水煎服藥水磨吞黑鉛丹

見痼冷也

又方經驗

治感寒濕頭重眩暈

附子

泡一兩

白朮

川芎

肉桂

各二兩

甘草

五錢

右咀每服五錢姜七片水煎服

加減桂枝散 治氣上衝胃脉散而怒戰搖眩暈

桂枝

白茯苓

白朮 各二兩

川芎

半一兩

甘草

一兩

右咀每服五錢水煎服風證加細辛濕加蒼朮寒

加乾姜良姜

加減乾姜湯

方見寒門

治寒濕眩暈寸脉俱沉香吞

來復丹及理中丸

加減參夏湯

方見氣門

治七情相干眩暈欲倒者加

乳香

加減五苓丸

方見膈門

治痰飲眩暈欲嘔者

一法經驗 治火動眩暈者用脾胃門陳皮湯加羌

活黃芩防風蒼朮散風行濕之劑

又方治血虛眩暈用川芎當歸氣虛頭痛補氣降火

人參白朮黃連黃芩俱酒炒水煎服

心痛五十四

夫心痛者有九種一虫二疰三風四悸五食六飲七
冷八熱九來去痛名雖異而其所至皆由四氣外感
七情內傷或飲淡生冷果食之類或邪氣攻擊氣道
遂成心痛若痛甚手足青過節名真心痛旦發夕死
旦死非藥物可療也凡痛不過邪氣乘於心傷

於經絡大抵脉沉而細易治浮大弦長難也

主方經驗

治九腫心痛脉微而急及中惡腹脹

不能言又治連身積冷在心腹上氣痛及落馬墮

車等疾

附子

泡一兩

乾姜

泡

吳茱萸

赤茯苓

各二兩

狼毒

一兩

巴豆

去殼油五錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸白湯

送下

又方經驗

治心虛脉瀦諸虛氣痛不可忍者

血竭

沒藥

沉香



辰砂各一兩

木香三錢

麝香一錢

右各為末用磁石器熬出甘草膏為丸如皂角子
大每服一九姜湯送下

加減桂枝湯 治風冷客邪相搏脉弦心腹作痛

桂枝

白芍藥

各二兩

半夏

白茯苓

厚朴

枳殼

各一兩半

紫蘇葉

甘草

右咀每服姜三片棗一枚水煎服寒加乾姜丁香

姜厥逆加附子

治心疼胃口呆有熱而作痛非妙出梔子



不可佐以姜汁或用痰門陳皮湯加川芎倍梔子
痛甚者加炒乾姜又方用荊芥子炒黑為末米飲
湯調下

又法治產後血氣痛亦治脾疼用青皮桂皮各半兩
水煎數沸次下桂又次下陳皮

心恙五十五

夫心乃藏血之腑憂思勞役太過耗損真血心帝失
輔亦能令人怔忡驚惕以致膽氣虛怯或因事聞聲
戰怯又夢寢之中忽墮層岩精神恍惚如有所見若
內外之氣相搏則宜驅邪散氣濕利痰飲心血有所

虧損補益其榮衛寧其心志壯其膽氣如此調理則可矣

主方經驗 治男子心氣不足志意不定驚悸恐

悲憂虛煩少睡喜怒不常夜夢盜汗飲食無味頭

目昏眩常服益氣壯鎮心神

麝香 一錢 另研

山藥 姜汁炙

人參

黃耆

遠志

去心姜汁炒各一兩

木香

二錢半

白茯苓

茯神

去木

桔梗

各一兩半

甘草

五錢

辰砂

一錢半

右為末每服

錢溫酒調下

又方經驗 治一切癰癰脉弦或因驚悸怖所致及
婦人產後血虛驚氣入心并室女經脉通行經期
蘊結頻服此藥立効

硃砂

二兩
另研

水銀

二兩

黑錫

一兩

乳香

一兩
另研

右將黑錫入礮子內下水銀結成珠子次下珠砂
滴乳香乘熱用柳條搥研勻為丸如鷄子大每服
一丸空心井水送下痛者得睡切莫驚動覺即安
再服一丸除根

加味茯苓湯 治心氣不足或怔忡夜多異夢如墮

層岩常服安心腎益榮衛

白茯苓

五味子

各二兩半

茯神

去木

麥門冬

去心各二兩

肉桂

車前子

遠志

去心

熟地黄

人參

酸棗仁

去殼油

山藥

各一兩半

甘草

龍齒

硃砂

各一兩研

天門冬

去心一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心

米飲下

加減補心湯

方見感冒門

蘇葉散除本香加四物是

也治心氣虛耗不能藏血以致面黃五心煩熱咳

嗽吐血

一法經驗 治心神不定恍惚不樂時復震跳

遠志

去心

丹參

各一兩半

雄雀

五錢

赤茯苓

二兩

沉香

半兩 另研 不見火

人參

赤小豆

各二兩

大棗

五箇

紫石英

小麥

紫苑

甘草

各一兩

右末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸食後人

參湯送下

怔忡五十六

夫怔忡者由心血不足也蓋心主血真氣虛耗心帝失輔遂成怔忡不已變生諸證舌強恍惚喜怒憂悲少顏色皆心痛之候當補真元無不愈矣

又有風寒暑濕所傷怔忡無飲停痰填塞中脘亦令人怔忡也

主方經驗 治痰飲畜於心胃怔忡不已

赤茯苓

茯神

去木各一兩半

麥門冬

去心

陳皮

各二兩

甘草

檳榔

各一兩

沉香

五錢另研