

喉科心法



光緒戊寅夏月

喉科心法



北京中医药大学图书馆版权所有

板存揚州左衛街
翰雅齋刻字鋪內



南京中醫藥大學圖書館版權所有

弁言

喉科醫書夥矣簡者不甚詳明繁者
未盡精當皆非善本也以故喉風一

發多有不救惟潘葆真先生喉科心

潘葆真先生

法一編其辨論陰陽寒熱表裏虛實

至明且當洵喉科之最善者也前湖

南衡陽邑侯林端甫先生因衡郡喉

疾科公法

弁言

一



風時作刊發是書如法而治者屢著
神奇全活無算惜其書尙未徧傳爰
商同志醵金重刊存板於維揚書肆
樂善者廣爲印庶可以徧傳而普
救也夫

光緒四年戊寅首夏衡陽浣月居士
識於揚城之樹德堂

喉科心法目錄

臨症要訣

陽症喉痺

纏喉風卽走馬喉風

緊喉風 啞瘴喉風 弄舌喉風

大頭瘟喉痺並捻頸瘟喉痺

單蛾 雙蛾

喉疔

鎖喉毒

上腭癰



北京中医药大学图书馆版权所

喉瘤

喉瘡

喉舌破爛

陰症喉痺

氣虛喉痛

血虛喉痛

陰虛喉痛

癆嗽咽喉痛

咽喉痛失音

梅核氣



婦人胎前產後喉痛

幼小喉痛

肺絕喉痺

雜症

氣衝攻腹繞喉

氣從小腹上衝胸咽

喉若有物相碍不爽利

咽喉痛屬陰陽毒

咽袋杵喉誤針傷喉

魚骨哽咽

竹草芒刺哽喉

誤吞針

誤吞頭髮繞喉不出

搶舌風

小兒木舌

翼舌

重舌

臍上一點氣上至咽喉

喉腫外見五色紋

咽生瘰癧肉

脚根喉痛

諸骨哽咽

稻芒糠穀哽喉

誤吞金銀銅鐵

誤吞銅錢

誤吞水蛭即螞蝗

諸骨哽喉及竹木刺入

舌腫脹舌瘡破爛

重舌



南京中医药大学图书馆版权所有

重
馬
牙

內服諸方

荊黃敗毒散
喉痺飲
六味地黃湯
八味地黃湯
加味甘桔湯
連召散
歸芪飲
理中湯
附子理中湯
清胃散
歸脾湯
姜附湯
補中益氣湯
四物湯
加味逍遙散
紫苑湯

鵝口瘡
兜腮癰

清咽利膈湯
真人活命飲
知柏地黃湯
八珍湯
元參解毒湯
普濟消毒飲
六君子湯
加味理中湯
甘露飲
全真一氣湯
四逆湯
附子湯
補陰益氣湯
生脈散
鎮陰煎
補肺阿膠散



外治諸方

麻杏甘石湯

只吉二陳湯

十全大補湯

溯源救腎湯

瀉黃散

人參固本丸

雄黃解毒丸

蠟礬丸

獨行散

盤珠丹

開關散

豆礪冰片散

白雪散

雞子清方

喘鼻散

鳳凰衣散

碧雪散

咽喉急症方

二陳湯

加味導痰湯

四七湯

人參養營湯

沈龍丹

元珠丹

七寶散

巴豆油紙撚

絳雪散

金鑰匙

蜜製附子方

海浮散

紫金錠

如意金散



少商穴圖說

避瘟防護良法

醫案

論



喉科心法

臨症要訣

夫人身五臟六腑十二經脉。除足太陽經其餘十一經皆
內循咽喉。盡得以病之。不獨肺胃也。但有陰陽表裏虛實
寒熱輕重緩急之不同。必得真傳。方能辨認。大抵屬陽熱
者。十之六七。屬陰寒者。十之二三。而風火相火者。則十
之八九。臨症看喉之訣。最要輕手。快眼。莫心。神。無
論富貴貧賤老幼男女。必令患者朝亮明處。而後使人託
其頭。夜則燃火紙。撚照看。醫者以箸按其舌根。着意看其

喉中左右上下形色自不同。常或紅甚腫甚痛甚。或微紅微腫微疼。或紅甚痛甚而不腫。或不紅不腫而祇疼。或不紅不腫且色白而疼痛。或有形或無形。或來勢急發於頃刻。或從容緩發於數朝。或喉裏喉外皆紅腫。或頭項腮頤並紅腫。或因瘟疫壯熱大渴。或感風寒發熱惡寒。或已灌膿不速潰。或潰後餘腫不消。或破爛或誤針。既看其喉再看其舌。有胎無胎。或黃或白。或潤或乾。或灰或黑。又看兩唇淡紅淡白。紅甚而焦。或紫且黑。問表症之有無。審二便之通澀。聞口臭之微甚。察飲水之冷熱。病有新久虛實。迥別有表重於裡。有裡急於表。有虛多實少。有邪甚人強。

有純陽。有純陰。有陰居八九。陽居一二。有氣虛而有火。血虛而有火者。有陰虛火炎上者。有火不藏源者。或誤用溫補者。或誤用寒涼者。種種不同。臨症切宜細辨。再三審問。詳其所兼現之症。不可潦草了事。若有表症。不知表散。遽投寒涼。及末藥之類。釀禍不小。誤於溫補。猶可挽回。誤用寒涼。過於攻伐。多不可救。古哲云。以不足之法。治有餘症。其錯猶小。以有餘之法。治不足症。禍則烈矣。常見富貴人及婦女輩。懶於下牀看喉者。此不可曲從。牀上看。不明白。關係非小。須明諭之。女子年十四歲以後。與夫師尼寡婦。當問經水通閉。有夫之婦。必問娠妊有無。數月嬰孩。胎產。

婦人。年高老人。素虛弱人。大病後人。虛勞內傷人。悉宜詳
慎。尤不可忽。此皆臨症要訣。實屬心法真傳。學者一
守而行。無不神乎其技矣。其辨症治療。製修丹散之法。悉
詳於后。逐條潛玩。自得其妙。

陽症喉痺

痺者痛也。痛而紅腫爲陽。痛而不紅腫爲陰。若人膈間素
有痰涎蓄積。或因好飲燒酒。過啖雞魚牛羊煎炙厚味。及
姜椒等熱物。或因忿怒失常。或因縱慾多服助陽藥。蓋過
啖熱物。火起於脾胃。忿怒。火起於膽。縱慾。火起於肝腎。火

動生風。鼓激痰涎。結聚於咽喉窄狹之處。紅腫疼痛。飲食
阻礙。小便赤。大便結。此爲陽症喉痺。治法必審其表症有
無。若無惡寒發熱頭痛咳嗽鼻塞等候。多是暴寒折熱。寒
束於外。熱鬱於內。切不可遽用末藥吹噙。及先投苦酸鹹
寒清降涼瀉煎劑。如芩連豆根射干石羔硝礬之類。遏鬱
表邪。不得外散。以致表邪得以深入。傳變多端。因而釀成
不治之症者。指不勝屈。當先用荆防敗毒散。加葱白香豉。
或再加牛子元參姜虫連翹一二劑。急急解散表邪。然後
用末藥吹噙。方不誤事。若失於未表散。已經誤治。而表症
尚在者。急禁止吹噙末藥。用荆防敗毒散連進二三劑。俟

虛人加人參。提出內陷之表邪。亦可以救前誤。昧者謂咽
喉病忌用發散。謬妄殊甚。豈知薛氏醫按。立齋先生用之
屢矣。此先表後裏法。亦逆流挽舟法也。粗工那得知之。凡
表重於裏者。及表邪內陷者。惟此法爲最當。若連日不食。
又尅伐寒涼過度。胃氣告匱。正虛邪盛。則用之無益。且多
不可救。此時善刺者。急針之。或可救也。至於表裏兩急之
症。又不得拘前說。初起咽喉紅腫痛俱甚。表則惡寒發熱。
頭痛身痛咳嗽。裏則口渴喜冷。口臭氣粗。舌生黃胎。小便
赤大便結。或二便俱閉。痰涎上壅。語聲不出。飲食不入。是
表裏兩急也。法當雙解。煎劑用荊防敗毒散。合清咽利膈

