



山西省 中兽医经验选辑

第二集



山西省农业厅畜牧局
山西省畜牧兽医研究所

编

山 西 省
中 兽 医 诊 疗 经 验 选 辑
(第二集)

山 西 省 农 业 厅 畜 牧 局
山 西 省 畜 牧 兽 医 科 学 研 究 所 编

一 九 八 二 年 五 月

前 言

近年来，我省广大中兽医工作者，在党的十一届三中全会精神鼓舞下在继承发扬祖国兽医学遗产和中兽医科研方面作了大量工作，取得一定成绩。为了进一步提高我省中兽医诊疗技术水平，更好地为四个现代化服务，山西省畜牧兽医学会于一七八一年五月召开了全省中西兽医结合学术讨论会，总结交流了我省中兽医科研成果和经验。为使这些成果和经验及时推广应用，我们将会议提供的部份资料，选编成册，供广大畜牧兽医工作者参考和验证。

会议委托李大义、郭新雨、任养生等同志参加了选编工作，由于我们编写经验不足，书中可能存在缺点和错误，望广大读者批评指正。

本《选辑》蒙各级领导和作者的大力支持，在此表示感谢。

编 者

一九八二年三月

目 录

聂士鹏先生的切脉法简介

.....山西省畜牧兽医学校 侯清德整理 (1)

浅谈马属动物脾胃病的辨证施治

.....临汾县兽医院 侯世丰 (6)

滋阴与助阳法在兽医临床上的应用

.....阳高县畜牧站 张 典 (10)

对家畜“疝症”辨证论治的体会

.....孝义县兽医院 赵守元 (19)

治验二则

1. 屈腱断裂症治疗体会

2. 牛翻胃吐草治疗经验

.....太原市南郊区兽医院 张久福 (25)

增液白虎汤治疗胃肠实热症的体会

.....晋东南地区兽医院 郭来保 (27)

胎盘散试治家畜虚劳证的体会

.....陵川县畜牧局家畜防治站 董文斌 (30)

加减平胃散在家畜脾胃病上的应用及其机理初探

.....寿阳县西洛公社畜牧兽医站 王焕聪 (33)

活血化淤加软坚散结法治疗增生性炎症

.....襄垣县兽医院 霍长和 (36)

学习和运用《元亨疗马集》方剂的体会	
.....天镇县兽医院	田玉星(40)
“消补兼施”法在临床上的应用	
.....晋东南地区兽医院	郭来保(48)
马骡“心寒吐水”(流涎癖)治验二例	
.....忻县兽医院	韩亨庆(55)
大家畜痹症治验	
.....忻县兽医院	韩亨庆(59)
马下颌捻转止痛制动实验观察初报	
.....高平县兽医院	李玉振等(68)
小青龙汤与小柴胡汤在兽医临床上的应用	
.....清徐县兽医院	郭彦聪(71)
乌蛇菊花散治疗大家畜破伤风九十一例	
.....乡宁县家畜防治站	李光明(76)
当归红花散加减治疗跛行的体会	
.....五台县兽医院	白国章(85)
中西医结合治疗奶牛胎衣停滞	
.....山阴农牧场	李智麟(91)
中兽医方剂组成与药物配伍规律浅见	
.....静乐县兽医院	薄瑞年(94)
浅谈中兽医常用的几种退热法	
.....晋东南地区兽医院	郭来保(99)
桃红透表汤治疗牛皮肤出血症的试验	
.....灵石县畜牧局	马云武(108)
金头大蜈蚣治疗猪疥癣的报告	
.....太谷县兽医院	(111)

活血化淤法临证运用二则

-静乐县兽医院 薄瑞年 (113)
- 醋制香附治疗大牲畜慢性子宫内膜炎的疗效观察
-临汾地区畜牧兽医研究所 张清海 (117)
- 甘草大戟散治疗羊瘤胃积食病的体会
-朔县兽医院 彭世仁 (121)
- 脑颞 (额、额窦蓄脓症) 治疗经验
-太谷县兽医院 (123)
- 绵羊毒蛇咬伤的防治
-介休种羊场 席培模 (126)
- 母马耳毛验胎法的观察初报
-怀仁县家畜改良站 孙 吉 (131)
- 仔猪厥阴证治验 (仔猪白痢)
-文水北张公社畜牧兽医站 杜贤晦 (136)
- 电针治疗母畜不孕症疗效观察报告
-怀仁县家畜改良站 孙 吉 (138)
- 浅谈用淀粉膏治疗家畜骨折
-雁北地区畜牧局 左行伟 (144)
- 治疗马骡夏癣的经验
-襄垣县兽医院 霍长和 (148)
- 白矾对羔羊疱疹性口炎的治疗观察
-吉县兽医院 刘维儒 (149)
- 温针治疗马属动物腰胯风湿症51例
-孝义县兽医院 赵守元 (152)
- 验方选登
- (156)

聂士鹏先生的切脉法简介

山西省牧校 侯清德整理

切脉，是中兽医诊断疾病的重要方法之一，祖国历代兽医工作者积累了丰富的脉诊经验。但由于动物种类的不同，各地区，各医家的传统习惯不一，切脉部位和方法的差异也较大。比如：马骡颈基部的“双凫”脉，下颌部血管切迹处的颌外动脉，牛尾根腹侧正中的尾中动脉，猪羊后肢内侧的股动脉皆为切脉部位。切脉部位与方法的不统一，使教学人员和临床医生都感到很不方便，练习和掌握也深感困难，特别是初学者，常望而生畏，丧失信心。同时，这些部位的脉位有长有短，有深有浅，长短深浅不一，很难区分（或根本无法区分）“三部”、“三关”。这就与中兽医基本脉理脱节，造成了理论上的混乱和实践中的困难。

我省公安厅劳改农场老中兽医聂士鹏先生（现已年老退休）家传对马驴骡牛猪羊一律采用肘关节内侧切脉法。把几种主要家畜的切脉部位和方法统一起来，三代行医应用于兽医临床。实践证明，这种切脉法既便于练习掌握，又遵循了中兽医的基本脉理。现作简要的整理介绍。

一、切取部位

我们认为聂先生切脉的部位是正中动脉，所以本文将其切脉法暂称为“正中动脉切脉法”。切取部位在动物腋下前

肢内侧的正中动脉搏动处。其解剖部位是肘关节内侧的正中动脉处。

二、切取方法

患畜站立或躺卧皆可进行，不受姿势限制，但以患畜自然姿态站立较为方便。

以左前肢进行切取为例，诊者立于患畜左侧，面对诊肢，右手托患畜耆甲部，左手由左前肢前方伸入腋下（即：肘关节内侧）。然后用食、中及无名指三指的指腹紧贴肢内侧切脉部位的皮肤，前后略（微）搓动，仔细寻摸即可感到脉搏的跳动。左手托耆甲部，右手由肘后方伸入腋下也可切左肢脉。用同样的方法可切取右肢脉。

待感到脉搏跳动后，以浮、中、沉三种指法细心体察脉的来去及经过状态（即脉象），主要辨别其深浅〈浮沉〉、至数〈迟数〉、性状〈滑涩〉、强弱〈顶指力的大小〉、节律〈是否均匀一致〉，据此以推断疾病的表里、寒热、虚实和病情的轻重，抵抗力的强弱等。

若诊猪羊、驹、犊，须一助手将患畜站立保定。诊者蹲在所诊前肢的同侧，面对诊肢即可如前法进行。

若患畜不能站立，则可取躺卧姿势，将前肢自然伸开，诊者靠近患畜的耆甲部，半蹲或全蹲下即可任由诊肢的前或后伸入至腋下切取上侧一肢的脉。将患畜翻身后可用同法切取另一肢的脉。〈也可不必翻身进行〉。

三指间的距离可根据患畜的大小灵活掌握，一般以自然伸开，间隔半至一指的距离为宜。

三、应属脏腑

自下向上〈即由远心端向近心端〉依序为寸、关、尺三部。左寸应心及小肠，左关应肝胆，左尺应肾与膀胱；右寸应肺与大肠，右关应脾胃，右尺应命门与三焦。双寸出现反脉〈即病脉〉，多反应上焦的病证，双关出现反脉多反应中焦的病证，双尺出现反脉多反应下焦的病证。比如：风寒咳嗽，右寸脉多浮紧；心经积热，左寸脉顶指；六脉迟细，右关涩弱常见于脾胃虚寒；六脉强数，双关弦滑常见于肝脾实〈或湿〉热；尺脉迟涩而弱则下焦虚寒，或命火不足；尺脉细数而弱则精血减损肾阴空虚。……等。

四、诊案三例

例一、一九六九年，我在朔县种马场四分场任兽医，有十二岁荷兰杂种母牛反复患前胃弛缓，用蓖麻油、硫酸钠等泻药多次治疗，用药即见效但疗效不巩固，过几天又复发。我们准备在国庆节淘汰吃肉。聂先生得知后表示可惜，随请其一诊，诊后指导我说：“脉象迟细，右关独涩显属脾胃虚寒”。我遵其所教，以四君子汤为主合并平胃散加干姜，肉豆叩连用五剂则草料大增，且不再复发。至七三年春我调离马场时，该牛仍很健壮。

例二、一九七五年秋，聂先生来校探亲居住，有祁县张南生产队五岁骡子一头，因左前肢跛行在我校兽医院住院治疗。我们按缺钙合并风湿症治疗已达二十余日，疗效不显。请聂先生诊后说：“尺脉细数，左尺尤显涩弱，我看肾阴不足为本，可配合滋补肾阴试试”。随以六味地黄汤加减每日

一剂研末调灌，并火针抢风、肩井、弓子三穴一次。三日后跛行明显减轻，又住数日，进药三剂，痊愈出院。

例三、与上例同期，太谷县北张三队带驹母驴一头因不肯吃来我校门诊治疗已三次。畜主不在旁，我请聂先生指导，先生切脉后对我说：“六脉平和，双关有力，不会不肯吃吧？”畜主回来一问，方知昨晚吃喝已如常，今日又来是为治疗彻底以防再患。

五、讨 论

聂士鹏先生采用的正中动脉切脉法始于何时何地，创于何人暂无法考查清楚，但就其理论意义和实用价值是值得总结探讨的。这种切脉法既遵循了中兽医的基本脉理又有其独特之处，与一般常见常用的切取家畜脉搏方法相比有如下优点：

1. 正中动脉是浅表动脉易于切取。又各种家畜在此处都没有肥厚的肌肉和脂肪蓄积，所以不受膘情影响，练习和应用都很方便。

2. 正中动脉脉位长短适中，比“双髻”脉短，比颌外动脉长，又左右对称。故能区分“三部”、“三关”，与中兽医诊脉的基础理论结合紧密。

3. 切取正中动脉，诊者由患畜体躯前侧方接触动物，比切取尾中动脉和股动脉既安全又卫生。

4. 正中动脉切脉法统一了马驴骡、猪牛羊这几种主要饲养动物的切脉部位和方法，克服了动物脉诊的混乱。大大方便了理论教学和临床应用。

5. 切脉是中兽医诊断疾病的重要方法，但不是唯一方

法。任何一种切脉法，都必须与望诊、闻诊和问诊紧密结合，做到“四诊合参”综合判断。

古人有“粗之所易”、“上之所难”之说。正中动脉切脉法，虽然易切摸，易练习，但做到熟练掌握，运用自如也是不容易的，必须勤学苦练，反复实践，方能不“粗”而为“上”。

浅谈马属动物脾胃病的辩证施治

临汾县兽医院 侯世丰

马属动物的脾胃疾病，是指脾胃本身功能失调所引起的以慢草和消化不良以及不食等为主要症状的一类病症。是兽医临床上的多发病、常见病，约占消化系统病的60%左右。慢草和消化不良虽然可见于多种疾病中，是一个常见的症状，但均属脾胃病理的反映。早在《内经》指出，脾胃共同完成饮食水谷的受纳与运化，化生气血充养四肢百骸，是维持畜体生命活动的重要器官。水谷化生气血是一个复杂的过程，它与五脏六腑都有关系，而关键在脾胃。因家畜的气血津液全赖水谷精微的化生，其根源则在于脾胃的纳化功能，所以有“五脏皆禀气于胃”。在脾主运化的重要作用上，《素问·经脉别论篇》说：“饮食入胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱，水精四布，五经并行”。脾运化的结果，产生大量的精微，故有“精”者生之本也的记载。这也就是说“精”为畜体生命活动的物质基础，精的来源有二：一是来源于先天之精（肾精），二是来源于水谷，即家畜从外界摄取食物后，先入于胃，经胃的腐熟、消化变成营养物质，再从胃至脾，通过脾的转输运化，又传送到肺，然后通过肺的气化将精气（营养物质）运送到五脏六腑以维持正常的生命活动，这是脾胃在生理方面的作用。

病理上脾胃病的发生与饲养、使役不当，气候变化有着直接关系，但其病变上不外乎寒热虚实；如脾虚则四肢浮肿

无力，行走不便，实则腹胀起卧，大小便不通，寒则肠鸣腹胀；热则善饥口臭过食，这些现象都可导致脾胃的内伤，从而产生种种病症，故有“内伤脾胃，百病由生”，“百病皆由脾胃衰而生也”的记载。这是因为脾胃的内伤，不能生化气血，气血不足，对内不足以维持生命的生理活动，对外无力抵抗病邪的侵袭，往往成为疾病发生的诱因。

再从脾的特性上说，脾为湿土，胃为燥土，脾气主升，胃气主降，脾喜燥恶湿，胃喜润恶燥，而太阴湿土，得阳始运，阳明燥土得阴自安，脾升则健，胃降则和。湿与燥是一对矛盾，但湿不燥，或但燥不润，就要发生病态，故在治疗脾病时，也要根据其特性区别对待。

另外，对疾病诊断和判定预后也非常重要，如中兽医所指“有胃气者生，无胃气者死”，是指病后吃草多少而言，如发病后有食欲，吃草好说明病轻，治疗较易；相反，食欲废绝是预后不良的表现，治疗也比较困难，因此，脾胃的好坏在兽医临床上有着重要的意义。

病因病机

在《素问·评热病论》上有“邪之所凑，其气必虚”。又“肠胃为市，无物不受，无物不入，若风寒暑湿燥火一气偏胜，亦能伤害脾胃”。脾胃虚弱，即容易感受外邪，形成种种疾病，而多种原因都可以引起脾胃运化失调，造成慢草和消化不良。临床上常见的有以下几方面：

一、内伤外感：如过食冰冷食物，或饮冷水过多，或阴雨苦淋，厩舍阴冷，或外感风寒，冷气积于脏内，寒湿注入脾经，致使脾阳不足，运化失调，使之成疾。

二、热积脾胃，因负重奔走太急，饮水不足，又乘饥饲

喂谷料过多，或过食腐败的饲料，停积于胃，郁而化热，或暑热炎天劳役过度，热气入胃，致使胃燥失润，热伤胃津而发病。

三、脾胃虚弱：因饲养不当，时饥时饱，使营养不足，或劳役过度，耗伤气血，致使脾胃虚弱，运化功能失常而成病。

四、过食草料：突然改换饲料，使采食过多，草料不易消化，停于胃肠，阻碍脾胃运化而成病。

五、肝胃不和：因使役不当，饱后劳役过度，使肝郁气滞，疏泄失调，横逆犯胃，形成肝木克土，致成其患。

辨 证

主要表现以食欲减少或不食为主要症状，但由于致病因素不同，可表现出各种不同的证候。

一、胃寒慢草：主要表现为不啃吃拌草，喜吃干草或精料，或食欲减少，耳鼻俱冷，有时四肢肌肉发抖，喜卧地，肠音旺盛，粪球紧小或拉稀粪，尿液清长，口内流涎，舌色鲜红，舌苔灰黄，脉象洪数。

二、脾胃虚弱：病程一般较长，草料减少，精神倦怠，形体瘦弱，四肢无力，喜卧地，有的能吃不上膘，粪便稀软粗糙带有未消化的草料，劳动时易出汗，舌质绵软，口色淡白或黄白，脉象沉细。

三、伤食积滞：精神倦怠，慢性起卧，腹围逐渐增大，粪便粗糙完谷不化，口色鲜红，口内干燥，结膜充血，舌苔厚腻，脉象沉数。

四、肝胃不和：主要表现为慢草，时吃时停，或在使役中上下坡时斜走，口腔干燥，口色燥红，舌上有薄苔，卧蚕呈淡黄色，眼结膜有轻度黄染，一般右侧重于左侧，严重时

第三眼睑呈突起状，舌质无力发胀，粪便肠音变化不大，脉象弦洪。

治 疗 原 则

一般治疗原则是健脾开胃，促进消化，但由于证候类型不同，治疗原则应随症而立，胃寒者以温中散寒为主，胃热者清热开胃为主，脾胃虚弱者以补中益气为主，伤食积滞者以消食导滞为主。肝胃不和者以疏肝和胃为主。

方 药

一、胃寒慢草者用桂心散

桂心50 川朴30 苍术50 甘草20 干姜30
神曲30 葱白三根 白酒50 炒盐40 为末冲服。

二、胃热慢草者用清胃散

石膏60 知母40 花粉40 麦冬30 大黄50
神曲30 甘草20 为末冲服。

三、脾胃虚弱者用益气健脾散

黄芪60 党参50 白术50 云苓40 陈皮30
升麻30 炒扁豆30 干姜20 益智仁20 为末冲服。

四、伤食积滞者用枳实散

枳实60 香附50 青皮40 木香30 莱菔子50
山楂50 神曲50 麦芽50 为末内服。

五、肝胃不和者用柴胡疏肝散

柴胡50 枳壳50 郁金40 白术30 香附30
木香30 青皮20 山楂50 神曲50 大黄30 为末冲服。

护理：加强饲养管理，饮喂要定时定量，给予易消化的草料，防止感受风寒，以促进脾胃功能的恢复。

滋阴与助阳法在兽医临床上的应用

山西省阳高县畜牧站 张 典

滋阴、助阳是针对正虚邪实，以填补肾阴和温补肾阳为主的一种治疗方法。几年来治疗阴虚家畜127头，其中猪97头，治愈率达78.3%；马、骡30头，治愈率达93.3%。治疗阳虚家畜25头，其中猪6头，治愈率达86.6%；马、骡、驴19头，治愈率达84.2%。疗效较满意，兹介绍如下：

从实践中得知，阴虚和阳虚涉及的脏腑虽多，但与肾关系密切，这是因为肾藏一身之“真阴”、“真阳”。而阴虚、阳虚见于多种疾病的过程中，是因久病体弱，损伤肾气，致肾精耗泄，出现阴虚与阳虚。所以滋阴与助阳是治疗肾虚的两个准则，它既不同于正治，也有别于从治，是另外一种治疗法则，在临床实践中应用广泛，颇有成效。《素问·至真要大论》说：“诸寒之而热者，取之阴；热之而寒者，取之阳，所谓求其属也”。王冰注曰：“言益火之源，以消阴翳；壮水之主，以制阳光”。这些论述为后世补肾学说充实了重要内容。

肾精化生肾气，是由肾阳蒸化肾阴而产生，肾阴肾阳又都以肾藏的精为物质基础，所以肾的精气包含着肾阴与肾阳两个方面。肾阴是畜体阴液的根本，对各脏腑组织起着濡润、滋养的作用。肾阳是畜体阳气的根本，对各脏腑组织起着温煦、生化的作用。肾中阴阳犹如水火一样内寄于肾，故前人又有“肾为水火之宅”的理论。肾阴与肾阳在畜体内是

互相制约，互相依存的，以维持畜体生理上的动态平衡。如果这一平衡状态遭到破坏，即形成肾的阴阳失调的病理变化。

肾内藏有真阴、真阳，代表畜体的“阴精”和“阳气”的作用。所以肾气只宜固藏，不宜耗泄。一般而论，肾无表证，少实证，肾的病变虽多，主要的是肾阴虚与肾阳虚两方面。临床所见，有很多证，最后可导致肾气虚。如表证未解，传里化热；热证耗伤阴液，肾精亏损，出现阴虚内热。寒证易耗阳气，久则损伤肾阳，出现阳虚外寒。虚证虽有气虚、血虚、阴虚、阳虚之分，但气虚、阳虚久则损伤肾阳，而致肾阳虚。

治疗原则是培其不足，不可伐其有余，应调节肾气之阴阳，使之阴平阳秘而康复。热疾施凉剂而不效者，肾水不足也，肾水不足，宜滋阴降火。这就是壮水之主，以制阳光。寒证施热剂而不效者，命门火衰也（肾阳虚），治宜补益命门之火源，使之火旺阳盛，寒邪自解，这就是益火之源，以消阴翳。由于阴虚、阳虚出现在多种疾病的过程中，因而滋阴、助阳随主证施治于始终，达到了“上工治未病，先安未受邪之地”的作用。

一、阴 虚

病因：多因温热病邪伤津耗阴；或吐、泻太多；或久病伤肾；或失血耗液；或过多服温燥劫阴之品，暗耗肾阴所致。

症状：体形消瘦，精神倦怠，四肢无力，咽干舌燥，低热不退，或午后潮热，盗汗，多卧少立，公畜举阳滑精，母