

盆栽花草

365种观赏植物的彩色图鉴



自然珍藏图鉴丛书

盆栽花草

徐晔春 江 珊 主编

钟荣辉 孙光闻 副主编

崔晓东 邹春萍 马骁勇 任红云 曾沛芳 易永强 参编

徐晔春 孙光闻 等 摄影

汕头大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

盆栽花草 / 徐晔春, 江珊主编. —汕头: 汕头大学出版社, 2008.1 (2009.6重印)

ISBN 978-7-81120-154-3

I . 盆… II . ①徐… ②江… III . 盆栽—花卉—观赏园艺 IV . S68

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第103546号

Copyright © 2008 Anno Domini Media Co. Ltd., Guangzhou

广州公元传播有限公司

All rights reserved

所有权利保留

图片代理:  www.fotoe.com

盆栽花草

主 编 / 徐晔春 江 珊

责任编辑 / 胡开祥

特约编辑 / 蔡国才

装帧设计 / 唐 薇 王 勇

责任技编 / 姚健燕 刘春芳

出版发行 / 汕头大学出版社

广东省汕头市汕头大学内 邮编 515063

电话 0754-82903126

制 作 / ◆ 广州公元传播有限公司

印 刷 / 广州市一丰印刷有限公司

规 格 / 889mm × 1194mm 1/32开 7印张

版 次 / 2010年1月第2版第3次印刷

书 号 / 978-7-81120-154-3

定 价 / 38.00元

(咨询电话: 020-38865309)

前言 PREFACE



姿态万千、芳香醉人的花草，既可美化环境，又能陶冶情操。繁忙工作之余、茶余饭后之时，亲手栽种几盆花草，既可缓解紧张的生活压力，又可为生活增添情趣。养花已成为人们亲近自然、怡情养性时不可或缺的乐趣之一。

花卉除可用作家庭、办公室装饰及庭院栽培观赏外，还可供食用和药用，如木槿、桂花、槐花等做成的花粥，菊花、金银花、银杏等做成的茶饮，对人体健康有一定的保健作用；此外，一些花卉还能净化空气，如吊兰、芦荟等可吸收室内有毒气体，改善居家环境。

本书收录了365种盆栽花草，侧重室内栽培养护的品种，同时兼顾适合庭院及园林栽培的品种。科属按恩格勒系统进行划分，排序以科为单位，各科之间按英文字母排列，同科植物则按属的拉丁学名的第一个字母以英文字母排序。

本书除对收录花卉品种的中文名、别名、拉丁学名、形态特征、产地分布、习性等一一作出简要说明外，还着重介绍它们在栽培观赏、切花插花等方面的用途，同时配插了大量高清晰彩色图片，包括褪底主图、局部特写及原生态图等，使读者更全面地了解各种花卉的特征。

本书图文并茂，适合大专院校师生、园林工作者及花卉爱好者参考使用。

编著者
2008年1月

目录 CONTENT

爵床科 Acanthaceae	
红网纹草	10
白网纹草	10
嫣红蔓	11
金脉爵床	12
硬枝老鸦嘴	12
大花老鸦嘴	13
黑美人	13
铁线蕨科 Adiantaceae	
铁线蕨	14
番杏科 Aizoaceae	
生石花	14
苋科 Amaranthaceae	
大叶红草	15
鸡冠花	15
千日红	16
石蒜科 Amaryllidaceae	
雷神	16
六出花	17
君子兰	17
文殊兰	18
南美水仙	19
网球花	19
朱顶红	20
中国水仙	20
洋水仙	21
番荔枝科 Annonaceae	
鹰爪花	21
夹竹桃科 Apocynaceae	
软枝黄蝉	22
黄蝉	22
长春花	23
海芒果	24
狗牙花	25
飘香藤	25
夹竹桃	26
鸡蛋花	26
黄花夹竹桃	27
金香藤	27
蔓长春	28
天南星科 Araceae	
观音莲	28
海芋	29
红掌	29
火鹤花	30
花叶芋	30
花叶万年青	31
龟背竹	31
仙洞万年青	32
心叶蔓绿绒	32
芙蓉莲	33
绿萝	33
星点藤	34
白鹤芋	34
绿巨人	35
合果芋	36
绒叶合果芋	36
金钱树	37
五加科 Araliaceae	
澳洲鸭脚木	37
八角金盘	38
洋常春藤	38
常春藤	39

鹅掌柴	39	火龙果	57
南洋杉科Araucariaceae		层云	57
南洋杉	40	黄翁	58
萝藦科Asclepiadaceae		英冠玉	58
马利筋	40	仙人掌	59
爱之蔓	41	仙人指	59
气球果	41	蟹爪兰	60
球兰	42	桔梗科Campanulaceae	
夜来香	43	风铃草	60
铁角蕨科Aspleniaceae		桔梗	61
鸟巢蕨	43	美人蕉科Cannaceae	
凤仙花科Balsaminaceae		大花美人蕉	61
新几内亚凤仙	44	白花菜科Capparidaceae	
凤仙花	45	醉蝶花	62
非洲凤仙花	45	忍冬科Caprifoliaceae	
秋海棠科Begoniaceae		金银花	62
丽格海棠	46	石竹科Caryophyllaceae	
四季秋海棠	46	石竹	63
秋海棠	47	金粟兰科Chloranthacea	
球根秋海棠	47	珠兰	64
紫葳科Bignoniaceae		鸭跖草科Commelinaceae	
凌霄	48	斑叶水竹草	64
炮弹树	48	白雪姬	65
叉叶木	49	吊竹梅	65
紫芸藤	50	小蚌花	66
蒜香藤	50	菊科Compositae	
炮仗花	51	西洋蓍草	66
火焰木	51	藿香蓟	67
黄钟花	52	重瓣玛格丽特	68
硬骨凌霄	52	雏菊	68
木棉科Bombacaceae		金盏菊	69
木棉	53	菊花	70
美丽异木棉	53	瓜叶菊	70
发财树	54	蛇目菊	71
凤梨科Bromeliaceae		金鸡菊	71
姬凤梨	54	大丽花	72
圆锥擎天	55	紫椎花	73
莺哥凤梨	55	勋章菊	73
仙人掌科Cactaceae		非洲菊	74
金琥	56	紫鹅绒	74
昙花	56	向日葵	75

麦秆菊	76	银边翠	92
蓝目菊	76	虎刺梅	92
黑心菊	77	布纹球	93
桂圆菊	77	一品红	93
万寿菊	78	红背桂	94
孔雀草	78	琴叶珊瑚	95
南美蟛蜞菊	79	佛肚树	95
百日草	79	龙胆科Gentianaceae	
旋花科Convolvulaceae		紫芳草	96
月光花	80	洋桔梗	96
景天科Crassulaceae		牻牛儿苗科Geraniaceae	
玉树	80	天竺葵	97
石莲花	81	蚊净香草	97
趣蝶莲	81	苦苣苔科Gesneriaceae	
长寿花	82	毛萼口红花	98
鸡爪三七	82	美丽口红花	98
褐斑伽蓝	83	非洲紫罗兰	99
白菩提	83	大岩桐	99
十字花科Cruciferae		金缕梅科Hamamelidaceae	
紫罗兰	84	红继木	100
桫椤科Cyatheaceae		红花荷	100
笔筒树	84	鸢尾科Iridaceae	
苏铁科Cycadaceae		射干	101
苏铁	85	火星花	102
鳞秕苏铁	86	小苍兰	102
茅膏菜科Droseraceae		唐菖蒲	103
捕蝇草	86	长葶鸢尾	103
柿科Ebenaceae		花菖蒲	104
金弹子	87	黄菖蒲	104
杜英科Elaeocarpaceae		唇形科Labiatae	
尖叶杜英	87	彩叶草	105
杜鹃花科Ericaceae		齿叶薰衣草	106
西洋杜鹃	88	羽叶薰衣草	106
石楠杜鹃	88	薄荷	107
毛鹃	89	贝壳花	107
杜鹃花	90	蓝花鼠尾草	108
大戟科Euphorbiaceae		一串红	108
红尾铁苋	90	樟科Lauraceae	
红桑	91	兰屿肉桂	109
变叶木	91	豆科Leguminosae	
		海红豆	110

合欢	110	大花紫薇	133
蔓花生	111	细叶雪茄花	133
首冠藤	111	木兰科 Magnoliaceae	
朱樱花	112	白兰花	134
刺葵黄槐	112	紫花含笑	135
开心果	113	含笑	135
紫荆	113	荷花玉兰	136
蝶豆	114	紫玉兰	136
凤凰木	115	锦葵科 Malvaceae	
珊瑚刺桐	115	金铃花	137
鸡冠刺桐	116	蜀葵	137
刺桐	117	芙蓉葵	138
香豌豆	117	木芙蓉	138
含羞草	118	扶桑	139
禾雀花	118	木槿	140
中国无忧树	119	锦葵	141
紫藤	119	竹芋科 Marantaceae	
百合科 Liliaceae		孔雀竹芋	141
不夜城芦荟	120	苹果竹芋	142
库拉索芦荟	120	波浪竹芋	142
文竹	121	紫背竹芋	143
蜘蛛抱蛋	122	水竹芋	143
吊兰	122	野牡丹科 Melastomataceae	
朱蕉	123	宝莲花	144
也门铁	123	棟科 Meliaceae	
山海带	124	米兰	145
巴西铁	124	防己科 Menispermaceae	
千年木	125	金线吊乌龟	146
百合竹	125	桑科 Moraceae	
富贵竹	126	橡皮树	146
墨竹	126	琴叶榕	147
萱草	127	榕树	147
风信子	128	薜荔	148
火把莲	128	菩提树	148
百合花	129	桑	149
葡萄风信子	130	芭蕉科 Musaceae	
酒瓶兰	130	旅人蕉	150
虎尾兰	131	富红蝎尾蕉	150
郁金香	131	紫金牛科 Myrsinaceae	
马钱科 Loganiaceae		虎舌红	151
灰莉	132	朱砂根	152
千屈菜科 Lythraceae			
紫薇	132		

桃金娘科Myrtaceae	
红果仔	152
松红梅	153
洋蒲桃	153
猪笼草科Nepenthaceae	
猪笼草	154
紫茉莉科Nyctaginaceae	
叶子花	154
紫茉莉	155
睡莲科Nymphaeaceae	
荷花	156
萍蓬草	156
睡莲	157
木犀科Oleaceae	
迎春	157
茉莉花	158
桂花	159
紫丁香	159
柳叶菜科Onagraceae	
倒挂金钟	160
山桃草	160
美丽月见草	161
兰科Orchidaceae	
卡特兰	161
大花蕙兰	162
中国兰花	162
石斛兰	163
树兰	163
文心兰	164
兜兰	165
鹤顶兰	165
蝴蝶兰	166
拟蝶唇兰	166
万代兰	167
酢浆草科Oxalidaceae	
紫叶酢浆草	167
阳桃	168
棕榈科Palmae	
三药槟榔	169
短穗鱼尾葵	170
袖珍椰子	170
棕竹	171
罂粟科Papaveraceae	
荷包牡丹	171
花菱草	172
虞美人	172
松科Pinaceae	
雪松	173
胡椒科Piperaceae	
西瓜皮椒草	173
红皱椒草	174
圆叶椒草	174
豆瓣绿	175
荷叶椒草	175
斑叶垂枝椒草	176
海桐科Pittosporaceae	
海桐	176
白花丹科Plumbaginaceae	
蓝雪花	177
花荵科Polemoniaceae	
福禄考	177
蓼科Polygonacea	
何首乌	178
雨久花科Pontederiaceae	
梭鱼草	178
马齿苋科Porulacaceae	
太阳花	179
报春花科Primulaceae	
仙客来	179
欧洲报春	180
凤尾蕨科Pteridaceae	
银脉凤尾蕨	180
石榴科Punicaceae	
石榴	181
毛茛科Ranunculaceae	
耧斗菜	182
欧洲银莲花	182
大花翠雀	183
芍药	183
牡丹	184
花毛茛	184

蔷薇科Rosaceae	
桃花	185
梅花	186
棣棠	186
火棘	187
月季	187
鸡麻	188
硕苞蔷薇	188
黄刺玫	189
日本绣线菊	190
茜草科Rubiaceae	
梔子	190
白蟾	191
龙船花	191
六月雪	192
芸香科Rutaceae	
鲁贝拉茵芋	192
佛手	193
九里香	193
瓶子草科Sarraceniaceae	
瓶子草	194
三白草科Saururaceae	
鱼腥草	194
虎耳草科Saxifragaceae	
虎耳草	195
八仙花	195
玄参科Scrophulariaceae	
心叶假面花	196
金鱼草	196
蒲包花	197
吊钟柳	198
炮仗竹	198
茄科Solanaceae	
鸳鸯茉莉	199
观赏辣椒	199
黄瓶子花	200
紫瓶儿花	200
矮牵牛	201
金杯藤	201
梧桐科Sterculiaceae	
苹婆	202
山茶科Theaceae	
山茶	202
金花茶	203
瑞香科Thymelaeaceae	
金边瑞香	204
旱金莲科Tropaeolaceae	
旱金莲	204
伞形科Umbelliferae1	
香菇草	205
荨麻科Urticaceae	
冷水花	205
圆叶冷水花	206
马鞭草科Verbenaceae	
杜虹花	206
龙吐珠	207
赪桐	208
金叶假连翘	208
五色梅	209
美女樱	210
堇菜科Violaceae	
三色堇	210
葡萄科Vitaceae	
地锦	211
姜科Zingiberaceae	
红豆蔻	211
益智	212
瓷玫瑰	212
姜花	213
金姜花	213
笔画索引	214
拉丁学名索引	220
参考文献	223

科属：爵床科网纹草属

学名：*Fittonia verschaffeltii*

别名：费通花

红网纹草

形态：多年生常绿草本，株高10~20厘米。植株低矮，呈匍匐状。叶对生，卵圆形，红色叶脉纵横交替，形成网状。叶柄与茎上有茸毛，顶生穗状花序。花黄色。



红色叶脉纵横交替

习性：喜高温多湿和半阴环境，极不耐寒，冬季

需阳光充足，

但也怕强光

暴晒，夏季需适当遮光。

土壤以富含腐殖质的沙质壤土为佳。

生长适温为20℃~30℃。



应用：适合盆栽观赏，可摆放在宾馆、商厦、橱窗及办公室；或吊盆用于点缀居室，摆放案几或窗台。

分布：原产南美秘鲁。主要分布于热带雨林中。

科属：爵床科网纹草属

学名：*Fittonia verschaffeltii* var. *argyroneura*

别名：网格草

白网纹草

形态：多年生常绿草本，株高10~20厘米。

匍匐，叶对生，卵圆形，叶面密布白色网纹。叶柄、花梗、枝条均具绒毛。

习性：喜高温、多湿和半阴环境。不耐寒，忌强光，夏季不宜置于阳光充足的向阳处。土壤以富含腐殖质的沙质壤土为好。生长适温为20℃~30℃，夏季适当遮光。

应用：优良的室内阴生观叶植物，适合做小盆栽，常用于宾馆、商厦及居室书桌、案几或窗台装饰；也可用于吊挂装饰。



分布：原产南美秘鲁。主要分布于热带雨林中。

科属：爵床科枪刀药属

学名：*Hypoestes phyllostachya*

别名：红点草、溅红草



嫣红蔓

形态：株高可达60厘米，枝条伸长后呈半蔓性。叶对生，卵形或长卵形，叶全缘，叶面橄榄绿色，布满粉红色或白色斑点。小型穗状花序，淡紫色，花期春季。

习性：喜温暖、湿润和半阴环境，忌强烈日光直射，夏季栽培适当遮阴。适宜深厚肥沃、透水、富含腐殖质的土壤。生长适温为20℃~30℃。

应用：多用于盆栽欣赏，适合居家、办公室等装饰欣赏；也可用于园林绿地、庭院及花坛、花台及大型容器栽培。

叶面布满粉红色或白色斑点



分布：原产马达加斯加。我国引种栽培。

科属：爵床科黄脉爵床属

学名：*Sanchezia nobilis*

别名：黄脉爵床、金叶木

金脉爵床

形态：常绿灌木，株高0.3~1米。叶对生，卵圆形，叶脉具黄色条带，叶缘具细齿。花序顶生，花为管状，簇生于短花茎上，苞片红色。花期春季。

习性：喜温暖、湿润及半阴环境，也可耐强光，但不耐寒，低于5℃即会落叶。一般土壤均可生长良好。生长适温为22℃~30℃。

应用：色彩明艳，对比性强，南方多用于园林绿地及庭园，群植、片植或与植物配植均可；还可盆栽用于厅堂、会议室及办公室等。



分布：原产巴西、厄瓜多尔。我国南部至台湾省引入栽培。

科属：爵床科山牵牛属

学名：*Thunbergia erecta*

别名：立鹤花、直立山牵牛

硬枝老鸦嘴

形态：常绿灌木，株高1~2米，易分枝。叶对生，卵形至长卵形，叶近革质，先端渐尖，基部楔形至圆形，边缘具波状齿或不明显3裂。花单生于叶腋，花冠斜喇叭形，蓝紫色，喉管部为黄色。花期全年，以夏秋较盛。蒴果无毛，果柄长4厘米。

习性：喜高温高湿及阳光充足的环境，不耐寒，冬季不宜长期低于8℃。喜微酸性土壤，以肥沃、排水良好的沙质土壤为佳。

应用：花型奇特，适合公园、庭院丛植、片植，也可盆栽观赏。



分布：原产西非热带地区。我国各地引种栽培，以南方栽培为多。

科属: 爵床科山牵牛属

学名: *Thunbergia grandflora*

别名: 大邓伯花、山牵牛

大花老鸦嘴

形态: 木质大藤本, 株高可达7米以上。叶对生, 阔卵形, 基部心形, 先端渐尖, 两面粗糙、有毛, 叶缘有角或浅裂, 叶柄无翅。总状花序, 花大喇叭状, 腋生, 初花蓝色, 盛花浅蓝色, 末花近白。花期5~11月。

习性: 适应性强, 性喜高温多湿。以肥沃、透气、疏松、富含腐殖质的壤土或沙质土壤最佳。

应用: 花型奇特, 花期长, 可作为大型棚架的攀缘材料, 适合公园、小区、庭园等地的棚架应用。



分布: 原产我国广东、海南、福建等地。多生于山地灌丛中, 现我国南方栽培普遍。

科属: 爵床科

别名: 披散爵床、弹簧草

黑美人

形态: 多年生常绿草本, 丛生, 株高5~15厘米。叶对生, 暗黑色, 心形或广卵形, 微皱而卷曲。

习性: 喜温暖、湿润的环境条件, 喜光照充足, 较耐阴, 稍耐旱, 不耐寒, 应避免叶片因滞水隔夜而冻伤。对土壤要求不严, 以富含腐殖质、排水良好的沙质土壤为佳。生长适温为20℃~30℃。

应用: 多盆栽欣赏, 适合置于案头、茶几等处, 南方也可于庭院或作地被植物栽培。



分布: 原产热带非洲。我国广东、台湾栽培较多。

科属: 铁线蕨科铁线蕨属	学名: <i>Adiantum capillus-veneris</i>	别名: 铁丝草、铁线草
--------------	--------------------------------------	-------------

铁线蕨

形态: 多年生常绿草本蕨类, 株高15~40厘米。叶基生, 叶柄细长、坚硬如铁丝, 柄长5~20厘米, 粗约1毫米。叶片卵状三角形, 2~3回羽状细裂, 小羽片近圆形或扇形, 深绿色, 有钝圆的粗缺刻。孢子囊群圆形, 生于叶背面。

习性: 喜温暖、湿润和半阴环境, 不耐寒, 忌阳光直射。喜疏松、肥沃和含石灰质的沙质壤土。

应用: ①适合小盆栽培和点缀山石盆景。小

盆栽可置于案头、茶几上; 较大盆栽可用于布置背阴房间的窗台、过道或客厅。②叶片是良好的切叶材料及干花材料。③全草入药, 用于治疗人畜疾病。



叶片卵状三角形

分布: 原产热带美洲和亚热带地区, 多生于石灰质或钙质土地区。

科属: 番杏科生石花属	学名: <i>Lithops spp.</i>	别名: 石头花、曲玉
-------------	-------------------------	------------

生石花

形态: 多年生常绿多肉多浆植物。茎短, 二片叶肥厚对生, 密接成缝状, 形成半圆形或倒圆锥形的球体, 灰绿色, 成熟时自其顶部裂缝分成两个短而扁平或膨大的裂片。花从裂缝中央抽生, 花大, 单独座生, 黄色, 午后开放, 花期4~6月。

习性: 喜温暖、干燥和阳光充足环境, 怕低温, 耐高温, 忌强光, 怕水湿和霜冻。要求种植于排水良好的沙质壤土中。生长适温为20℃~25℃。

应用: 外形和色泽酷似彩色卵石, 品种繁多, 色彩丰富, 是世界著名的小型多浆植物, 常用于盆栽供室内观赏或布置专类园。

分布: 原产非洲南部。广泛分布于南非干燥地区, 多生于高原的茂盛草丛中。



二片叶肥厚对生

科属：苋科莲子草属

biginosa 别名：红苋草、红龙草

大叶红草

形态：多年生草本，株高30~50厘米。叶对生，长椭圆形，茎叶紫红色，冬季开花，花乳白色，小球形。头状花序腋生，无柄。

习性：生性强健，喜温暖，耐湿、耐阴，耐寒，也耐热、耐旱、耐瘠薄、耐修剪。对土壤无特殊要求，一般土质均能生长。

应用：适合花坛、花台栽培，也可于庭园栽植，或在林缘下做背景材料，也适合小区、公路两侧绿化。

叶对生，长椭圆形



分布：原产热带和亚热带地区。现为园艺种，我国南方栽培较多。

科属：苋科青葙属

学名：*Celosia cristata*

别名：鸡冠苋、鸡冠、鸡冠头、红鸡冠、鸡公花

鸡冠花


形态：一年生草本，株高60~90厘米，全株无毛。茎直立，粗壮。单叶互生；长椭圆形至卵状披针形，先端渐尖，全缘。肉穗状花序顶生或腋生，呈扁平鸡冠状，花被膜质，花色深红。

肉穗状花序
也有黄、白及复色变种。花果期7~9月。

习性：喜光，喜充足和湿热气候条件，不耐寒，忌涝。喜肥沃、疏松排水良好的沙质土壤。生长适温为20℃~30℃。

应用：①可用于布置花坛和花境，也可盆栽及作切花材料，也是庭园的

优良草花。②花及种子供药用，为收敛剂，有止血、凉血、止泻功能。



分布：原产印度。现广布于温暖地区。

科属: 莎科千日红属	学名: <i>Gomphrena globosa</i>	别名: 千日粉火球花、杨梅花、火球花、千年红
------------	------------------------------	------------------------

千日红

形态: 一年生草本, 株高30~60厘米。茎直立, 全株密被白色柔毛。单叶对生, 长椭圆形或矩圆状倒卵形, 全缘。头状花序着生于顶端, 球形, 花小, 两性, 呈深红、紫红、粉红或白色。花期7~9月。

习性: 性强健, 喜温热干燥的气候。喜疏松肥沃、排水良好的土壤。对环境适合性强, 生长适温为20°C~30°C。

应用: ①多用于花坛、花台、花境栽培欣赏, 或植于林缘下作背景材料, 也适合作切花和干花。②花序入药, 有止咳定喘、平肝明目功效, 主治支气管哮喘, 急、慢性支气管炎, 百日咳等。



单叶对生



紫红色花

分布: 原产美洲热带地区。现我国南北各地广泛栽培。

科属: 石蒜科龙舌兰属	学名: <i>Agave potatorum</i> var. <i>verschaffeltii</i>	别名: 棱叶龙舌兰
-------------	---	-----------

雷神

形态: 多年生常绿多肉植物。叶倒卵状匙形, 基生莲座状, 灰白色或淡青色。叶端急尖, 有长的尖刺, 叶缘有浅波状齿。齿端具尖刺, 红褐色或黄褐色。花黄绿色。本种属龙舌兰中的小型种, 常见栽培的还有雷神锦。



分布: 原产墨西哥。

习性: 喜温暖干燥和阳光充足环境, 适应性强, 较耐寒, 略耐阴, 怕水涝。以排水良好、肥沃的沙壤土为好。生长适温为20°C~28°C。

应用: 常用于盆栽观赏, 适合家庭阳台、花架摆设; 也常用来布置多肉植物专类园。