

懸袖便方
二



懸袖便方二卷目錄

第八脾胃門

脾胃

噎膈

嘔吐

脹滿

痞悶

積塊

第九瘧疾門

瘧疾

第十滯下門

愚神便方

痢疾

洩瀉

第十一痰飲門

痰飲

第十二咳嗽門

咳嗽

痰喘

第十三積熱門

積熱

消渴

第十四卷之門

眼目

鼻

飛耳堂纂

第十五口齒門

口齒

舌

咽喉

牙疳

骨哽

停積

而成痰飲

懸袖便方二卷目錄終

懸袖便方卷之二

飛景堂纂

第八脾胃門

脾胃者倉廩之官也主藏水穀盛則
傳化而生血氣虛則停積而成痰飲
經曰飲食自倍腸胃乃傷善調攝者
當怒不得強食饑甚不可多食晨不



愚神便方
宜醉昏不宜飽如此則陰陽和而噎
膈之疾不生矣

方治

治脾胃不和飲食少進上燥下寒服
熱藥不得者

人參 白朮 各二錢 橘紅 一

錢五分 半夏 湯泡七次一錢 枳

殼 麩炒七分 甘草 炙五分

右咬咀水一鍾半薑三片棗

枚煎七分食遠溫服

治食積腹痛不拘男女大小并宜

白朮 炒 茯苓 半夏 薑汁炒

各一兩 萊菔子 炒三錢 山楂肉

五錢 陳皮 五錢

共爲末另以白朮熬膏丸如梧
桐子大每服四十丸食遠白米
湯送下

砂朮丸

治男婦脾胃虛弱飲食

不消化

腿片白朮

不油者米泔水浸切

片晒乾土炒淨一觔

山查肉

蒸

晒乾一觔

砂仁

去壳炒四兩

右爲細末每服二三錢食遠米

湯調服或陳米麴打糊爲丸如

菴荳大每服八十九食遠米湯

送下

啟脾丸

治脾胃虛弱飲食少進

白朮

米泔水浸土炒二兩

陳皮

一兩 枳實 麩炒一兩 麥芽 炒一

兩 砂仁 炒七錢

其爲細末神麴麵打糊爲丸如

梧桐子大每服六十九食遠白

滾湯送下

白朮散 治脾胃虛弱不思飲食

白朮 土炒一兩 茯苓 白者七錢

陳皮 五錢 蓮肉 太心七錢 甘草

炙三錢 白蔻仁 四錢

共爲細末每服二錢白米湯調

服

絡索米 治脾胃虛弱不思飲食

食入不消化病與噎塞相似

清明日取柳枝一大握熬成綠



湯用北方小米不拘多少煮撈
乾飯置於簍中以白麴洒上拌
均勻如法晒乾用布袋乘之懸
於通風處聽用用時先燒滾水
隨意多少候湯沸時以米投下
住火其米俱浮起看無米心則
熟可食之不可久煮久則成糊

矣每日食之甚効

治噎膈

紅花

端午日採頭次者無灰酒

拌濕瓦上焙乾

血竭

瓜子樣者

爲佳各等分

右爲細末用無灰酒一小鍾入

藥在內調勻重湯頓熱徐徐嚥



懸神便方

五

下 初服二分次日或三四分

三日服五分

治噎膈食不能下

黑鉛

硫黃

黑豆

三味各等分用犁頭鐵用過光

白者燒紅先將鉛黃二味一併

入紅鐵上鎔化後陸續下黑豆

煨成灰研細每服五分好醎燒
酒送下 忌煎炒油膩鹽醬一

百日

治噎膈神効

猫胞衣用新瓦炭火炙枯研爲
細末每服一二分好酒送下服
後噙竹筒一個睡恐傷牙及嗽

粒米不下者五六服立愈

又用辟驚骨三四付以新瓦合定

上下用火焙焦存性爲末每服

三錢糯米漿酒送下終身忌

燒酒此骨在猪首腦窩中形如

雲頭小兒佩之能辟驚

治噎食不下

用乾人糞一荆筭用桑柴火

燒煨存性取出放在缸內以井

花水浸之勤攪動待一時方用

綿紙數重濾過去渣清水約有

二桶入鐵鍋內慢火熬至二碗

又入碗內放鍋內重湯頓乾刮

下收貯每用五釐好酒化下漸

