

世醫通變要法

六



夫下血者由飽食過度房室勞傷坐臥當風多食生冷或啖炙轉飲酒行房或風邪冷氣進入臟腑因重乘之便血流散積熱壅遏血滲腸間故大便下血又肛門射血如線者虫蛀也治法風則散之熱則清之寒則溫之虛則補之各隨宜用之可也大抵脉沉者易治浮者難醫也

主方經驗 治腸風下血不止其脉沉細者易也

側栢葉

生地黃

當歸

川芎

各二兩

枳殼

荊芥穗

槐花

各一兩

升麻

五錢

白芍藥



白芷 各七錢 甘草 五錢

右咀每服五錢薑三片烏梅一箇水煎服

又方經驗 治臟腑熱毒腸風下血

烏梅 燒存性 二兩 香白芷 不見火 三兩

百藥煎 燒存性 一兩半

右各爲末糊爲圓如梧桐子大每服七十圓空心米飲下

又方經驗 治腸癖下血作派有力而遠射四散如筋腹中大痛及陽明氣中濕所作

生地黃 熟地黃 牡丹皮 各二兩

甘草

生

黃耆

各一兩

當歸

蒼朮

各一兩

秦艽

肉桂

陳皮

各一兩

升麻

五錢

白芍藥

枳殼

川芎

各一兩半

荊芥

白芷

各七錢

甘草

熟五錢

右咀每服五錢水煎空心服之

加減地榆圓

治諸痔腸風下血脫肛

槐角

地榆

各二兩

防風

枳殼

當歸

各二兩

黃芩

四兩

右爲末酒糊爲圓如梧桐子大每服五十圓米飲

送下

加減二活散

方見傷寒門

專治風熱流入大腸下

血不止因酒毒加黃連用巴豆同炒去巴豆不用
一法經驗 治下血不止及酒毒下血用香白芷焙
乾研細每服三錢空心好酒下

又法治下血不止用檢漆根濕紙包燒灰每服二錢
茶酒調下

一法經驗樗皮散

治諸般大便下血及痔漏用樗

根白皮俗名臭椿皮去黑皮用白皮三兩河清好
酒一碗或二碗煎濃去藥用酒空心服以乾肉壓

之

痔瘡一百二十一

夫庠者飲食不節醉飽無時多食肥膩久坐濕地色慾過度遂使陰陽不和關格壅塞風寒下冲及成痔疾於肛門邊或左或右或外或內狀如鼠竅或如櫻桃大者如核桃蓮花之狀或膿或血或痒或痛或軟硬或覺腫久而不治則成漏矣大抵脉滑而大者易治懸絕者難也

主方經驗 治五種痔漏

右懸猪蹄

二兩

黃牛角腮

胃皮

一枚

同上燒存性

防風

各二兩半

貫仲

槐花子

各一兩半

鱉甲

醋炙一兩

枳殼

鷄冠花

槐花

各一兩炒

黃耆

雷丸

黃連

各二兩

白芷

當歸

玄參

各八錢

麝香

五分另研

油髮灰

三錢

右爲末糊圓如梧桐子大每服七十圓空心米飲

送下如年高并氣弱者不宜服

又方經驗礬臘圓

治諸痔及癰疽便毒惡瘡久漏

不愈用白明礬四兩生爲末黃臘二兩溶化衆手

如梧桐子大每服三十圓空心清湯送下

又方經驗 治氣發痔

荊芥

槐花

枳殼

香附米

各二兩

甘草

紫蘇葉

各一兩

川芎

陳皮

各一兩

木香

三錢

右咀每服三錢薑三片棗一枚水煎服或為末作

圓子空心服亦可

又方經驗 治痔下血不止

當歸

川芎

黃耆

神麴

地榆

各二兩

槐花

一兩半

阿膠

木賊

荊芥

各一兩

油髮灰 一錢

右爲末煉蜜爲圓口

子大每服五十圓空

米飲送下

加減清涼散 治諸痔熱證大便閉結

當歸 赤芍藥 甘草 各一兩

大黃 枳殼 生地黃 各一兩半

荊芥 防風 升麻 各七錢

右咀每服五錢水煎空心服如氣不順加蘇子

加減樗皮散 方見腸風門 治痔下血不上

經驗 洗諸痔腫痛用家韭菜生泡湯薰洗立

効

脫肛一百二十二

夫脫肛者肺與大腸爲表裏故肺臟蘊熱則肛門結肺臟虛則肛門脫出此確論也又婦人產後三月用力過度及小兒久痢後臟寒皆肛門脫出治法早須溫肺臟補腸胃久自能收矣脉小而緩者易愈也主方經驗 治大人小兒婦人肛門脫出並治之

香附米

二兩半

荊芥穗

一兩半

升麻

炒一兩

右爲末每服三錢水煎十數沸服并淋洗一方加

宿砂



又方經驗 治肛門脫出用五倍子爲末洗後付於
肛門上納之

加減瓜蒌圓 治諸痔及脫肛腫痛或下膿血及腸
風血下

瓜蒌

二斤燒存性

枳實

二兩

附子

胡桃

油大者十箇燒存性

右爲末醋糊爲圓如梧桐子大每服三十圓溫酒
送下有熱除附子倍加核桃

一法薰洗用五倍子朴硝荆芥三味煎湯乘熱薰容
手得洗洗後前藥末納歸再洗



加減蝟皮散 治肛門脫出洞泄

蝟皮一箇

磁石一兩

桂心一兩半

右爲末每服三錢空心滾白水送下如女子脫肛
鰲頭一箇燒灰研細湯下

一法經驗 治脫肛用槐花槐角各等分炒黃爲末
用羊血蘸藥末食之

眼目總論

嘗謂世之最貴者莫過於人人之最貴者莫過於眼
眼者乃五臟六腑之精華一身之貴寶故患眼者或
風熱所感或憂怒過傷或痰火上升或陰虛上攻或



生內外瘡翳其狀多端難以槩論眼有七十二種八般風眼四十八樣外瘡十六般內瘡今人偏作風熱一途而治若遇眼疾遂以寒涼之藥利其內點洗寒涼治其外皆所不効且如北人患眼最多因皆冒風沙夜臥熱坑二氣交蒸邪熱不分人之虛實而中之也若果係實熱赤腫而痛者脉浮而數當行寒涼利劑倘若陰虛火動槩投寒涼之藥損其陰血遂致失明遇此者不可不辯也凡欲治眼先須補腎後乃治肝肝是腎苗腎是脾主收肝則神鬼安定養腎則精鬼流通鬼既以安和眼目自然明亮譬如樹果惟

在於根根壯則枝葉茂盛根損則花果無實故黑暗
屬腎腎枯則腦虛淚竅通肝肝虛則冷淚淚出於白
仁仁屬肺肺熱則赤眼通精上脰下胞屬脾脾有風
則弩肉赤腫眼有五輪外應五行心肝脾肺腎屬五
行金木水火土五輪者風血水肉氣夫人好食丹藥
或夜思量苦事費用精神腹中受熱或好食五辛貪
淫愛慾或精枯不睡視物黑花如此並是損眼之根
源日深月久便成大患少年不可恣意隨心酒後放
情貪淫縱慾惟快一時之樂不顧有將來之患遂致
氣血虛損眼不耐視治療之法益肝補脾滋其腎水

水濟則神光有餘病可脫矣

眼目風熱一百二十三

主方經驗 治風熱上攻暴作赤目腫痛隱澁難開
脉弦而數是也

生地黃

菊花

各二兩

荊芥

川芎

防風

薄荷

各一兩

當歸

羌活

各一兩半

大黃

甘草

炙各一兩

梔子

一兩

右爲末每服三錢食後茶清調下

經驗 治心經積熱邪氣上衝脉浮而弦眼澁

睛痛或赤目迎風多淚怕日羞明

白木

麻黃

當歸 各二兩

荊芥

白芍藥

各一兩半

甘草

大黃

薄荷

各五錢

右為末每服三錢薑湯調下

一法經驗 治眼紅赤腫痛用此藥洗之其痛腫即止

黃連

一兩半

玄明粉

石膏

各一兩

白芍藥

三錢

荊芥穗

五錢

銅青

二錢

右用清水濃煎澄清常溫洗神効

外瘡一百二十四

主方經驗 治男女積熱上攻翳膜遍睛羞澀多淚
肝受風邪所乘并暴赤腫痛脉滑

牛膝

去根三兩

石斛

去根

枳殼

杏仁

去皮尖

防風

各二兩

生地黄

四兩

熟地黄

半觔

右為末煉蜜為圓如梧桐子大每服六十圓半飢
時或鹽湯或溫酒送下

加減菊花散

治肝經不足內受風熱上攻視物不

明常見黑花迎風多淚隱澁難開或生瘳翳婦人

