

Aus Wissen und Wissenschaft

—32—

HILFSBÜCH FÜR DIE KINDERPRAXIS

學藝彙刊 (32)

兒科醫典

熊俊著



中華學藝社出版 商務印書館發行

HILFSBÜCH FÜR DIE KINDERPRAXIS

兒

江苏工业学院图书馆

熊

悛

著

藏书章



版 1933 商務印書館發行

一九五四年查訖

中華民國二十年五月初版
中華民國二十四年四月國難後第二版

學藝彙刊
兒科醫典一冊

(67276)

每冊定價大洋叁角28
外埠酌加運費匯費

著者

中華學藝社熊

俊

發行人

王雲五
上海河南路

印刷所

商務印書館
上海河南路

發行所

商務印書館
上海及各埠

版 翻
權 印
所 必
有 究

序

兒科之藥品用量須視其年齡而異，極宜慎重不可冒失。其他如身體發育之標準，乳兒熱量之計算等等，皆於臨床上有重大之關係，差之毫厘，謬以千里，惟其項目繁多，數字複雜，初學者之感困難固矣。即臨床醫家亦常有不勝記憶之嘆。蓋兒科醫籍，浩如烟海，有非可以倉卒瀏覽者。著者有鑒於此，嘗參考東西名著，將兒科有關係之各種表格數字集為一篇，原備為個人參考，乃友人等力惠公諸同好，明知孤陋難免貽笑大方，特以為學貴互相研究，用是率爾付梓，尚望醫界明達，不吝指教，則著者之幸也。

民國十九年八月

著者識

凡 例

本書表中所用略語如下：

浸	...	...	...	...	...	浸劑
煎	...	...	...	...	...	煎劑
散	...	...	...	...	...	散劑
塗	...	...	...	...	...	塗劑
溶	...	...	...	...	...	溶劑 或 合劑
注	...	...	...	...	...	皮下 或 肌肉 內 注射
膠	...	...	...	...	...	膠囊
Tl	...	...	...	...	...	茶匙 (約 5 g)
El	...	...	...	...	...	食匙 (約 15 g)
gtt	...	...	...	...	...	滴 20 滴 = 1 g
Pil	...	...	...	...	...	丸
!	...	...	...	...	...	極量之記號
—	...	...	...	...	...	禁忌或不用之記號

目次

各年齡之藥量表 1

強	心	劑	...	...	...	...	...	...	1
利	尿	劑	...	...	...	...	...	...	3
尿	防	腐 劑	...	...	...	...	...	...	4
解	熱	劑	...	...	...	...	...	...	5
催	眠	劑	...	...	...	...	...	...	6
鎮	靜	劑	...	...	...	...	...	...	7
鎮	痛	劑	...	...	...	...	...	...	8
止	血	劑	...	...	...	...	...	...	9
瀉	下	劑	...	...	...	...	...	...	10
止	瀉	劑	...	...	...	...	...	...	11
驅	虫	劑	...	...	...	...	...	...	12
祛	痰	及 鎮 咳 劑	...	...	...	...	...	...	13
催	吐	劑	...	...	...	...	...	...	14
鎮	吐	劑	...	...	...	...	...	...	15
健	胃	消 化 劑	...	...	...	...	...	...	16
強	壯	補 血 劑	...	...	...	...	...	...	17
變	質	劑	...	...	...	...	...	...	19
結	核	劑	...	...	...	...	...	...	20
驅	敵	劑	...	...	...	...	...	...	21
臟	器	製 劑	...	...	...	...	...	...	22
治	療	血 清 及 Vaccin	...	...	...	...	...	...	23

小兒藥量表	...	...	...	...	...	...	24
Gowbius 氏式	...	...	...	...	...	...	24
Young 氏式	...	...	...	...	...	...	24
水藥適量表	...	...	...	...	...	...	24
主要外用藥一覽表	...	...	...	...	...	...	25
體格發育表	...	...	...	...	...	...	30
運動及精神機能發育表	...	...	...	...	...	...	31
健康乳兒之自然榮養概要表	...	...	...	...	...	...	32
健康乳兒之人工榮養概要表	...	...	...	...	...	...	32
乳兒食餌之熱量表	...	...	...	...	...	...	33
體重 1 kg 一日之必需熱量表	...	...	...	...	...	...	34
體重 1 kg 一日之必需水量表	...	...	...	...	...	...	34
脈搏及呼吸數表	...	...	...	...	...	...	35
尿量表	...	...	...	...	...	...	35
血壓表	...	...	...	...	...	...	36
睡眠時間表	...	...	...	...	...	...	36
正常血液表	...	...	...	...	...	...	37
正常腦脊髓液表	...	...	...	...	...	...	37
主要急性傳染病之潛伏期及隔離期間表	...	...	...	...	...	...	38
附錄 1 處方用蠟丁文略字解	...	...	...	...	...	...	39
附錄 2 極量表	...	...	...	...	...	...	41
附錄 3 度量衡比較表	...	...	...	...	...	...	47

兒科醫典

各年齡之藥量表

表中分量爲一日量但附有*者爲一回量

單位用 gramm

強 心 劑		1歲 以內	1-2 歲	3-4 歲	5 歲	8 歲	14歲	大 人 (一回量)
Folia digitalis	浸	0.03- 0.05	0.06	0.08	0.1	0.15	0.2	1.0!(一日)
Digalen	注, 溶	0.2	0.3- 0.4	0.5- 0.6	0.8- 1.0	1.0	1.5	1.6
Digitamin	溶	全上						
Tinctura digitalis	溶	1 gtt	2 gtt	5 gtt	7 gtt	0.5	0.8	5.0!(一日)
Adrenalin hydro- chloricum (0.1%)	*注	0.2cc	0.3	0.4	...	...	0.5	0.5-1.0
Caffein-Natrio-ben- zoicum	散, 溶	0.06	0.1	0.2	0.25	0.3	0.5	1.0!
全上 10-20%	注	0.1cc	...	...	...	...	1.0	0.5-1.0
Pituitrin	*注	0.2	...	...	...	...	0.5	0.5-1.0
Strophantin	*注	0.05cc	0.07	0.1	0.15	0.2	0.25	0.5!
Virum rubrum	溶	—	3.0	5.0	7.0	10.0	10.0	5-15
Oleum camphoratum	*注	(10- 25%)	0.5	...	...	...	1.0	0.5-1.0cc
Camphora depurata	散	0.06	0.1	0.2	0.25	0.3	0.5	0.5

【注 意】 I Digitalis 有蓄積作用數日內全量不得超過 Folia digitalis 3.0.

II 注射 Adrenalin 時宜嚴防注入血管.

處方例

(1)	Pulvis foliae digitalis	...	...	...	0.1
	Camphorae depuratae	...	...	...	0.25
	Sacchari lactici	...	...	...	1.0

S. auf 3 mal z. n. (6 Tage lang) (5 歲)

(2)	Inf. foliae digitalis	...	...	...	50.0
	Natr. bicarbonici	...	...	...	1.5
	Tinctura amara	...	...	...	0.8
	Sirup. simplicis	...	...	...	6.0

S. auf 3 mal z. n. (14 歲)

(3)	Digalen	...	...	...	...	0.2
	Sirup. simplicis	...	...	...	...	3.0
	Aqua destillatae	...	...	...	...	15.0

S. auf 3 mal z. n. (一個月)

(4)	Vini rubri	...	...	...	...	2.0
	Acid. hydrochlor. (dil.)	...	...	...	...	0.2
	Sirup. simplicis	...	...	...	...	7.0
	Aqua destillatae	...	...	...	...	30.0

S. auf 3 mal z. n. (2 歲)

利尿劑		1 歲 以內	1-2 歲	2-4 歲	5 歲	8 歲	14 歲	大人 (一回量)
Diuretin	溶, 散	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0!
Caffeinum-Natrio- benzoicum	溶, 散 *注	0.06 (10-20%)	0.1 0.1	0.2 ...	0.25 ...	0.3 ...	0.5 1.0cc	1.0! 0.5-1.0cc
Liquor Kalii acetici	溶	1.5	...	...	...	...	8.0cc	5.0
Calomel	散	0.02	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5
Salyrgan	*注	} 0.1cc	0.2cc	0.25cc	0.4cc	0.5cc	0.8cc	1-2cc
Novasurol	*注							
Kalium citricum	溶	} 0.6	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	
Natrium citricum	溶							
Na. bicarbonicum	溶, 散	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.0
Folia digitalis	浸	0.03- 0.05	0.06	0.08	0.1	0.15	0.2	1.0!
Digalen	注, 溶	0.2	0.3- 0.4	0.5- 0.6	0.8- 1.0	1.0	1.5	1.0

處方例

(1) Liquor Kalii acetici 2.0
 Aquae menthae ... 1.0
 Sirup. simpl. ... 5.0
 Aqua dest. ... 30.0

S. Täglich 3 mal z. n. (2 歲)

(2) Liq. Kalii acetici... 8.0
 Diuretini ... 0.7
 Digalen... 1.5
 Sirup. simpl. ... 8.0
 Aqua dest. ... 50.0

S. Täglich 3 mal z. n. (14 歲)

(3) Diuretini ... 0.1
 Nat. bicarbonici ... 0.3
 Aqua menthae ... 0.8
 Aqua destillatae ... 15.0

S. Täglich 3 mal z. n.

尿 防 腐 劑		1 歲 以內	1-2 歲	3-4 歲	5 歲	8 歲	14 歲	大 人 (一回量)
Urotropin	溶, 散	0.1- 0.15	0.2	0.25	0.4	0.5	0.7	0.5
Folia uvae ursi	煎	0.5	...	...	...	...	5.0	...
Salol	散	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.5	1.0
Boroverdin	溶, 散	—	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	2.0
Oleum santalum	膠	—	—	—	0.3	0.4	0.6	0.5

處 方 例

- (1) Urotropin 0.2
 Salol... ... 0.4
 Biofermin 0.3

S. Täglich 3 mal z. n. (2 歲)

- (2) Decoct foliae uvae ursi (5.0) 50.0
 Urotropini 0.7
 Sirup. simpl.... ... 7.0

S. Täglich 3 mal z. n. (14 歲)

- (3) Boroverdin 0.6
 Nat. salicylici 0.6
 Sirup. simpl.... ... 7.0
 Aqua dest. 50.0

S. Täglich 3 mal z. n. (5 歲)

解 熱 劑		1 歲 以下	1-2 歲	3-4 歲	5 歲	8 歲	14 歲	大 人 (一回量)
Aspirin	*散	0.03	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5-1.0
Pyramidon	*溶, 散	0.005 -0.01	0.02	0.05	0.07	0.1	0.2	0.1-0.2
Natrium salicylicum	溶, 散	—	0.4	0.5	0.7	1.0	1.5	1.0
Optochin basicum	散	0.03	0.05	0.08	0.1	0.2	0.3	0.6
Optochin hydro- chloricum (Remijin)	散	0.03	0.60	0.1	0.15	0.3	0.4	0.1-0.5
Chininum hydro- chloricum (Malaria 時有 2 倍)	散	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.3-0.5
Euchininum	散	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.3-0.5
Bagnon	*注	0.1cc	...	...	...	...	1.5	2.0cc

【注意】 I 乳兒通常不用解熱劑。

II Optochin 不能連用 2 日以上。

處 方 例

- (1) Chinini hydrochlorici 0.4
 Sirupi simplicis... .. 5.0
 Aqua destillatae 30.0

S. Täglich 3 mal z. n. (Malaria 2 歲)

- (2) Optochini basici 0.3
 Sacchari lactis 0.5

S. Täglich 3 mal z. n. (Pneumonie 14 歲)

- (3) Aspirin 1.0
 Pyramidon 0.2
 Biofermin 0.3

S. Täglich 3 mal z. n. (Augina 14 歲)

催眠劑		1歲 以內	1-2 歲	3-4 歲	5歲	8歲	14歲	大人 (一回量)
Veronal	*溶, 散	0.03	0.05	0.06	0.08	0.1	0.15	0.5!
Veronal(注腸用二倍量)								
Luminal	*散	0.02	0.03	0.05	0.06	0.1	0.15	0.1-0.3
Luminalnatrium	*溶, 散	0.02	0.03	0.05	0.06	0.1	0.15	0.1-0.3
Adalin	*散	0.05	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5-1.0
Sulfonal	*散	—	—	0.1	0.15	0.2	0.25	1.0!
Bromural	*散	0.05	0.06	0.08	0.15	0.2	0.25	0.5
Calmotin	*散	全上						
Chlor. hydratum	溶	0.5	0.1	0.2	0.25	0.3	0.5- 0.7	2.0!

處方例

(1) Veronal ... 0.05
 Sacch. lact. ... 0.5

S. auf 1 mal z. n. (2 歲)

(2) Adalin ... 0.3
 Phenacetin ... 0.5

D. tal. dos. No. I. S. vor d. Schlafengehen z. n. (5 歲)

(3) Chlorali hydrati ... 2.0
 Gummi arabici ... q. s.
 Aqua ... 50.0

Zur Klystier (Krämpfe) (1 歲)

鎮 靜 劑		1 歲 以內	1-2 歲	3-4 歲	5 歲	8 歲	14 歲	大 人 (一回量)
Kalium bromatum	溶	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.0
Natrium bromatum	溶	全上						
Bromural	*散	0.05	0.06	0.08	0.15	0.2	0.25	0.5
Magnesium sulfuri- cum (25%)	*注	每 體	重 1	kg 用	0.25g			
Chloralum hydra- tum (注腸用二倍量)	溶	0.05	0.1	0.2	0.25	0.3	0.5- 0.7	2.0!
Aspirin	*散	0.03	0.07	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5-1.0
Calmotin	*散	0.05	0.06	0.08	0.15	0.2	0.25	0.5

處 方 例

(1)	Kalii bromati	...	...	...	...	1.5
	Calcii lactici ...	...	...	...	...	1.0
	Tinct. amar....	...	...	...	...	0.8
	Sirup. simpl....	...	...	...	...	7.0
	Aqua destillatae	...	...	...	...	50.0

S. Täglich 3 mal z. n. (12 歲)

(2)	Bromural	...	...	...	...	0.05
	Aspirin	...	...	...	...	0.03
	Biofermin	...	...	...	...	0.2

S. Täglich 3 mal z. n. (8 個 月)

鎮 痛 劑		1 歲 以內	1-2 歲	3-4 歲	5 歲	8 歲	14歲	大 人 (一回量)
Morphin. hydro- chloricum	*注	—	—	—	0.001	0.003	0.005	0.03
Pantopon	*注	—	—	—	0.002	0.006	0.01	0.06
Codeinum phos- phoricum	溶, 散	0.001	0.005	0.01	0.015	0.02	0.05	0.1!
Tinctura opii	溶, 散	—	2-3 gtt	4 gtt	5 gtt	8 gtt	10-15 gtt	1.5!
Tinct. scopoliae	溶	—	2 gtt	3 gtt	5 gtt	8 gtt	10 gtt	1.0!
Extr. scopoliae	溶, 散	0.001- 0.003	0.005	0.01	0.015	0.03	0.05	0.05!
Aspirin	*散, 溶	0.03	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5-1.0
Pyramidon	*散, 溶	0.005	0.02	0.05	0.07	0.1	0.2	0.3!
Migränin	*散	—	—	—	0.15	0.2	0.25	1.0!

【注 意】 乳兒不宜用鴉片製劑。

處 方 例

- (1) Morphin. hydrochlor. ... 0.002
 Ext. scopoliae ... 0.015
 Sacch. lact. ... q. s.

M. f. Pulv. No. III

S. Täglich 3 mal z. n. (5 歲)

- (2) Codein. phosphorici ... 0.001
 Aspirin ... 0.06
 Pyramidon ... 0.01
 Sacch. lact. ... q. s.

M. f. Pulv. No. III

S. Täglich 3 mal z. n. (1 歲)

- (3) Tinct. opii... 3 gtt
 Sirup. simpl. ... 5.0
 Aqua ... 15.0

S. Täglich 3 mal z. n. (3 歲)

止 血 劑		1 歲 以內	1-2 歲	3-4 歲	5 歲	8 歲	14 歲	大 人 (一回量)
Gelatina alba 10%	溶	10.0...	30.0	30.0...	50.0	50.0...	80.0	30
全上	*注	5.0- 10.0	10.0	20.0	20.0	...	30.0	40.0cc
Calcium lacticum	溶, 散	0.2- 0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0-2.0
Calcium chloratum	溶	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	2.0(一日)
Natrium chloratum (5-10%)	*注	1.0cc	...	...	...	...	2.0cc	
Clauden	溶	1.0	...	...	...	...	4.0	5.0(一日)
Coagulen	溶	全上						
3% Coagulen	*注	1.5cc	...	...	...	...	20.0cc	50.0cc
Serum (Menschen od. Pferd)	*注	2.0cc	...	...	...	...	10.0cc	30.0cc

處 方 例

(1)	Gelatina albae (10%)	...	...	...	50.0
	Natrii chlorati	...	...	...	5.0
	Calcii lactici	...	...	...	2.0
	Aqua menthae	...	...	...	5.0
	Sirup. simpl.	...	...	...	8.0

S. Täglich 3 mal z. n. (10 歲)

(2)	Clauden	...	...	...	...	3.0
	Sirup. simpl.	...	...	...	...	5.0
	Aqua	...	...	...	...	15.0

S. Täglich 3 mal z. n. (3 歲)

瀉 下 劑		1歲 以內	1-2 歲	3-4 歲	5歲	8歲	14歲	大 人 (一回量)
Istizin	*散	—	—	0.15	...	...	0.2	0.3-0.5
Magnesium sul- furicum	溶	—	—	3.0	4.0	5.0	10.0	10.0-30.0
Laxatol	*散	0.03	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5
Calomel	*散	0.01- 0.03	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5
Pulvis infantum	散	0.3	0.5	0.6	1.0	1.5	3.0	1 Tl
Magnesia usta	散	0.1- 0.2	0.3	0.4	0.6	1.0	2.0	1.0-3.0
Oleum ricini	*溶	5	7	8	10	15	15-20	15-30

【注意】 I 小兒不宜用峻下劑。

II 服 Istizin 後尿變黃色或赤色然無害。

處 方 例

(1) Istizin 0.15
 Natrii bicarbonici 0.3
 Elaeosacchari menthae 0.3

M. f. Pulv. No. III

S. Täglich 3 mal z. n.

(單純性便秘 5歲)

(2) Olei ricini 6.0
 Sirupi simplicis 3.0
 Sirupi auranti corticis 3.0
 Aqua dest. 20.0

S. Täglich 3 mal z. n.

(中毒性消化不良 2歲)