

經史證類備急本草

二十二



經史證類備急本草卷第十四

木部下品總九十九種

一十八種神農本經白

七種名醫別錄

墨字

二十一種唐本先附

注云
唐附

一十七種今附

皆醫家嘗用者
效注云今附

九種新補

一種新定

二十六種陳藏器 餘

凡墨蓋子已下並唐謹微續證類

巴豆

蜀本草

目葉
續注

皇本草

毛本草
續注

田光



訶梨勒唐附

柳葉實子葉實子
汁附

棟實根附皮根附皮

椿木葉

樗木葉唐附
樗白皮續注

芥草

雷丸

無食子唐附

黃藥根今附

槲若唐附

白楊皮唐附

桄榔子今附

蘇方木唐附

櫟樹皮華山櫟
續注

桐葉

花附反
油續注

胡椒唐附

釣樟根皮樟皮
續注

千金藤今附

南燭枝葉今附

無患子今附

梓白皮

葉附

橡實唐附櫟樹
皮續注

石楠實附

木天蓼唐附
續注

黃環

益智子今附

溲疏音疏
音疏

棗李

椰子今附
漿附

枳根音音
音知
唐附

小天蓼今附

小蘖唐附

莢蒾

唐附

紫荆木

今附

紫貢檀

烏臼木

唐附子續注

南藤

今附

鹽麴子

樹白皮根皮皮今附葉上麴子續注

杉材

接骨木

夏附

楓柳皮

唐附

赤入

側絞切附

木

唐附

樺木皮

今附

榧實

礫荆

舊附子續注

木鼈子

今附

礫實根

欒華

蔓椒

赤檉木

今附

突厥白

今附

賣子木

唐附

婆羅得

今附

甘露藤

新補

大空

唐附

椿莢

定新

水楊葉

唐附

楊櫟木

唐附

欒子

新補

楠木

柘木

新補

柞木皮

新補

黃櫨

新補

櫻櫚子

皮附
新補

木槿

新補

詫花

本在草部今移

栟櫚木

楸木皮

沒藥梨

柯樹皮

敗扇

楤根

檵木灰

榔桐皮

竹肉

桃竹筍

颺子桐

馬瘧木

木細辛

百家筋

檻木皮

刀鞘

芙蓉樹

丹桂木皮

結殼

杓

車家雞棲木

檀

石荊


木梨蘆

二十六種陳藏器餘

爪蘆

戎州巴豆

諸木有毒



四

巴豆味辛溫生溫熟寒有大毒

傷寒溫瘡寒熱破癰

結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩練五藏六腑開通閉

塞利水穀道去惡肉陰陽氣血惡症邪物殺蟲魚療女子

月閨爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺斑猫毒可練餌之
益血脉令人色好變化與鬼神通

生巴郡川

谷八月採陰乾用之去心皮

芫花爲之使惡裏草畏大黃黃連
藜蘆同屬云出巴郡似大豆最

能瀉人新者佳用之皆去心皮乃秤又熬令黃黑別擣如膏乃和丸散爾道
方亦有練餌法服之乃言神仙人吞一枚便欲死而鼠食之三年重三十斤

物性乃有相耐如此爾唐本草云樹高丈餘葉似櫻桃葉頭微赤十二月葉
漸凋至四月落尽五月葉漸生七月花八月結實九月成十月採其子三枚

共帶各有殼裹出眉州嘉州者良今本草藏器本草云巴豆主癥癬痘瘡瘍
滿腹內積聚冷氣血塊宿食不消瘀飲吐水取青黑大者每日空腹服一枚
去熱勿令白膜破乃作兩片并四邊不得有損缺吞之以飲壓令下少間腹
內熱如火刺出惡物雖刺不虛若久服亦不痢白膜破者棄之生南方樹大
如圍極高不啻二丈也

國醫錄第謹按藥性論云巴豆使中其毒用黃連汁
大豆汁解之忌畫筆細鹽或冷水得少良殺斑貓蛇虺毒能主破心腹積聚結

氣治十種水腫癰癥大腹能落胎日華子云通宣一切病泄壅滯除風補勞
建脾開胃消痰破血排膿消腫毒殺腹藏蟲治惡瘡息肉及疥癩丁腫凡合

丸散炒不如去心膜煮
五度換水各煮一沸

圖經曰

巴豆出巴郡川谷今嘉眉戎州皆有之木高一二丈葉如櫻桃而

葉落盡新葉齊生即花發成穗微黃色五六月結實作房生青至八月熟而
黃白類白豆蔻漸漸自落即收之一房有三瓣一瓣有實一粒一房共實三
粒也戎州出者殼上有縱文隱起如線一道至兩三
道彼土人呼爲金線巴豆最爲上等它處亦稀有

雷公云

凡使巴之與豆及剛子須在子細認勿誤用殺人巴顆小緊實色
黃豆即顆有三稜色黑若剛子顆小似棗核兩頭尖巴與豆即用

剛子勿使凡修事巴豆敲碎以麻油并酒等可煮巴豆
了研膏後用每修事一兩以酒麻油各七合盡爲度

聖惠方

治中風口喎巴豆

豆七枚去皮爛研咽左手心右手心仍以咽
水一盞安向手心須臾即便正洗去藥并頻抽掣中指

又方

治牙疼用巴豆一粒

煨至黃熟去殼用蒜一瓣切一頭作蓋剗去中心可安
巴豆在內以蓋子合之用綿裹隨患處左右塞耳中

外臺秘要

文仲方主大人小孩

唯腹大動搖水聲皮膚黑名曰水蠱巴豆九十枚去心皮熬令黃擣丸如小豆大水下一丸以利爲度勿飲酒
水七升煮取三升以帛染拭之

又方

治寒癬宿食久飲不消大便秘巴豆仁一升清酒五升煮三日三夜研令

大熟金酒微火煎之丸如豆大
每服一丸水下欲吐者服二丸

又方

治喉痺已死有餘氣者巴豆千金
去皮針線穿鑿入喉中牽出

翼治小兒身腫并手足腫兼癰毒巴豆五十枚去皮
心以水二升煎取一升用綿於湯中隨手拭之

經驗方

鄭獮侍御傳治氣痢

巴豆一兩去皮心熬細研取熟猪肝和丸空心米飲
下量力加減服之牛肝尤佳如食素人以蒸餅丸服

又方

治耳卒聾巴豆一粒蠟裹針刺

令通透用塞耳中斯須痛定微痒忍之待極痒不可忍便撼動箭鏃即拔之

立出夏侯鄆云初在潤州得方箭鏃出後速以生肌膏傳之說者云兼治瘡瘍得方後至洪州旅舍主人妻患背瘡呻吟難遽用此方試之愈勝

金治喉閉纏喉風巴豆兩粒紙緊角可通得入鼻用刀金子切斷兩頭殼子將針穿作孔子內鼻中立即差

十全方

治疥瘡巴豆十粒火

炮過黃色去皮膜右順手研如麪入酥少許臘粉少許同研勻瓜破以竹簽子點藥不得落眼裏及外腎上如煎刻著外腎以黃丹塗甚妙

初

虞方治藥毒祕効巴豆去皮不出油馬牙消等分合研成膏冷水化一彈子許服差

賈相公


進過牛經牛有瘻瘍動頭打勃者以巴豆

兩箇去皮擣末生油二
兩淡漿水半升灌之差

蜀椒



施州崖椒



蜀椒 味辛性溫大熱有毒

氣熱逆溫中逐骨節皮膚

死脫

味辛性溫大熱除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不

出心腹留飲宿食腸澼下利洩精女子字乳餘疾散風

邪瘕結水腫疽鬼疰蠱毒殺蟲魚毒

服之頭不白

輕身

開腠理通血脉堅齒髮調關節耐寒暑可作

膏藥多食令人乏氣口閉者殺人一名巴椒一名蕷

唐音

荳

音生武都川谷及巴郡八月採實陰乾杏人爲之使畏欬

冬閼隱居云出蜀

都北部人家種之皮肉厚腹裏白氣味濃江陽晉原及建平間亦有而細赤辛而不香力勢不如巴都巴椒有毒不可服而此爲一名恐不爾又有秦椒黑色在中品中凡用椒皆火微熬之令汗出謂爲汗椒令有勢力椒目今別入藥用不得相雜

唐本草云椒目宋苦寒無毒主水腹脹滿利小便今椒出

金州西城者最善臣禹貢云蜀椒者大禹之別名也郭云今椒

樹叢生實大者名爲櫟詩唐風云椒聊且陸機云椒樹似茱萸有針刺葉堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以爲香今成臯諸山間有椒謂之竹葉椒其樹亦如蜀椒少毒熱不中合藥也可著飲食中文用蒸雞豚最佳香

東海諸島上亦有椒樹枝葉皆相似子長不圓甚香其味似橘皮島上獐鹿食此椒葉其肉自然作椒橘香
藥性論云蜀椒使畏雄黃又名陸撥有小毒能治冷風頑頭風下淚腰脚不遂虛損留結破血下諸石水能治嗽主腹內冷而痛除齒痛
本草綱目云蜀椒使治十二種水氣味苦辛有小毒主和巴豆菖蒲松脂以蠟溶爲筒子內耳中抽腎氣虛耳中如風水鳴或如打鍾磬之聲卒暴聾一日一易若神驗
日華子云漢椒破癥結開胃治天行時氣溫疾產後宿血治心腹氣壯陽療陰汗暖腰膝縮小便椒目主膀胱急又
本草綱目云椒葉熱無毒治貢神伏梁氣反內外腎鈎并霍亂轉筋和艾及葱研以醋湯拌署並得種之高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而滑可煮飲食其辛香江淮及北土皆有之莖實都相類但不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓皮紫赤色八月採實焙乾比椒耳服食方單服椒紅補下宜用蜀椒也韋苗獨行方治諸瘡中風者生蜀椒一外取少麪合溲裹椒勿令漏氣分作兩裹於塘灰火中燒熟及熱出之刺頭作孔當瘡上置著使椒氣射入瘡中冷則易之須臾瘡中出水及遍體出汗即差施州又有一種崖椒彼土人四季採皮入藥云味辛性熱無毒主肺氣上喘兼效嗽并野薑從末酒服錢匕甚効忌鹽下又有蔓椒條云生雲中川谷及丘家間採莖根煮釀酒陶隱居云俗呼爲櫻似椒薰竈小不香耳今亦無復分別或云即金椒是也薑子出閩中江東其木似櫻莖間有刺子辛辣如椒主遊蠱飛尸及腹冷南人淹藏以作果品或以寄遠吳越春秋云越之禮然則薰之相贈尚矣

以甘蜜丸檳榔與黨報吳增封

雷公云

一名南椒。凡使須去目及閉口者不用其椒子。先須酒拌令濕蒸從巳至午放冷，蜜蓋除向火四畔無氣後取出使入甕器中盛勿令傷。

食療

傷損成瘡中風以麪裹作餛飩灰中炮之使熟斷開口封其

瘡上冷易熱者三

度易之亦治傷

損成弓風又去久患口瘡去閉口者以

水洗之以麵拌煮作粥空心吞之三五匙飯壓之再服差又椒溫辛有毒主

風邪腹痛痺寒溫中去齒痛堅齒髮明目止嘔逆減癥生毛髮出汗下氣通

神去老益血利五藏治生產後諸疾下乳汁久服令人氣喘促十月勿食及

閉口者大忌子細黑
者是秦椒白色也

聖惠方

治因熱取涼睡有蛇入口中挽不出用刀破蛇尾內生椒三二粒裹著須臾即出

外臺秘要

治瘡腫生椒末麵金土末之以大醋和傳之

千金方

有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜疼悶不

得眠取生椒擇之令淨以布帛裹著九囊火厚半寸須臾熱氣大通日再易之取消差

肘後方

治金瘡中風蜀椒量瘡口大小用麵作餛

飴糖火中炮今熟開一孔當瘡上掩之引風出可作數枚以差替換之妙

又方

治心腹俱痛以布裹椒薄注上火熨令椒汗出良

斗門方

治腹內虛冷久服駐顏用

月勿食椒食之損氣傷心令人多忘

又方

治心腹俱痛以布裹椒薄注上火熨令椒汗出良

斗門方

治腹內虛冷久服駐顏用

生椒擇去不拆者除其黑子用四十粒以漿水浸經一宿盡令口合空心

新汲水下去積年冷暖藏腑久服則能駐顏黑髮明目令人思飲食妙

治好食生茶用椒末不限多少深師方


治手足皴裂椒四合水煮之

金力

治好食生茶用椒末不限多少深師方

深師方

去滓瀆之半食傾出令燥須



猪牙皂莢

援神契

椒薑蘆蘆
補益聰明

史復浸乾塗羊
豬臘腦極妙
紅丸及人年五十已上患瀉用椒二兩醋二升煑醋盡
慢火焙乾爲末甕器貯之每服二錢匕酒或米飲下之

姚和衆

治小兒水瀉妳疳椒一分去眼爲
末酥調之少少傳腦上口可三度

譚氏

治小兒水瀉椒

又方

治漆瘡漢椒湯洗之即愈

皂莢



皇矣味辛溫有小毒主風癰死肌邪氣風頭瘡

疗腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落

明日益精可爲沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如
猪牙者良九月十月採莢陰乾

柏實爲之使惡麥門冬畏空青人參苦參

雲今處處有

長尺二者良俗人見其皆有蟲孔而未嘗見蟲形皆言不可近令人惡病殊不爾其蟲狀如草菜上青蟲莢微欲黑伸出所以難見爾但取青莢生者看

自知之

云此物有三種猪牙皂莢最下其形曲戾薄惡全無滋潤洗

垢不去其尺二寸者麤大長虛而無潤若長六七十寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好

云皂莢使主破堅癥腹中痛能墮胎又

曰將皂莢於酒中取盡其精於火內煎之成膏塗帛貼一切腫毒兼能止疼

痛陳藏器云皂莢作浴湯去風瘡疥癬接葉去衣垢沫髮長頑生江南澤

畔如皂莢高一二尺

云皂莢通關節除頭風消痰殺勞蟲治骨癆開

胃及中風口噤入藥

去皮子以酥炙用

圖經曰

皂莢出雍州川谷及魯鄒縣今所在有之以懷孟州者爲勝不極

有高大者此有三種本經云形如猪牙者良陶注云長尺二者良

唐注云長六十圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好今醫家作踝風氣丸煎多用長皂莢治齒及取積藥多用猪牙皂莢所用雖殊大抵性味不相遠九