

傷寒論綱目
十二

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以

三日無裏證故微發汗也

少陰病得之二三日以上心中煩不得臥黃連阿膠

湯主之

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附

子湯主之

少陰病身體疼手足寒骨節痛脉沈者附子湯主之

少陰病下利便膿血者桃花湯主之

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止

傷寒論

三九

便膿血者桃花湯主之

少陰病下利便膿血者可刺

少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

少陰病下利咽痛胸滿心煩者豬膚湯主之

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差與桔梗湯

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主

之

少陰病咽中痛半夏散及湯主之

病下利白通湯主之

少陰病下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者白通加猪膽汁湯服湯脉暴出者死微續者生

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沈重疼痛自下利者此爲有水氣其人或欬或小便利或下利或嘔者真武湯主之

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒其人面色赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者通脉四逆湯主之



少陰病四逆、其人或欬、或悸、或小便不利、或腹中痛、或泄利下重者、四逆散主之。

少陰病下利六七日、欬而嘔渴、心煩不得眠者、猪苓湯主之。

少陰病得之二三日、口燥咽乾者、急下之、宜大承氣湯。

少陰病自利清水、色純青、心下必痛、口乾燥者、急下之、宜大承氣湯。

少陰病六七日、腹脹不大便者、急下之、宜大承氣湯。

少陰病脉沈者急溫之宜四逆湯
少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始
得之手足寒脉弦遲者此胸中實不可下也當吐之
若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之宜四逆湯
少陰病下利脉微瀼嘔而汗出必數更衣反少者當
溫其上灸之不問下之與不與也

辨厥陰病脉證

厥陰之爲病消渴氣上撞心心中疼熱饑而不飲食
食則吐衄下之利不止

厥陰中風脉微浮爲欲愈不浮爲未愈

厥陰病欲解時從丑至卯上

厥陰病渴欲飲水者少少與之愈

諸四逆厥者不可下之虛家亦然

傷寒先厥後發熱而利者必自止見厥復利

傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者當不能

食今反能食者恐爲除中食以索餅不發熱者知胃

氣尚在必愈恐暴熱來出而復去也後三日脉之其

熱續在者期之旦日夜半愈所以然者本發熱六日

厥反九日復發熱三日并前六日亦爲九日與厥相應故期之旦日夜半愈後三日脉之而脉數其熱不罷者此爲熱氣有餘必發癰膿也

傷寒脉遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脉遲爲寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除中必死
傷寒先厥後發熱下利必自止而反汗多咽中痛者其喉爲痺發熱無汗而利必自止若不止必便膿血便膿血者其喉不痺

傷寒一二日至四五日厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷爛赤

傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈厥終不過五日以熱五日故知自愈

凡厥者陰陽氣不相順接便爲厥厥者手足逆冷者是也是也

傷寒脉微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此爲藏厥非飧厥也飧厥者其人當吐飧今病者靜



而復時煩者此爲藏寒。䟽上入其膈故煩。須臾復止得食而嘔。又煩者。䟽聞食臭。出其入當自吐。䟽。䟽厥者。烏梅丸主之。又主久利。

䟽音爲與嘔同

傷寒熱少。厥微。指頭寒。默默不欲食。煩躁數日。小便利。色白者。此熱除也。欲得食。其病爲愈。若厥而嘔。胸脅煩滿者。其後必便血。病者手足厥冷。言我不結胸。小腹滿。按之痛者。此冷結在膀胱關元也。傷寒發熱四日。厥反三日。復熱四日。厥少。熱多者。其

病當愈四日至七日熱不除者必便膿血

傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病爲進寒多熱

少陽氣退故爲進也

傷寒六七日脉微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者

死

傷寒發熱下利厥逆躁不得臥者死

傷寒發熱下利至甚厥不止者死

與前同

傷寒六七日不利便發熱而利其人汗出不止者死

有陰無陽故也



傷寒五六日不結胸腹濡脉虚腹厥者不可下此爲
亡血下之死

發熱而厥七日下利者爲難治止者爲難治
傷寒脉促手足厥者可灸之而後下

傷寒脉滑而厥者裏有熱也白虎湯主之

手足厥寒脉細欲絕者當歸四逆湯主之若其人內

有久寒者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯

大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒

者四逆湯主之

傷寒論

四

大汗若大下利而厥冷者四逆湯主之

病人手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中心下滿而煩
饑不能食者病在胸中當須吐之宜瓜蒂散

傷寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯却
治其厥不爾水漬入胃必作利也

傷寒六七日大下後寸脉沈而遲手足厥逆下部脉
不至喉咽不利唾膿血泄利不止者爲難治麻黃升
麻湯主之

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趣少腹者此欲自利

也

傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入
口卽吐乾薑黃芩黃連人參湯主之

下利有微熱而渴脉弱者今自愈

下利脉數有微熱汗出今自愈設復緊爲未解

下利手足厥冷無脉者灸之不溫若脉不還反微喘

者死少陰負趺陽者爲順也

下利寸脉反浮數尺中自濇者必圉膿血

下利清穀不可攻表汗出必脹滿

下利脉沈弦者下重也脉大者爲未止脉微弱數者爲欲自止雖發熱不死

下利脉沈而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

下利脉數而渴者今自愈設不差必圉膿血以有熱故也

下利後脉絕手足厥冷晬時脉還手足溫者生脉不

還者死

晬音歲



傷寒下利日十餘行脉反實者死

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四逆湯主之

熱利下重者白頭翁湯主之

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏

宜四逆湯攻表宜桂枝湯

下利欲飲水者以有熱故也白頭翁湯主之

下利譫語者有燥屎也宜小承氣湯

下利後更煩按之心下濡者爲虛煩也宜梔子豉湯

嘔家有癰膿者不可治嘔膿盡自愈

嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之

乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之

嘔而發熱者小柴胡湯主之

傷寒大吐大下之極虛復極汗者其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得嘔所以然者胃中寒冷故也傷寒嘔而腹滿視其前後知何部不利利之卽愈

辨霍亂病脉證

問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利是名霍亂