


《数学通报》组织专家编写

# 数学高考研究与复习

(文科)



中央民族学院出版社

(京)新登字 184 号

责任编辑: 秦 天

顾	问	曹才翰		
主	编	明知白		
副	主 编	刘庆生		
其他编著者		贺信淳	蒋佩锦	李松文
		储瑞年	张 环	陈家骏
		王人伟	薛文叙	

数学高考研究与复习(文科)

主 编 明知白

副主编 刘庆生

\*

中央民族学院出版社出版

(北京西郊白石桥路 27 号)

(邮政编码: 100081)

全国各地新华书店经销

石家庄方正计算机技术开发部激光照排

遵化人民印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 9.75 字数 260 千字

1993 年 9 月第 1 版 1993 年 9 月第 1 次印刷

印数: 8000 册

ISBN 7-81001-358-O/G·131

定价: 5.60 元

## 前 言

本书由数学教育专家、命题专家、对高考及高考复习有深入研究和丰富教学经验的特级、高级教师经多次讨论、研究并取得共识后编写的。书中对国家教委考试中心制定的《数学科考试说明》深层次的释析是指导高中数学总复习时“方向性”与“层次性”的把握上较权威性的论述。

本书按“考试说明”分十一章，在每一章的开始都综述了本章的考试内容、考试要求、在高考中的位置及知识点的个数。每章按内容又分若干节，每一节依“考试说明”列出若干释析性的条目，对每一个观点配以若干典型例题，对例题进行了分析、评述，这是作者丰富经验的结晶；在每一节和每章的后边配有若干练习题和习题。在全书的后边配备了五套综合练习题，其中两套还给出了考查的目标和评分标准，供命题者和读者参考。

本书是教研员、高中数学教师及高三学生的研究、教学和复习用书。

编 者

1993年7月 北京

# 高考数学科考试目标

考试目标即考试对知识、能力的审查和测验的总要求，也是教育目标在考试过程中的体现。考试目标包括学科评价的总目标和各部分的目标。而各部分的目标只有落实到具体内容才能成为行为化和可操作的目标。所以《数学科考试说明》将数学科的知识内容划分为相对独立、自成系统的知识点，并提出了对各知识点的具体要求，有利于命题人员更准确地掌握考试要求，提高试卷内容的效度，同时也使考生、命题人员对内容要求有一致的理解，避免复习、考试中的盲目性和随意性。

关于普通高考数学科考试的总目标，可以分为考试内容要求和考试能力层次要求两个方面。

## 1. 考试内容要求

**基础知识：**即中学数学课程所涉及的概念、法则、性质、公式、公理、定理等。因为数学是有严密逻辑体系的知识系统，各部分内容有机联系组成一个整体结构，因此对基础知识的考查不仅要考查对知识的记忆和再认识，还应注意重在理解基础上的应用，及各部分知识间联系和关系。

**基本技能：**数学智力活动的方式或巩固了的自动化的动作，按照一定的程序与步骤进行运算、画图、推理的技能。

**基本思想和方法：**数学是一门具有方法论意义的学科，其中很多思想方法对考生今后的学习和发展有重要意义。数学思想包括数形结合的思想，函数与方程的思想，逻辑划分（分类）讨论的思想和等价转化的思想。数学方法包括待定系数法、换元法、数学归纳法、反证法、配方法等基本方法。在普通高考中，应注意测试那些在数学学习和研究中具有普遍意义的通性通法，而不应过分强调那些特殊的技巧。

**数学能力：**包括运算、逻辑思维、空间想象

及分析和解决问题的能力。

**运算能力：**在理解运算算理的基础上，根据法则进行运算的能力，根据题目条件寻求简捷、合理的运算途径的能力。

**逻辑思维能力：**对于给出的有关条件进行观察、比较、分析、综合、抽象和概括的能力。运用归纳、演绎和类比的方法进行推理的能力。

**空间想象能力：**由简单的实物想象出空间图形，由较复杂的图形分解出简单的、基本的图形，在基本的图形中找出基本元素及相互关系的能力，以及根据条件画出图形的能力。

**分析和解决问题的能力：**应用已有的知识和方法，分析一些新的情境的特点，找出和已知内容的联系，重新组织若干已知的规则，形成新的高级规则，尝试解决新的问题。解决的问题包括数学本身的问题和实际问题。

数学由于其逻辑的严密性、结论的确定性和应用的广泛性的特点，在培养学生能力过程中发挥重要作用，被称为锻炼思维的“体操”，数学教育的目的不单单是让学生学习和掌握一些数学知识，也不是把每个人都培养成数学家，而是把数学作为材料和工具，通过数学的学习和训练，在知识和方法的应用中提高综合能力和基本素质。因此数学科考试应力图发挥学科特点，测试考生的潜在能力。

## 2. 考试的能力层次要求

数学能力是在考生的数学活动中体现出来的，是一种特殊能力，因此与基础知识、基本技能和基本方法紧密地联系在一起，不同类型的考试对数学能力的要求是不同的。数学学科能力有较强的学科特点。应用认知心理学对学习水平的分类，对教学大纲所列内容提出了4个层次的不同要求，以解释不同能力层次的数学能力与数学基础知识、技能的关系。4个层次由低到高顺序排列，且高一级层次要求包含低一

级层次要求。4个层次分别为：

**了解：**知道知识内容，能说出这一知识是什么，能够在有关的问题中识别。

**理解：**能说出概念和规律并知道它们是怎样得出的，各概念和规律间的联系和区别，能直接运用。

**掌握：**在理解的基础上能对所列知识变形、推断，并能运用这些知识解题。

**灵活运用和综合运用：**能把所列知识综合

运用并解答较为复杂的数学问题。

上面划分的能力层次是以达到中学数学教学目标所需要的心理发展过程为依据的，通过这种划分和界定，建立了课程考试目标体系，使考试的目标和标准逐级具体化，据此设计的试卷和编制的试题，可有效地控制、提高试卷的信度和效度，有效地预测考生的知识、能力水平。

# 目 录

高考数学科考试目标.....	1	习题七 .....	86
第一章 幂函数、指数函数和对数函数 .....	1	答案或提示 .....	87
习题一 .....	12	第八章 直线和平面 .....	88
答案或提示 .....	13	习题八 .....	95
第二章 三角函数的图象和性质 .....	15	答案或提示 .....	96
习题二 .....	26	第九章 多面体和旋转体 .....	99
答案或提示 .....	27	习题九.....	108
第三章 两角和与差的三角函数 .....	30	答案或提示.....	109
习题三 .....	42	第十章 直线.....	111
答案或提示 .....	42	习题十.....	120
第四章 不等式 .....	43	答案或提示.....	120
习题四 .....	52	第十一章 圆锥曲线.....	122
答案或提示 .....	53	习题十一.....	134
第五章 数列、极限、数学归纳法 .....	55	答案或提示.....	135
习题五 .....	65	综合练习(一).....	137
答案或提示 .....	66	综合练习(二).....	139
第六章 复数 .....	68	综合练习(三).....	140
习题六 .....	77	综合练习(四).....	142
答案或提示 .....	79	综合练习(五).....	144
第七章 排列、组合、二项式定理 .....	81	答案.....	146

## 第一章 幂函数、指数函数和对数函数

本章的主要内容有集合的有关概念与运算;函数的概念与性质;反函数的概念与图象;幂函数、指数函数、对数函数的定义、图象和性质;指数方程和对数方程.以上共含有13个知识点.

“函数”是高中数学重要的一章,它的内容丰富,所占教学的课时较多.运用函数知识分析与解决其他数学问题也是十分重要的,因此它是学好高中数学的基础之一.此外,函数思想是解决数学问题的重要数学思想之一,它的应用广泛,贯穿于整个高中数学中.基于上述三方面的原因,“函数”在高考试题中占有重要的地位,所占比例要高于课时中的比例.其中集合,函数三要素,函数图象,函数性质,反函数,二次函数,幂函数,指数函数和对数函数,指数方程和对数方程等在高考试题中是经常出现的.

### 【考试内容】

集合.子集、交集、并集、补集.

映射.函数(函数的记号、定义域、值域).

幂函数.函数的单调性.函数的奇偶性.

反函数.互为反函数的函数图象间的关系.

指数函数.对数函数.换底公式.简单的指数方程和对数方程.

### 【考试要求】

(1) 理解集合、子集、交集、并集、补集的概念.了解空集和全集的意义,了解属于、包含、相等关系的意义,能掌握有关的术语和符号,能正确地表示一些较简单的集合.

(2) 了解映射的概念,在此基础上理解函数及其有关的概念,掌握互为反函数的函数图象间的关系.

(3) 理解函数的单调性和奇偶性的概念,并能判断一些简单函数的单调性和奇偶性,能利用函数的奇偶性与图象的对称性的关系描绘函数图象.

(4) 掌握幂函数、指数函数、对数函数的概

念及其图象和性质,并会解简单的指数方程和对数方程.

### § 1—1 集合

在高考中,集合几乎是每年必考的内容之一.一般地说,以两种方式进行考查.一是考查集合本身的知识,二是考查集合语言与集合思想的运用.后者如函数的定义域,方程与不等式的解集,排列组合问题,解析几何中的曲线间的相交问题,等等.这也就是考查把集合作为工具在其他数学问题中的运用.

本节主要讨论上述第一类问题,也涉及一些第二类问题.后者将主要分散在后续的章节之中.

一、用列举法或描述法给出集合,考查

1. 空集与全集的概念(如例2);

2. 元素与集合之间、集合与集合之间的关系(如例3、例4);

3. 集合的交、并、补运算(如例1、例5),这是考查的重点.

二、不给出集合中的元素,只给出若干个抽象的集合及其某些关系,运用文氏图解决有关的问题(如例6).

三、计算集合中子集的个数,这涉及到组合问题(如例7).

上面三方面的考查,一般多以选择题\*的形式出现,多数属于容易题(难度为0.7以上),少数属于中等题(难度为0.4—0.7).

例1 已知全集  $I = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ,  $A = \{3, 4, 5\}$ ,  $B = \{1, 3, 6\}$ , 那么集合  $\{2, 7, 8\}$  是 ( ).

(A)  $A \cup B$  (B)  $A \cap B$

\* 在目前的高考试题中,选择题都是“四选一”型的,即代号为A、B、C、D的四个结论中,只有一个是正确的.本书中的选择题,也都是这种类型的,以后不再说明.

(C)  $\bar{A} \cup \bar{B}$  (D)  $\bar{A} \cap \bar{B}$

(1986年全国高考文科试题,难度0.90\*)

分析:由已知,有  $A \cup B = \{1, 3, 4, 5, 6\}$ ,  
 $A \cap B = \{3\}$ ,  $\bar{A} \cup \bar{B} = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ,  
 $\bar{A} \cap \bar{B} = \{2, 7, 8\}$ ,

因此,应该选择 D.

例2 如果  $I = \{a, b, c, d, e\}$ ,  $M = \{a, c, d\}$ ,  $N = \{b, d, e\}$ , 其中  $I$  是全集, 那么  $\bar{M} \cap \bar{N}$  等于( ).

(A)  $\emptyset$  (B)  $\{d\}$   
(C)  $\{a, c\}$  (D)  $\{b, e\}$

(1989年全国高考试题,文科难度0.97)

分析:显然,应该选择 A.

例3 设集合  $M = \{x | x \leq 2\sqrt{3}\}$ , 又  $a = \sqrt{11}$ , 那么( ).

(A)  $a \subset M$  (B)  $a \in M$   
(C)  $\{a\} \in M$  (D)  $\{a\} \subset M$

分析:由于  $\sqrt{11} < 2\sqrt{3}$ , 所以应该选择 D.

例4 集合  $M = \{x | x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}\}$ ,

$N = \{x | x = \frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$ , 则( ).

(A)  $M = N$  (B)  $M \supset N$   
(C)  $M \subset N$  (D)  $M \cap N = \emptyset$

(1993年全国新高考试题)

分析:分别令  $k = -1, 0, 1, 2, 3, \dots$ , 得

$M = \{\dots, -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, \dots\}$ ,

$N = \{\dots, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \pi, \frac{5\pi}{4}, \dots\}$ .

不难看出,  $M \subset N$ , 因此选择 C.

事实上,  $M$  中的元素是由首项为  $\frac{\pi}{4}$ , 公差分别为  $\frac{\pi}{2}$  与  $-\frac{\pi}{2}$  的两串等差数列所组成, 而  $N$  中的元素是由首项为  $\frac{\pi}{2}$ , 公差分别为  $\frac{\pi}{4}$  与  $-\frac{\pi}{4}$  的两串等差数列所组成. 由此也能得出  $M \subset N$ .

例5 设全集为实数集  $R$ ,  $f(x) = \sin x$ ,  $g(x) = \cos x$ .  $M = \{x | f(x) \neq 0\}$ ,  $N = \{x | g(x) \neq 0\}$ , 那么集合  $\{x | f(x)g(x) = 0\}$  等于( ).

(A)  $\bar{M} \cap \bar{N}$  (B)  $\bar{M} \cup \bar{N}$

(C)  $M \cup N$  (D)  $\bar{M} \cup \bar{N}$

(1991年全国高考理科试题,难度0.66)

分析:由已知,有

$\bar{M} = \{x | f(x) = 0\}$ ,  $\bar{N} = \{x | g(x) = 0\}$ .

因此  $\bar{M} \cup \bar{N} = \{x | f(x)g(x) = 0\}$ , 应该选择 D.

例6 设  $S, T$  是两个非空集合, 且  $S \not\subseteq T$ ,  $T \not\subseteq S$ , 令  $X = S \cap T$ , 那么  $S \cup X$  等于( ).

(A)  $X$  (B)  $T$  (C)  $\emptyset$  (D)  $S$

(1987年全国高考试题,文科难度为0.72)

分析:  $\because X = S \cap T \subseteq S$ ,

$\therefore S \cup X = S$ , 应选择 D.

评述:这个题目也可以借助于文氏图作出判断. 由已知,有如下两种情况:




图 1-1

例7 集合  $\{1, 2, 3\}$  的子集总共有( ).

(A) 7个 (B) 8个  
(C) 6个 (D) 5个

(1988年全国高考试题,文科难度为0.79)

分析:集合  $\{1, 2, 3\}$  的子集包含:

$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\},$   
 $\{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}$ ,

共计 8 个, 因此选择 B.

事实上, 上面的做法就是

$$C_3^0 + C_3^1 + C_3^2 + C_3^3 = 8.$$

如果依照乘法原理, 集合  $\{1, 2, 3\}$  的子集都是对于 1, 2, 3 这三个元素的“取”与“不取”, 因此共有  $2^3$  种.

### 练习 1-1

1. 设全集  $I = \{\text{三角形}\}$ , 集合  $P = \{\text{锐角三角形}\}$ ,  $Q = \{\text{钝角三角形}\}$ , 求  $\bar{P} \cap \bar{Q}$ .

\* 本书所注明的全高考试题的难度, 由国家教委考试中心提供.



2. 已知集合  $P$  和  $Q$  满足  $P \cap Q = Q$ , 那么 ( ).

- (A)  $P \cup Q = P$       (B)  $P \subset Q$   
(C)  $P \supset Q$       (D)  $P = Q$

3. 设全集  $I$  为自然数集  $N$ ,  $E = \{2n | n \in N\}$ ,  $F = \{4n | n \in N\}$ , 那么  $N$  可以表示成 ( ).

- (A)  $E \cap F$       (B)  $\bar{E} \cup F$   
(C)  $E \cup \bar{F}$       (D)  $\bar{E} \cup \bar{F}$

(1991年“三南”高考试题)

4. 已知  $M = \{x | 4x^2 - 1 \leq 0\}$ ,  $N = \{x | \frac{1}{x} \geq \frac{1}{|x|}\}$ , 求  $M \cup N$  与  $M \cap N$ .

5. 已知  $S = \{(x, y) | \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1, x \in R, y \in R\}$ ,  $T = \{(x, y) | y^2 = x - 1, x \geq 1, y \in R^-\}$ , 求  $A \cap B$ .

6. 设全集  $I = \{(x, y) | x, y \in R\}$ , 集合  $M = \{(x, y) | \frac{y-3}{x-2} = 1\}$ ,  $N = \{(x, y) | y \neq x+1\}$ , 那么  $\overline{M \cup N}$  等于 ( ).

- (A)  $\emptyset$       (B)  $\{(2, 3)\}$   
(C)  $(2, 3)$       (D)  $\{(x, y) | y = x+1\}$

(1990年全国高考试题)

7. 设集合  $E$  满足:  $\{0, 1\} \subseteq E \subset \{0, 1, 2, 3, 4\}$ , 试写出所有的集合  $E$ .

8. 已知  $M = \{x | x \leq 1\}$ ,  $N = \{x | x > p\}$ , 要使  $M \cap N \neq \emptyset$ , 则  $p$  所满足的条件是 ( ).

- (A)  $p > 1$       (B)  $p \geq 1$   
(C)  $p < 1$       (D)  $p \leq 1$

9. 设集合  $M = \{x | x > 2\}$ ,  $P = \{x | x < 3\}$ , 那么“ $x \in M$  或  $x \in P$ ”是“ $x \in M \cap P$ ”的 ( ).

- (A) 充分条件但非必要条件  
(B) 必要条件但非充分条件  
(C) 充分必要条件  
(D) 非充分条件也非必要条件

## § 1-2 函数的定义、图象和性质

本节内容包含: 映射与函数(定义), 函数三要素(定义域、值域与对应法则), 函数的图象和性质(单调性、奇偶性与周期性), 反函数及其图象. 这些内容是函数知识的重要基础, 非常重

要.

由于上述知识的重要性, 在高考试题中, 成为每年必考的内容之一. 特别是近几年, 加强了对这些知识的考查.

一、关于函数概念的考查, 主要是

1. 能根据函数三要素判断两个函数是否为同一个函数.

2. 理解函数符号(对应法则), 掌握函数的三种表示法.

3. 会求函数的定义域与某些函数的值域.

上述三方面的考查, 多以选择题与填空题的形式出现, 一般多为容易题与中等题.

例1 已知:  $A = N, B = \{\frac{1}{3}, \frac{3}{5}, \frac{5}{7}, \dots\}$ , 映射  $f: x \rightarrow y = \frac{2x-1}{2x+1} (x \in A)$ , 那么在  $f$  的作用下, 象  $\frac{99}{101}$  的原象是 \_\_\_\_\_.

分析: 依题意, 有  $\frac{2x-1}{2x+1} = \frac{99}{101}$ .

由此得  $x = 50$ , 所以答案为 50.

例2 与函数  $y = x$  有相同图象的一个函数是 ( ).

- (A)  $y = \sqrt{x^2}$       (B)  $y = \frac{x^2}{x}$

(C)  $y = a^{\log_a x}$ , 其中  $a > 0, a \neq 1$

(D)  $y = \log_a a^x$ , 其中  $a > 0, a \neq 1$

(1989年全国高考试题, 文科难度 0.78)

分析: 由于

$y = \sqrt{x^2} = |x|$ , 与  $y = x$  的对应法则不同;

$y = \frac{x^2}{x} = x (x \neq 0)$ , 与  $y = x$  的定义域不同;

$y = a^{\log_a x} = x (x > 0)$ , 与  $y = x$  的定义域不同;

$y = \log_a a^x = x (x \in R)$ , 与  $y = x$  完全相同.

因此选择 D.

因此选择 D.

例3 (1) 如果  $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x}{1-x^2}$ , 则  $f(x) =$  \_\_\_\_\_.

(1985年广东高考试题)

(2) 已知  $f(\sqrt{x} + 1) = x + 2\sqrt{x}$ , 求  $f(x)$  与  $f(x+1)$ .

解: (1)  $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$ .

(2) 设  $u = \sqrt{x+1} \geq 1$ , 则

$$\sqrt{x} = u - 1, \quad x = (u - 1)^2.$$

于是  $f(u) = (u - 1)^2 + 2(u - 1)$

$$= u^2 - 1 \quad (u \geq 1),$$

$$\therefore f(x) = x^2 - 1 \quad (x \geq 1),$$

$$f(x+1) = (x+1)^2 - 1$$

$$= x^2 + 2x \quad (x \geq 0).$$

**评述:** 在做(2)时, 通过换元, 把  $f(\sqrt{x+1}) = x+2\sqrt{x}$  化为  $f(u) = u^2 - 1$ , 要注意  $f(u)$  的定义域是  $\{u | u \geq 1\}$ , 这样才能保证转化的等价性. 在求  $f(x+1)$  时, 要注意它的定义域是  $\{x | x+1 \geq 1\}$ , 即  $\{x | x \geq 0\}$ .

**例 4** 设函数  $y = \lg(x^2 - x - 2)$  的定义域为  $A$ , 函数  $y = \sqrt{\frac{x+2}{1-x}}$  的定义域为  $B$ , 则  $A \cap B =$  \_\_\_\_\_. (1986 年广东高考试题)

$$\text{解: } A = \{x | x^2 - x - 2 > 0\}$$

$$= \{x | x < -1 \text{ 或 } x > 2\},$$

$$B = \left\{x \mid \frac{x+2}{1-x} \geq 0\right\} = \{x | -2 \leq x < 1\},$$

$$\therefore A \cap B = \{x | -2 \leq x < -1\}.$$

$$\text{(或 } [-2, -1))$$

**例 5** 用长为  $l$  的铁丝弯成下部为矩形, 上部为半圆形的框架(如图 1-2). 若矩形底边长为  $2x$ , 求此框架围成的面积  $y$  与  $x$  的函数式, 并写出它的定义域.

**解:** 设  $AB = 2x$ , 则  $\widehat{CD} = \pi x$ , 于是

$$AD = \frac{l - 2x - \pi x}{2}, \text{ 因此}$$

$$y = 2x \cdot \frac{l - 2x - \pi x}{2}$$

$$+ \frac{\pi x^2}{2},$$

$$\text{即 } y = -\frac{\pi+4}{2}x^2 + lx.$$

函数的定义域由下列不等式组确定.

$$\begin{cases} 2x > 0, \\ \frac{l - 2x - \pi x}{2} > 0. \end{cases}$$

$$\text{解之, 得 } 0 < x < \frac{l}{2+\pi}.$$




图 1-2

$$\therefore \text{函数式是 } y = -\frac{\pi+4}{2}x^2 + lx, \text{ 定义域}$$

是  $\left(0, \frac{l}{2+\pi}\right)$ .

**评述:** 求函数的定义域一般有三类问题.

第一类是给出函数的解析式, 此时函数的定义域是使解析式有意义的自变量的取值集合; 第二类是实际问题或几何问题, 此时除要考虑函数解析式有意义外, 还应考虑使实际问题或几何问题有意义; 第三类问题是不给出函数的解析式, 而由  $f(x)$  的定义域确定函数  $f[\varphi(x)]$  的定义域, 例如 1985 年全国高考试题:

“设函数  $f(x)$  的定义域是  $[0, 1]$ , 求函数  $f(x^2)$  的定义域.”这类问题的解法在例 3(2) 中已经讲过了.

**例 6** 求下列函数的值域:

$$(1) y = \sqrt{3x+1} \quad (x \leq 3);$$

$$(2) y = x + \frac{1}{x} + 1 \quad (x \neq 0).$$

**解:** (1) 因为  $y = \sqrt{3x+1}$  在  $[-\frac{1}{3}, +\infty)$

上是增函数, 所以函数的值域是  $[0, \sqrt{10}]$ .

(2) 有多种解法.

**解法一:** 配方法. 分  $x > 0$  与  $x < 0$  两种情况, 从略.

**解法二:** 利用平均值不等式做.

当  $x > 0$  时, 有

$$y = x + \frac{1}{x} + 1 \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} + 1 = 3,$$

当且仅当  $x = \frac{1}{x}$ , 即  $x = 1$  时, 有  $y = 3$ ;

当  $x < 0$  时, 有

$$-y = (-x) + \frac{1}{-x} - 1$$

$$\geq 2\sqrt{(-x) \cdot \frac{1}{(-x)}} - 1 = 1,$$

$\therefore y \leq -1$ , 当且仅当  $-x = \frac{1}{-x}$  即  $x = -1$  时, 有  $y = -1$ .

综上所述,  $y = x + \frac{1}{x} + 1$  的值域是

$$(-\infty, -1] \cup [3, +\infty).$$

**解法三:** 判别式法.

$$\begin{aligned} \because y &= x + \frac{1}{x} + 1, \\ \therefore x^2 + (1-y)x + 1 &= 0. \\ \therefore \text{方程有实根,} \\ \therefore \Delta &= (1-y)^2 - 4 \geq 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{即 } (y-1)^2 &\geq 4, \\ \therefore y-1 &\leq -2 \text{ 或 } y-1 \geq 2, \end{aligned}$$

于是  $y \leq -1$  或  $y \geq 3$ .

当  $x = -1$  时,  $y = -1$ ; 当  $x = 1$  时,  $y = 3$ .

综上所述,  $y = x + \frac{1}{x} + 1$  的值域是  $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$ .

**评述:** 求函数的值域是一个较为复杂的问题, 因此在选题上要注意“分寸”, 不可过难. 上述几个题目介绍了求函数值域的几种常见方法: 利用已知函数的值域, 利用函数的单调性, 以及配方法、公式法(利用平均值不等式)与判别式法. 上述方法与求函数的最大值与最小值的方法密切相关.

## 二、关于反函数主要考查两类问题

1. 给出函数  $y = f(x)$  的解析式(其反函数存在, 不必论证), 求出它的反函数  $y = f^{-1}(x)$ . 一般的解题步骤是:

- (1) 由  $y = f(x)$  反解出  $x = f^{-1}(y)$ ;
- (2) 将  $x, y$  互换, 改写为  $y = f^{-1}(x)$ ;
- (3) 由  $y = f(x)$  的值域确定反函数的定义域.

2. 利用“函数  $y = f(x)$  与反函数  $y = f^{-1}(x)$  的图象关于直线  $y = x$  对称”解决有关问题.

以上两类问题中, 主要考查第一类问题, 大多为选择题.

**例 7** 已知函数  $y = \frac{6x+5}{x-1}$  ( $x \in \mathbb{R}$ , 且  $x \neq 1$ ), 那么它的反函数为( ).

- (A)  $y = \frac{6x+5}{x-1}$  ( $x \in \mathbb{R}$ , 且  $x \neq 1$ )
- (B)  $y = \frac{x+5}{x-6}$  ( $x \in \mathbb{R}$ , 且  $x \neq 6$ )
- (C)  $y = \frac{x-1}{6x+5}$  ( $x \in \mathbb{R}$ , 且  $x \neq -\frac{5}{6}$ )
- (D)  $y = \frac{x-6}{x+5}$  ( $x \in \mathbb{R}$ , 且  $x \neq -5$ )

(1991 年全国高考文科试题, 难度 0.92)

此题答案为 B, 分析从略.

**例 8** 求下列各函数的反函数:

- (1)  $y = 3^x$  ( $x \geq 0$ );
- (2)  $y = -\sqrt{x-1}$  ( $x \geq 1$ ).

**解:** (1) 由  $y = 3^x$  得  $x = \log_3 y$ .

$$\because x \geq 0, \therefore y \geq 1.$$

因此,  $y = 3^x$  ( $x \geq 0$ ) 的反函数是

$$y = \log_3 x \quad (x \geq 1).$$

(2) 由  $y = -\sqrt{x-1}$ , 得  $y^2 = x-1$ , 即  $x = y^2 + 1$ .

$$\because x \geq 1, \therefore y \leq 0.$$

于是有  $x = y^2 + 1$  ( $y \leq 0$ ).

$\therefore y = -\sqrt{x-1}$  ( $x \geq 1$ ) 的反函数是  $y = x^2 + 1$  ( $x \leq 0$ ).

**例 9** 函数  $y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$  的反函数的定义域是 \_\_\_\_\_. (1989 年全国高考试题, 文科难度 0.38)

$$\text{解法一: } y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1} = 1 - \frac{2}{e^x + 1}.$$

$$\text{由 } e^x > 0, \text{ 得 } 0 < \frac{2}{e^x + 1} < 2.$$

$$\therefore -2 < -\frac{2}{e^x + 1} < 0,$$

于是  $-1 < y < 1$ .

$\therefore y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$  的反函数的定义域就是所给函数的值域,

$\therefore y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$  的反函数的定义域是  $(-1, 1)$ .

$$\text{解法二: 由 } y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}, \text{ 得}$$

$$(y-1)e^x = -(y+1).$$

$$\text{当 } y \neq 1 \text{ 时, 有 } e^x = -\frac{y+1}{y-1}.$$

$$\because e^x > 0,$$

$$\therefore -\frac{y+1}{y-1} > 0 \Leftrightarrow \frac{y+1}{y-1} < 0 \Leftrightarrow -1 < y < 1.$$

(以下从略)

**例 10** 给定实数  $a, a \neq 0$  且  $a \neq 1$ . 设函数  $y = \frac{x-1}{ax-1}$  ( $x \in \mathbb{R}$  且  $x \neq \frac{1}{a}$ ). 证明: 这个函数的图象关于直线  $y = x$  成轴对称图形.

**证明:** 先求所给函数的反函数.

$$\text{由 } y = \frac{x-1}{ax-1} \quad (x \neq \frac{1}{a}), \text{ 得}$$
$$(ay-1)x = y-1. \quad (*)$$

假如  $ay-1=0$ , 即  $y = \frac{1}{a}$ . 又由 (\*) 知  $y=1$ , 于是  $\frac{1}{a}=1$ , 故  $a=1$ , 与已知矛盾, 所以  $ay-1 \neq 0$ .

$$\text{因此由 } (*) \text{ 得 } x = \frac{y-1}{ay-1} \quad (y \neq \frac{1}{a}).$$

这说明函数  $y = \frac{x-1}{ax-1} \quad (x \in R, x \neq \frac{1}{a})$  的反函数是  $y = \frac{x-1}{ax-1} \quad (x \in R \text{ 且 } x \neq \frac{1}{a})$ , 两者完全相同.

由于  $y=f(x)$  的图象与  $y=f^{-1}(x)$  的图象关于直线  $y=x$  对称, 所以函数  $y = \frac{x-1}{ax-1} \quad (x \in R \text{ 且 } x \neq \frac{1}{a})$  的图象关于直线  $y=x$  成轴对称图形.

### 三、函数的图象和性质

1. 函数的图象是函数关系的一种表示, 它是从“形”的方面刻划函数的变化规律, 通过函数图象, 可以形象地反映函数的性质. 利用函数的图象既有助于记忆各类初等函数的性质, 又可以运用数形结合的方法去解决某些问题. 在高考中, 有关函数的图象主要考查:

(1) 几类初等函数(一次与二次函数、幂函数、指数函数和对数函数、三角函数)的图象特征.

(2) 函数的图象变换, 主要是指:

平移变换——函数  $y=f(x)$  与  $y=f(x+a)+b$  的图象之间的关系;

伸缩变换——函数  $y=f(x)$  与  $y=Af(\omega x) \quad (A>0, \omega>0)$  的图象之间的关系;

对称变换——例如, 图象关于  $x$  轴对称、关于  $y$  轴对称、关于原点对称.

#### 2. 函数性质

函数性质主要是指函数的单调性、奇偶性与周期性, 要求掌握这些性质的意义(定义), 要求会用定义判断函数的奇偶性与单调性, 并能运用这些性质解题(函数的周期性将在下一章

中复习). 这是高考的重要内容之一, 既可以是选择题与填空题, 也可以是解答题(大题), 既有容易题与中等题, 也有综合性的难题.

**例 11** 指出下列各小题中的两个函数图象之间的关系:

$$(1) y = -(x-2)^2 \text{ 与 } y = -(x+1)^2;$$

$$(2) y = \frac{1}{x} \text{ 与 } y = \frac{2x-1}{x-1};$$

$$(3) y = \log_2 x \text{ 与 } y = \log_{\frac{1}{2}}(x+1).$$

分析: (1) 略.

$$(2) \because y = \frac{2x-1}{x-1} = \frac{2(x-1)+1}{x-1} = 2 + \frac{1}{x-1},$$

$\therefore$  把曲线  $y = \frac{1}{x}$  向右平移 1 个单位, 再向上平移 2 个单位, 就得到曲线  $y = \frac{2x-1}{x-1}$ .

$$(3) \because y = \log_{\frac{1}{2}}(x+1) = -\log_2(x+1),$$

$\therefore$  把曲线  $y = \log_2 x$  向左平移 1 个单位, 就得到曲线  $y = \log_2(x+1)$ .

再将曲线  $y = \log_2(x+1)$  关于  $x$  轴对称, 就得到曲线  $y = -\log_2(x+1)$ , 即得到曲线  $y = \log_{\frac{1}{2}}(x+1)$ .

**例 12** 用函数单调性的定义证明  $f(x) = \sqrt{x^2 - \frac{1}{2}}$ , 在区间  $[\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$  上是增函数.

证明: 设  $x_1, x_2 \in [\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$ , 且  $x_1 < x_2$ ,

$$\begin{aligned} \text{则 } f(x_2) - f(x_1) &= \sqrt{x_2^2 - \frac{1}{2}} - \sqrt{x_1^2 - \frac{1}{2}} \\ &= \frac{(x_2^2 - \frac{1}{2}) - (x_1^2 - \frac{1}{2})}{\sqrt{x_2^2 - \frac{1}{2}} + \sqrt{x_1^2 - \frac{1}{2}}} \\ &= \frac{(x_2 - x_1)(x_2 + x_1)}{\sqrt{x_2^2 - \frac{1}{2}} + \sqrt{x_1^2 - \frac{1}{2}}} \end{aligned}$$

$$\because x_2 > x_1 > 0,$$

$$\therefore (x_2 - x_1)(x_2 + x_1) > 0$$

$$\text{又 } \sqrt{x_2^2 - \frac{1}{2}} + \sqrt{x_1^2 - \frac{1}{2}} > 0,$$

$$\therefore f(x_2) - f(x_1) > 0,$$

即  $f(x_2) > f(x_1)$ .

因此, 函数  $f(x)$  在区间  $[\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$  上是增函数.

**例 13** 在区间  $(-\infty, 0)$  上为增函数的是 ( ).

(A)  $y = -\log_{\frac{1}{2}}(-x)$       (B)  $y = \frac{x}{1-x}$

(C)  $y = -(x+1)^2$       (D)  $y = 1+x^2$

(1987 年全国高考试题, 文科难度为 0.29)

**分析:** 由于

$$y = \frac{x}{1-x} = \frac{-(1-x)+1}{1-x} = -1 + \frac{1}{x-1},$$

所以, 把  $y = -\frac{1}{x}$  的图象(它在  $(-\infty, 0)$  上是增函数)向右平移 1 个单位, 再向下平移 1 个单位(后者不影响函数的单调性)就得到  $y = \frac{x}{1-x}$  的图象, 它在  $(-\infty, 1)$  上是增函数, 因此选择 B.

**评述:** 这是利用函数的图象变换解题的例子之一. 本题也可以用定义判断出  $y = \frac{x}{1-x}$  在  $(-\infty, 0)$  上是增函数, 但比较麻烦.

**例 14** 用定义判断下列函数的奇偶性:

(1)  $f_1(x) = x^{-\frac{2}{3}}$  ( $x \neq 0$ );

(2)  $f_2(x) = \lg \frac{1-x}{1+x}$  ( $-1 < x < 1$ );

(3)  $f_3(x) = \lg x^2 + \lg \frac{1}{x^2}$  ( $x \neq 0$ ).

**解:** (1)  $\because f_1(-x) = (-x)^{-\frac{2}{3}}$   
 $= x^{-\frac{2}{3}} = f_1(x),$

$\therefore f_1(x)$  是偶函数.

(2)  $\because f_2(-x)$   
 $= \lg \frac{1+x}{1-x} = \lg \left( \frac{1-x}{1+x} \right)^{-1}$   
 $= -\lg \frac{1-x}{1+x} = -f_2(x),$

$\therefore f_2(x)$  是奇函数.

(3)  $\because f_3(x) = \lg x^2 + \lg \frac{1}{x^2} = 0,$

$\therefore f_3(-x) = 0 = f_3(x)$

$f_3(-x) = 0 = -f_3(x).$

因此,  $f_3(x)$  既是偶函数, 又是奇函数.

**例 15** 设  $f(x)$  是  $R$  上的奇函数, 且当

$x \in [0, +\infty)$  时,  $f(x) = x(1 + \sqrt[3]{x})$ , 那么当  $x \in (-\infty, 0)$  时,  $f(x) = ( )$ .

(A)  $-x(1 + \sqrt[3]{x})$       (B)  $x(1 + \sqrt[3]{x})$

(C)  $-x(1 - \sqrt[3]{x})$       (D)  $x(1 - \sqrt[3]{x})$

(1988 年广东高考试题)

**分析:** 设  $x \in (-\infty, 0)$ , 则  $-x \in (0, +\infty)$ , 于是

$$f(-x) = -x(1 + \sqrt[3]{-x})$$
$$= -x(1 - \sqrt[3]{x}),$$

又  $f(-x) = -f(x),$

$\therefore f(x) = x(1 - \sqrt[3]{x}).$

应该选择 D.

**例 16** 已知函数  $f(x)$  是  $R$  上的奇函数, 并且是周期为 3 的周期函数. 又知  $f(1) = 10$ , 求  $f(7)$  与  $f(2)$ .

**解:**  $\because f(x)$  的周期是 3,  $f(1) = 10,$

$\therefore f(7) = f(4+3) = f(4)$   
 $= f(1+3) = f(1) = 10.$

$\because f(x)$  是奇函数,

$\therefore f(-1) = -f(1) = -10.$

又  $f(-1) = f(-1+3) = f(2),$

$\therefore f(2) = -10.$

### 练习 1-2

1. 求下列函数的定义域:

(1)  $y = \frac{4x+1}{\lg(4x+1)}$ ;

(2)  $y = \sqrt{3x-1} + \sqrt{1-4x^2}.$

2. 设  $f(x)$  的定义域是  $[0, 1]$ , 求  $\varphi(x) = f(x+m) + f(x-m)$  的定义域, 其中  $m > 0$ .

3. 已知  $g(x) = \lg \frac{1-x}{1+x}$ , 求证:

$$g(x) + g(y) = g\left(\frac{x+y}{1+xy}\right).$$

4. (1) 设  $f(x+1) = x^2 - 1$ , 求  $f(x)$ ;

(2) 设  $g(e^x) = x^2 - 2x - 1$  ( $x \geq 0$ ), 求  $g(x)$ .

5. 求函数  $y = \frac{x}{x+1}$  的单调增区间.

6. 如果直线  $y = ax + 2$  与直线  $y = 3x - b$  关于直线  $y = x$  对称, 那么 ( ).

(A)  $a = \frac{1}{3}, b = 6$       (B)  $a = \frac{1}{3}, b = -6$

(C)  $a=3, b=-2$  (D)  $a=3, b=6$

(1990年全国高考试题)

7. 已知  $f(x) = \frac{2}{1-x^2} (x < -1)$ , 求  $f^{-1}\left(-\frac{2}{3}\right)$  的值.

8. 已知点  $\left(2, \frac{1}{4}\right)$  既在函数  $y = 2^{ax+b}$  的图象上, 又在它的反函数的图象上, 求  $a$  和  $b$  的值.

9. 函数  $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$  的反函数( ).

(A) 是奇函数, 它在  $(0, +\infty)$  上是减函数

(B) 是偶函数, 它在  $(0, +\infty)$  上是减函数

(C) 是奇函数, 它在  $(0, +\infty)$  上是增函数

(D) 是偶函数, 它在  $(0, +\infty)$  上是增函数

(1992年全国高考试题)

10. 设  $f(x)$  与  $g(x)$  的定义域是  $\{x | x \in \mathbb{R}, \text{且 } x \neq \pm 1\}$ , 若  $f(x)$  是偶函数,  $g(x)$  是奇函数, 且  $f(x) + g(x) = \frac{1}{x-1}$ , 求  $f(x)$  与  $g(x)$  的表达式.

11. 用函数单调性的定义证明:

(1)  $f(x) = \frac{2}{x}$  在区间  $(-\infty, 0)$  上是减函数;

(2)  $g(x) = ax^2 + bx + c (a > 0)$  在区间  $\left[-\frac{b}{2a}, +\infty\right)$  上是增函数.

12. 设  $f(x)$  是  $(-\infty, +\infty)$  上的增函数,  $a$  和  $b$  是实数.

(1) 证明命题“如果  $a+b \geq 0$ , 那么  $f(a) + f(b) \geq f(-a) + f(-b)$ ”;

(2) 判断(1)中的命题的逆命题是否正确, 并证明你的结论.

### § 1-3 幂函数、指数函数和对数函数

幂函数、指数函数和对数函数是中学数学中三类重要的基本初等函数, 它的定义、图象和性质是中学函数论的主要内容. 同时, 研究这三类函数所体现的数学思想方法在中学数学中也具有重要的作用. 因此, 这一节的内容在高考中占有重要的地位. 既可以考查“三基”, 又可以考查解决问题时所体现的函数思想、等价转化与分类讨论等数学思想, 以及逻辑推理能力.

由于初中所学的二次函数十分重要, 是解决高中数学的重要基础, 因此这一节也包含对二次函数知识的巩固、深化与运用. 此外, 指数式与对数式的恒等变形, 特别是对数换底公式也是高考考查的内容. 上述各部分本节也将涉及.

#### 一、二次函数的定义、图象与性质

要全面地、熟练地掌握二次函数的定义、图象与性质, 灵活地运用上述知识解决有关问题. 在高考中, 主要考查

1. 二次函数的对称性;

2. 二次函数的增减性;

3. 二次函数的最值, 特别是在指定区间上的最值.

**例 1** 求函数  $y = -x^2 + 4x - 2$  在区间  $[0, 3]$  上的最大值与最小值. (1985年全国高考文科试题)

**解:**  $y = -x^2 + 4x - 2 = -(x-2)^2 + 2$ .

$\because x \in [0, 3]$ ,

$\therefore$  当  $x=2$  时,  $y$  有最大值 2; 当  $x=0$  时,  $y$  有最小值 -2.

**例 2** 如果函数  $f(x) = x^2 + 2(a-1)x + 2$  在区间  $(-\infty, 4]$  上是减函数, 求实数  $a$  的取值范围.

**解:** 抛物线  $y = x^2 + 2(a-1)x + 2$  的顶点横坐标是  $-\frac{2(a-1)}{2}$ , 即  $1-a$ . 因此, 它的单调减区间是  $(-\infty, 1-a)$ .

由已知,  $1-a \geq 4$ , 由此得  $a \leq -3$ .

$\therefore$  实数  $a$  的取值范围是  $(-\infty, -3]$ .

**例 3** 如果函数  $f(x) = x^2 + bx^2 + c$  对任意实数  $t$  都有  $f(2+t) = f(2-t)$ , 那么( ).

(A)  $f(2) < f(1) < f(4)$

(B)  $f(1) < f(2) < f(4)$

(C)  $f(2) < f(4) < f(1)$

(D)  $f(4) < f(2) < f(1)$

(1992年全国高考试题, 文科难度为 0.51)

**分析:** 由  $f(2+t) = f(2-t)$  对任意  $t \in \mathbb{R}$  成立, 不难得出  $y = f(x)$  的对称轴是直线  $x = 2$ , 于是有  $f(2) < f(1) < f(4)$ , 应该选择 A.

**例 4** 已知  $f(x) = x^2 + 1, 1 \leq \lambda \leq \frac{3}{2}$ , 试求  $g(x) = f[f(x)] - 2\lambda f(x)$  在  $[-1, 1]$  上的最大值与最小值.

**解:**  $\because f[f(x)] = f(x^2 + 1)$   
 $= (x^2 + 1)^2 + 1,$   
 $\therefore g(x) = (x^2 + 1)^2 + 1 - 2\lambda(x^2 + 1)$   
 $= [x^2 - (\lambda - 1)]^2 + (1 - \lambda^2).$

设  $x^2 = t$ , 则  
 $y = g(x) = h(t)$   
 $= [t - (\lambda - 1)]^2 + (1 - \lambda^2), t \in [0, 1].$

$\because 1 \leq \lambda \leq \frac{3}{2},$   
 $\therefore 0 \leq \lambda - 1 \leq \frac{1}{2}.$

综上所述: 当  $t = \lambda - 1$  时,  $g(x)$  有最小值  $1 - \lambda^2$ ; 当  $t = 1$  时,  $g(x)$  有最大值  $5 - 4\lambda$ .

**二、幂函数、指数函数与对数函数**  
 这部分内容主要考查:

1. 指数式与对数式的计算与化简.
2. 三类函数的定义(解析式特征, 定义域与值域)与图象, 以及它们的主要性质.
3. 上述知识的应用, 如比较两个数值的大小, 函数值正负性的讨论, 以及解指数不等式与对数不等式(这一条主要在《不等式》一章中讨论), 并能解决某些实际问题.

**例 5**  $\frac{\log_8 9}{\log_2 3}$  的值是( ).

(A)  $\frac{2}{3}$  (B) 1 (C)  $\frac{3}{2}$  (D) 2

(1992 年全国高考试题, 文科难度 0.82)

**分析:** 由对数换底公式(或其推论)可知答案为  $\frac{2}{3}$ , 故应选择 A.

**例 5** 解下列各填空题:

- (1) 函数  $y = x^{-\frac{2}{3}}$  的定义域是\_\_\_\_\_;
- (2) 函数  $y = 2^{|x|}$  的定义域是\_\_\_\_\_, 值域是\_\_\_\_\_;
- (3)  $y = \log_2 x^2 + 3$  ( $x \geq 2$ ) 的定义域是\_\_\_\_\_, 值域是\_\_\_\_\_.

(4) 已知镭经过 100 年剩留原来质量的 95.76%. 设质量为 1 的镭经过  $x$  年后的剩留量为  $y$ , 则  $y = f(x)$  的函数关系式是\_\_\_\_\_.

(5) 函数  $y = \log_{0.1}(6 + x - 2x^2)$  的单调增区间是\_\_\_\_\_.

**略解:** (1) 定义域是

$(-\infty, 0) \cup (0, +\infty).$

(2) 定义域是  $R$ , 值域是  $[1, +\infty).$

(3) 定义域是  $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ , 值域是  $[5, +\infty).$

(4) 由  $a^{100} = 95.76\% = 0.9576$  得

$y = [(0.9576)^{\frac{1}{100}}]^x$  ( $1 \leq x \leq 100, x \in N$ ).

(5) 函数的定义域为  $(-\frac{3}{2}, 2)$ . 又  $6 + x - 2x^2$  的递减区间为  $[\frac{1}{4}, +\infty)$ , 因此所给函数的递增区间是  $[\frac{1}{4}, 2)$ .

**例 7** 已知  $0 < a < b < 1$ , 设  $a^a, a^b, b^a, b^b$  中最大值是  $M$ , 最小值是  $m$ , 那么( ).

(A)  $M = a^a, m = b^b$  (B)  $M = b^b, m = a^a$

(C)  $M = a^b, m = b^a$  (D)  $M = b^a, m = a^b$ .

**分析:** 由幂函数性质有

$a^a < b^a, a^b < b^b.$  ①

由指数函数性质有

$a^a > a^b, b^a > b^b.$  ②

由①与②可得  $D$  是正确的.

**例 8** 设  $F(x) = f(x) - \frac{1}{f(x)}$ , 且  $x - \ln f(x) = 0$ , 那么  $F(x)$  是( ).

(A) 奇函数, 且在  $(-\infty, +\infty)$  上是增函数

(B) 奇函数, 且在  $(-\infty, +\infty)$  上是减函数

(C) 偶函数, 且在  $(-\infty, +\infty)$  上是增函数

(D) 偶函数, 且在  $(-\infty, +\infty)$  上是减函数

**分析:** 由已知,  $f(x) = e^x$ , 所以

$F(x) = e^x - e^{-x}.$

显然,  $F(x)$  是奇函数, 又不难证明它是增函数, 故应选择 A.

**三、指数方程与对数方程**

指数方程与对数方程属于超越方程, 没有一般的解法. 在中学主要学习一些简单的指数方程与对数方程的解法, 但在高考中, 这部分的考查难度有所提高.

1. 会解简单的指数方程和对数方程, 分别掌握三种解法(详见例 9 与例 10).

2. 应用有关知识布列指数方程, 解决某些实际问题.

3. 对于含有参数的指数方程与对数方程, 能够正确地、合理地进行求解或者解的个数与性质的讨论. 通过这类问题考查等价转化、分类讨论的数学思想与综合解题能力.

**例 9** 解下列各方程:

(1)  $2^{\log_3 x} = \frac{1}{4}$ ; (1990 年全国高考试题)

(2)  $5^{x+1} = 3^{x^2-1}$ ;

(3)  $9^{-x} - 2 \cdot 3^{1-x} = 27$ . (1988 年全国高考试题, 文科难度 0.85).

**解:** (1) 将原方程变为  $2^{\log_3 x} = 2^{-2}$ ,

$\therefore \log_3 x = -2$ ,

$\therefore x = 3^{-2} = \frac{1}{9}$ .

经检验,  $x = \frac{1}{9}$  是原方程的解.

(2) 方程两边取对数, 得

$(x+1)\lg 5 = (x^2-1)\lg 3$ ,

即  $(x+1)[(x-1)\lg 3 - \lg 5] = 0$ .

$\therefore x_1 = -1, x_2 = 1 + \log_3 5$

(或  $x_2 = \log_3 15$ ).

(3) 原方程可变为

$(3^{-x})^2 - 6 \cdot 3^{-x} - 27 = 0$ .

解之, 得  $3^{-x} = -3$  (舍) 或  $3^{-x} = 9$ .

由  $3^{-x} = 9$  得  $x = -2$ .

**评述:** 上面三题体现了解指数方程的三种基本方法: 化为同底, 方程两边取对数, 通过换元(不一定设元)化为一元二次方程.

**例 10** 解下列各方程:

(1)  $\log_{\sqrt{x}} x^3 = 2$ ;

(2)  $\lg(3-x) - \lg(3+x) = \lg(1-x) - \lg(2x+1)$ ;

(1985 年全国高考文科试题)

(3)  $\lg^2(x+10) - \lg(x+10)^3 = 4$ .

**解:** (1) 由对数定义, 有

$(\sqrt{x})^2 = x^3$ ,

即  $x = x^3$ .

$\therefore x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = -1$ .

经检验,  $0, \pm 1$  都是增根, 因此原方程无

解.

(2) 由原方程得

$\lg \frac{3-x}{3+x} = \lg \frac{1-x}{2x+1}$ ,

$\therefore \frac{3-x}{3+x} = \frac{1-x}{2x+1}$ .

解上述方程, 得  $x_1 = 0, x_2 = 7$ .

经检验, 原方程的解是  $x = 0$ .

(3) 由原方程, 得

$[\lg(x+10)]^2 - 3\lg(x+10) - 4 = 0$ .

解之, 得

$\lg(x+10) = 4$  或  $\lg(x+10) = -1$ .

由  $\lg(x+10) = 4$ , 得  $x_1 = 9990$ ;

由  $\lg(x+10) = -1$ , 得  $x_2 = -9.9$ .

经检验,  $x_1$  与  $x_2$  都是原方程的解.

**评述:** 上面三题体现了解对数方程的三种基本方法, 应该掌握好.

**例 11** 某工厂 1993 年生产某种产品 2 万件, 计划从 1994 年开始, 每年的产量比上年增长 20%. 问从哪一年开始, 这家工厂生产这种产品的年产量超过 12 万件. (已知  $\frac{\lg 6}{\lg 1.2} \approx 9.8$ )

**解:** 依题意, 有  $2(1+20\%)^{n-1} > 12$ ,

即  $1.2^{n-1} > 6$ .

两边取对数, 得  $(n-1)\lg 1.2 > \lg 6$ .

$\therefore \lg 1.2 > 0, \therefore n > \frac{\lg 6}{\lg 1.2} + 1 \approx 10.8$ .

取  $n = 11$ , 因此这家工厂从 2003 年开始, 年产量超过 12 万件.

**例 12** 设  $y = \log_{\frac{1}{2}}[a^{2x} + 2(ab)^x - b^{2x} + 1]$  ( $a > 0, b > 0$ ), 求使  $y$  为负值的  $x$  的取值范围.

**解:** 要使  $y < 0$ , 只要

$a^{2x} + 2(ab)^x - b^{2x} + 1 > 1$ ,

即  $b^{2x} \left[ \left(\frac{a}{b}\right)^{2x} + 2\left(\frac{a}{b}\right)^x - 1 \right] > 0$ .

$\therefore b^{2x} > 0$

$\therefore \left(\frac{a}{b}\right)^{2x} + 2\left(\frac{a}{b}\right)^x - 1 > 0$ .

解之, 得

$\left(\frac{a}{b}\right)^x < -1 - \sqrt{2}$  或  $\left(\frac{a}{b}\right)^x > -1 + \sqrt{2}$ .

$\therefore \left(\frac{a}{b}\right)^x > 0$ ,



∴ 将  $\left(\frac{a}{b}\right)^x < -1 - \sqrt{2}$  舍去.

保留  $\left(\frac{a}{b}\right)^x > \sqrt{2} - 1$ , 于是

$$x \lg \frac{a}{b} > \lg(\sqrt{2} - 1). \quad ①$$

当  $a > b > 0$  时,  $\lg \frac{a}{b} > 0$ , 由①得

$$x > \frac{\lg(\sqrt{2} - 1)}{\lg \frac{a}{b}} = \lg_{\frac{a}{b}}(\sqrt{2} - 1);$$

当  $b > a > 0$  时,  $\lg \frac{a}{b} < 0$ , 由①得

$$x < \lg_{\frac{a}{b}}(\sqrt{2} - 1);$$

当  $a = b > 0$  时,  $\lg \frac{a}{b} = 0$ , 而  $\lg(\sqrt{2} - 1) < 0$ , 因此对一切实数  $x$ , ①式恒成立.

**例 13** 已知  $a > 0, a \neq 1$ , 试求使方程  $\log_a(x - ak) = \log_a(x^2 - a^2)$  有解的  $k$  的取值范围. (1989 年全国高考试题, 文科难度 0.33)

**解:** 原方程有解等价于

$$\begin{cases} x - ak > 0 \\ x^2 - a^2 > 0 \\ (x - ak)^2 = x^2 - a^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - ak > 0 & ① \\ (x - ak)^2 = x^2 - a^2 & ② \end{cases}$$

$$\text{由②, 得 } 2kx = a(1 + k^2). \quad ③$$

当  $k = 0$  时, 由  $a > 0$  知③无解, 故原方程无解;

当  $k \neq 0$  时, ③的解是

$$x = \frac{a(1 + k^2)}{2k}. \quad ④$$

把④代入①, 得  $\frac{a(1 + k^2)}{2k} - ak > 0$ ,

$$\text{即 } \frac{(k-1)(k+1)}{k} < 0.$$

解之, 得  $k < -1$  或  $0 < k < 1$ .

综上所述, 当  $k$  在  $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$  内取值时, 原方程有解.

**评述:** 对于含参数的指数方程与对数方程, 在求解时, 注意将原方程等价转化为某个混合组, 并注意在等价转化的原则下简化、求解.

### 练习 1-3

1. 设集合  $A = \{y | y = x^2 - 2x + 3, x \in \mathbb{R}\}$ ,  $B = \{y | y = 2x^2 - 3x + 1, x \in \mathbb{R}\}$ , 求  $A \cup B$  与  $A \cap B$ .

$\cap B$ .

2. 求函数  $y = \frac{1}{2}x^2 - 2|x| + \frac{5}{2}$  的单调区间.

3. 设函数  $y = f(x)$  的图象关于直线  $x = 1$  对称, 若当  $x \leq 1$  时,  $y = x^2 + 1$ , 则当  $x > 1$  时,  $y = \underline{\hspace{2cm}}$ . (1991 年上海试题)

4. 图中曲线是幂函数  $y = x^n$  在第一象限的图象. 已知  $n$  取  $\pm 2, \pm \frac{1}{2}$  四个值, 则相应于曲线  $C_1, C_2, C_3, C_4$  的  $n$  依次为 ( ).

(A)  $-2, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2$

(B)  $2, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -2$

(C)  $-\frac{1}{2}, -2, 2, \frac{1}{2}$

(D)  $2, \frac{1}{2}, -2, -\frac{1}{2}$




图 1-3

(1992 年全国高考试题)

5. 在  $(-\infty, 0)$  上是增函数的是 ( ).

(A)  $y = -(x+1)^2$  (B)  $y = x^{\frac{2}{3}}$

(C)  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1}$  (D)  $y = \log_{\frac{1}{2}}|x-1|$

6. 若  $\log_a \frac{2}{3} < 1$ , 则  $a$  的取值范围是 ( ).

(A)  $\left(\frac{2}{3}, 1\right)$

(B)  $\left(\frac{2}{3}, +\infty\right)$

(C)  $\left(0, \frac{2}{3}\right) \cup (1, +\infty)$

(D)  $\left(0, \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{2}{3}, +\infty\right)$

7. 若  $\log_a 2 < \log_b 2 < 0$ , 则 ( ).

(A)  $0 < a < b < 1$  (B)  $0 < b < a < 1$

(C)  $a > b > 1$  (D)  $b > a > 1$

(1992 年全国高考试题)

8. 已知  $1 < x < d$ , 令  $a = (\log_a x)^2, b = \log_a(x^2), c = \log_a(\log_a x)$ , 则 ( ).

(A)  $a < b < c$  (B)  $a < c < b$

(C)  $c < b < a$  (D)  $c < a < b$

9. 已知  $f(e^x) = x^2 - 2x + 3, x \in [2, 3]$ .

(1) 求  $f(x)$  的表达式和定义域;

(2) 求  $f(x)$  的最小值与最大值.

10. 解下列方程: