

JIATING CHUQIA SHIYAN

家庭畜牧饲养作业历

1955 — 1956

11111021

11111021

农业出版社

家庭畜禽饲养作业历




沈阳农学院 主编



辽宁科学技术出版社

一九八五年·沈阳

使用时请将
台历翻开摊平，
然后再将撑板两
端折弯(图1)，插
入书脊的夹层内
(图2)，斜放在台
上即可。如图所
示(图3)：



一 月

1

1985年星期二 农历甲子年十一月十一
1986年星期三 农历乙丑年十一月廿一
1987年星期四 农历丙寅年十二月初二
1988年星期五 农历丁卯年十一月十二
1989年星期日 农历戊辰年十一月廿四
1990年星期一 农历己巳年十二月初五

记 事

• 作业提示 •

制定家庭饲养业经营管理计划：根据国内外市场对畜产品的需求，制定经营方向，引进和饲养最优良畜禽品种，根据饲养者的技术、资金、生产能力、饲料、畜舍及防疫措施等，编制各种计划。计划包括引种或种畜更新、孵化育雏、母畜繁殖、饲料生产、物资购置、产品经销、防疫灭病、收支等计划，要心中有数，不要盲目生产。



鸡一生需要饲料量

(1) 蛋用鸡

① 0~20周龄（开产前）8.5公斤/只。

其中：玉米4.2公斤、糠麸2.43公斤、豆饼1.1公斤、鱼粉0.45公斤、骨粉0.1公斤、贝壳粉0.2公斤、微量元素添加剂0.08公斤、维生素添加剂0.8克。

② 21~72周龄（开产后364天）42.5公斤/只。

其中：玉米23.8公斤、糠麸8.5公斤、豆饼6.0公斤、骨粉0.43公斤、鱼粉2.13公斤、贝壳粉1.7公斤、微量元素添加剂0.42公斤、维生素添加剂4.2克。

(2) 肉用鸡

① 0~20周龄（开产前）12.5公斤/只。

其中：玉米6.46公斤、糠麸3.0公斤、豆饼1.8公斤、鱼粉0.7公斤、骨粉0.12公斤、贝壳粉0.25公斤、微量元素添加剂0.12公斤、维生素添加剂1.25克。

② 21~72周龄（开产后364天）52公斤/只。

其中：玉米29.12公斤、糠麸10.4公斤、豆饼7.28公斤、鱼粉2.6公斤、骨粉0.52公斤、贝壳粉2.08公斤、微量元素添加剂0.52公斤、维生素添加剂5.2克。

一 月

2

1985年星期三 农历甲子年十一月十二
1986年星期四 农历乙丑年十一月廿二
1987年星期五 农历丙寅年十二月初三
1988年星期六 农历丁卯年十一月十三
1989年星期一 农历戊辰年十一月廿五
1990年星期二 农历己巳年十二月初六

记 事

• 作业提示 •

记账与成本核算：记账包括饲料购进和消耗，产品的数量和出售，疾病防治费，用电、燃料和其它收入和支出费用，都要记清楚。在这个基础上进行成本核算，随时掌握生产的盈亏。编制生产指标：根据每种畜禽的生产性能和饲料供应水平，编制生产指标，以便对照指标随时检查生产，遇有问题及时纠正，消除不利于生产的因素。



猪的经济类型

猪的经济类型有三种：脂肪型、瘦肉型和肉脂兼用型。主要根据猪 90~100 公斤阶段活体背膘厚度和胴体瘦肉率划分。

脂肪型猪

背膘厚度 4 厘米以上，瘦肉率 40% 以下，如广西省的陆川猪等。

瘦肉型猪

背膘 3 厘米以下，瘦肉率 55% 以上，如长白猪、杜洛克猪等。

兼用型猪

背膘 3~4 厘米，瘦肉率 40~55%，如新金猪、东北花猪等。



母羊临产前有哪些表现

母羊临产前由于骨盆韧带松弛，腹部下陷，尾根两侧形成凹陷；卧息时后肢伸出向外，阴门红肿松弛，排出浓稠粘液；乳房膨大，乳头直立，用手挤时有黄色初乳流出；行动迟缓，站立不安，有时鸣叫，频频排尿；时而回顾腹部，常常独自呆立墙角或卧下；放牧时常脱群掉队，停止采草。

一 月

3

1985年星期四 农历甲子年十一月十三
1986年星期五 农历乙丑年十一月廿三
1987年星期六 农历丙寅年十二月初四
1988年星期日 农历丁卯年十一月十四
1989年星期二 农历戊辰年十一月廿六
1990年星期三 农历己巳年十二月初七

记 事

· 作业提示 ·

编制技术实施细则：对饲料加工调剂、日粮配合、饲养方式、繁殖技术、防寒避暑措施等都要逐项制定技术实施细则。做好各项生产纪录：饲养方法、畜禽的健康、饲料消耗、产品数量、防检疫措施等都要认真记录。通过历年记录，整理分析档案，肯定成绩，找出差距，不断提高生产水平。在自愿互利原则下，搞“产、供、销”联合体，发展商品生产，提高经济效益。



新 金 猪

新金猪是肉脂兼用型猪种，被毛黑色，前额、四肢下部和尾尖着生白毛，即为“六白”特征。

成年公猪平均体重230公斤，体长160厘米；母猪体重180公斤，体长145厘米左右。

肥育性能良好，日增重500~550克，胴体瘦肉率50%左右。

新金猪主要饲养在辽宁省金县、新金县和大连市郊区的育种场和广大农村。

东 北 花 猪



东北花猪是肉脂兼用型品种，被毛黑白花。成年公猪平均体重330公斤，体长155厘米；母猪体重200公斤，体长150厘米左右。

东北花猪适应性较强，繁殖性能较高，产仔数10~12头。肥育性能良好，日增重600克，料肉比3.5。背膘厚3.5厘米，瘦肉率50%。是东北地区一个良好的经济杂交母本猪。吉林市农业科学研究所、黑龙江省畜牧研究所、辽宁省东方红农场均有饲养。

1985年星期五	农历甲子年十一月十四
1986年星期六	农历乙丑年十一月廿四
1987年星期日	农历丙寅年十二月初五
1988年星期一	农历丁卯年十一月十五
1989年星期三	农历戊辰年十一月廿七
1990年星期四	农历己巳年十二月初八

记事

· 作业提示 ·





养鸡设备与用具

(1) 房 舍

0~6 周 龄 地面平养25~15只/米²。

立体笼养60~40只/米²。

7~20周龄 20~6 只/米²。

21~72周龄 蛋用鸡地面平养 5~6 只/米²，立体笼养13~15只/米²；肉用鸡地面平养 3~4 只/米²。

(2) 养鸡用具

① 饲槽

0~6 周 龄 饲槽规格 4 × 5 × 100厘米³，每只雏鸡饲槽位置 5 厘米，每个饲槽供40只雏鸡用。

7~20周龄 饲槽规格 6 × 6 × 120厘米³，每只鸡 8 厘米。

21~72周龄 饲槽规格 8 × 10 × 120厘米³，每只鸡 10厘米。

② 水槽

雏鸡每只 2 厘米。成鸡每只 5 厘米，如用水盆，每 50只鸡一个。

③ 产蛋箱

每联分 3~4 个格，格高25厘米，宽25厘米，深35厘米，每格供 4~5 只产蛋母鸡用。

④ 栖架

前腿高30厘米，后腿高40厘米，木条宽 3 厘米，深 4 厘米，上呈半圆。木条长150~200厘米，木条间距35厘米。木条 4~5 根。每只鸡占20厘米位置。

一 月

5

1985年星期六 农历甲子年十一月小寒
1986年星期日 农历乙丑年十一月小寒
1987年星期一 农历丙寅年十二月初六
1988年星期二 农历丁卯年十一月十六
1989年星期四 农历戊辰年十一月小寒
1990年星期五 农历己巳年十二月小寒

记 事

• 作业提示 •



鸡和猪缺乏维生素B₁时，就会食欲减退、衰弱、消化不良，引起心脏障碍，并导致公母畜生殖机能降低。禾本科子实及糠麸类饲料维生素B₁含量多。



“小猪游，大猪囚”。



繁殖计划

(1) 蛋用鸡种蛋100枚

孵出混合雏80只；

0~20周龄成活70只（育雏率85%），公母比为1:1，20周龄时可得母鸡35只，即每3枚种蛋能育成1只母鸡。

(2) 肉用鸡种蛋100枚

孵出混合雏70只；

0~20周龄成活60只（育雏率85%），公母比为1:1，20周龄时可得母鸡30只。

家禽配种比例

家禽配种比例应适当，只有这样，才能保证种蛋有很高的受精率。

蛋用鸡公母配种比例为 1 : 12~15；

兼用鸡 1 : 10~12；

肉用鸡 1 : 8~10；

蛋用鸭 1 : 15~20；

兼用鸭 1 : 10~15；

肉用鸭 1 : 8~10；

鹅 1 : 4~6。

一 月

6

1985年星期日 农历甲子年十一月十六
1986年星期一 农历乙丑年十一月廿六
1987年星期二 农历丙寅年十二月小寒
1988年星期三 农历丁卯年十一月小寒
1989年星期五 农历戊辰年十一月廿九
1990年星期六 农历己巳年十二月初十

记 事

· 作业提示 ·



养猪户的猪种选择：养育肥猪不要选购纯种仔猪，应选购二品种或多品种杂交仔猪。



冬季天气寒冷，时刻要注意妊娠母羊临产征状，防止羔羊产在舍外。



“马无夜草不肥”。



怎样给母羊接产

接产前应将分娩母羊的尾根、外阴部、肛门洗净，并用1%来苏儿水液消毒，用布擦干。

正常分娩的母羊，其羔羊一般是随羊膜先露出两前肢和头部。当羊膜破水后10~30分钟，羔羊头便能顺利产出，不需助产。如羔羊露出前肢和嘴巴时间较长，且母羊无力产出时，需用手握住两前肢，随着母羊的努责，顺势向后下方轻拉，羔羊即可产出。另种方法是随母羊努责，用手向后上方推动腹部，反复几次即能产出。

母羊难产比较少见。遇有胎位不正的，要把母羊后躯垫高，将胎儿露出部分送回，手入产道，纠正胎位。胎儿过大，可先帮助母羊将阴部撑大，把胎儿的两前肢拉出来再送进去，重复3~4次。然后一手拉前肢，一手扶头，随着母羊的努责，慢慢向后下方拉出。遇有阵缩及努责微弱的母羊，可用两手指伸入母羊肛门内，隔着直肠壁顶住胎儿的后头部，与子宫阵缩配合拉出，严防用力过猛和伤及产道。



一 月

7

1985年星期一 农历甲子年十一月十七

1986年星期二 农历乙丑年十一月廿七

1987年星期三 农历丙寅年十二月初八

1988年星期四 农历丁卯年十一月十八

1989年星期六 农历戊辰年十一月三十

1990年星期日 农历己巳年十二月十一

记 事

• 作业提示 •



对缺奶的双羔、死去母羊的羔羊，要找产羔日龄相近的奶好的母羊过哺或代哺。



遇有大风雪天或气温太低时，要适当给貂舍盖些保温物，貂窝里要絮些干净的垫草。



“草膘、料力、水精神”。



怎样给羔羊断脐、擦干、称重

脐带以自然断裂为好。当母羊产后站起时，脐带往往自然断裂。或用手轻拉羔羊前肢，促使脐带自断，在脐带断端涂 5% 碘酒消毒。如脐带未断，在距离腹部 5~8 厘米处用手指拧断，然后消毒。断脐带切不要用剪刀、刀片切断，也不要结扎脐带。这样做会影响渗出液的排出，反而易感染疾病。

羔羊产出后，应尽快将羔羊口、鼻、耳内粘液擦净，以免呼吸困难窒息死亡，或误咽羊水，造成异物性肺炎。羔羊身上的粘液，应尽量让母羊舔干。母羊不舔时，可在羔羊身上撒些麸皮或将羔羊身上粘液涂在母羊嘴上，引诱母羊舔干。如果母羊仍不肯舔羔羊身上粘液，应尽快用干布或草把子将羔羊全身擦干，免得羔羊受凉，引起感冒。

待羔羊毛干后，进行称重和登记。称初生重应在第一次哺乳前、毛干后立即进行。