

傷寒論參注

四



傷寒論目錄

長沙公自序卷之首

辨太陽病脉證第一

上篇

桂枝湯 五苓散 桂枝加附子湯 桂枝加桂湯 桂枝

人參湯 葛根黃連黃芩湯 桂枝去芍藥湯 桂枝

去芍藥加附子湯 桂枝加厚朴杏仁湯 桃核承氣湯

抵當湯 十棗湯 大陷胸湯 大陷胃丸 蜜蛤散

白散

共十四方

中篇



麻黃湯 小建中湯 茯苓甘草湯 芍藥甘草附子湯

禹餘糧丸 方缺 桂枝新加湯 麻黃杏仁甘草石膏

湯 桂枝甘草湯 茯苓桂枝甘草大棗湯 厚朴生薑

甘草半夏人參湯 生薑瀉心湯 甘草瀉心湯 大黃

黃連瀉心湯 附子瀉心湯 半夏瀉心湯 赤石脂禹

餘糧湯 大柴胡湯 旋覆代赭石湯 小陷胸湯 散 柴

胡桂枝湯 柴胡加龍骨牡蠣湯 炙甘草湯 四逆湯

梔子厚朴湯 梔子乾薑湯 梔子豉湯 梔子甘草

豉湯 梔子生薑豉湯 乾薑附子湯 茯苓桂枝朮甘

草湯 抵當丸 桂枝附子湯 桂枝附子去桂枝加朮

湯 甘草附子湯 麻黃連軀赤小豆湯 梔子蘘皮湯

共三十方

下篇

大青龍湯 真武湯 桂枝麻黃各半湯 桂枝二越婢

一湯 桂枝二麻黃一湯 桂枝湯去桂加茯苓朮湯

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯
桂枝甘草龍骨湯
桂枝甘草湯
芍藥甘草湯
茯苓四逆湯
黃連湯
小青龍湯
白虎加人參湯
白虎湯

共一十五方。篇中有證象陽旦句而原文未著陽旦湯
方喻氏因謂桂枝湯加黃芩則名陽旦湯加桂則名陰旦
湯意近傳會
姑存其說
見後麻象陽旦條下

辨陽明病脉證第二

上篇

小承氣湯
調胃承氣湯
猪苓湯
茵陳蒿湯
共四方

中篇



蜜導煎方

猪膽汁方

土瓜根方

大承氣湯

麻

丸

共五方

下篇

辨少陽病脉證第三

小柴胡湯

柴胡桂枝乾薑湯

共五方

附合病併病第四

附字頂格予寫

桂枝加葛根湯

葛根湯

葛根加半夏湯

黃芩湯

黃芩加半夏薑湯

共五方



壞病第五

痰病第六

似低一字

瓜蒂散

辨太陰病脉證第七

桂枝加芍藥湯
共二方

桂枝加大黃湯

辨少陰病脉證第八

前篇

麻黃附子細辛湯
黃湯 白通湯

白通加人尿

麻黃附子甘草湯
吳茱萸湯
通脉四逆湯

目次

四逆湯



共七方

後篇

黃連阿膠湯 桃花湯 豬膚湯 甘草湯 桔梗湯
半夏散及湯 苦酒湯 四逆散

共八方

辨厥陰病脉證第九

烏梅丸 當歸四逆湯 當歸四逆加吳茱萸生薑湯
麻黃升麻湯 乾薑黃連黃芩人參湯 白頭翁湯

共六方

過經不解第十



柴胡加芒消湯

差後勞復食復陰陽易病第十

枳實梔子豉湯 牡蠣澤瀉散 理中丸 竹葉石膏湯

燒裨散

共五方

以上三行俱低一格

溫病第十

傷寒論後編目錄

辨症濕暍病脉證第十

辨霍亂病脉證第十四

辨脉法第十五

另作一頁
後編之前



平脉法第廿六

可汗第廿七

不可汗第廿八

可吐第廿九

不可吐第卅

可下第卅一

不可下第卅二

序例附卷末



傷寒論參註

王更生求正錄

辨太陰病脉症

金鑑曰太陰濕土純陰之藏故病邪從陰化者多從陽化者少喻氏曰篇中文止九條方止二道原其所以約畧之意言中風不言傷寒言桂枝不言麻黃言當溫者曰四逆輩全是引伸觸類之妙治法但清其風寒之源以定發表之法更於腹之或滿或痛辨其虛實以定當下當溫了無餘義矣胡章及曰太陰之法散見六經六經之症未有能外太陰者以脾為一身之主也脾氣強健何病不愈否則皆不驗矣

太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必

胸下結鞭



吳人駒曰自利益甚四字當在必胸下結鞭句之下喻氏
曰腹滿自利太陰之本證也吐而食不下則邪迫於上利
甚而腹痛則邪迫於下上下交亂胃中空虛此但可溫補
而不可下也太陰之脉布胃中寒邪犯之故見腹滿時痛
食不下
諸症

太陰中風四肢煩痛陽微陰濡而長者為欲愈

脾主四肢太陰中風故煩痛陽微陰濡太陰病脉
長則得胃中陽氣以和之元氣未漓故欲愈也

太陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯

舒氏曰症屬裏陰脉雖浮亦不可發汗即令外兼太陽表
症當以理中為主內加桂枝兩經合治此一定之法也今
但言太陰病未見太陽外症只據脉浮即用桂枝
湯專治太陽不顧太陰大不合法恐亦後人有錯



傷寒脈浮而緩手足自溫者是為繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞭者為陽明病也此條喻氏彙在陽明篇末以明太陰有轉屬陽明之義蓋胃實則大便鞭故為轉屬陽明脾實則腐穢去故為繫在太陰應入太陰篇中義例方合

自利不渴者屬太陰以其藏有寒也當溫之宜服四逆輩

喻氏曰以自利不渴者屬太陰以自利而渴者屬少陰分經辨症所關甚鉅太陰屬濕土熱邪入而蒸動其濕則顯有餘故不渴而多發黃少陰屬腎水熱邪入而消耗其水則顯不足故口渴而多煩躁舒氏曰此論雖精究非確義蓋口渴症有實熱亦有虛寒熱邪傷津而作渴者必小便短大便鞭也若自利而渴者乃火衰也寒中少陰腎陽受困火衰不能薰騰津液故渴法主附子助陽溫經正如釜底加薪氣水上升而渴自止若寒在太陰於腎陽無關故自利而不作渴然溫熱寒濕皆能致利未可概以為熱入而蒸動其濕也

傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以



脾家實穢腐當去故也

程知曰太陰脉本緩浮緩雖似太陽中風而手足自溫則不似太陽之發熱更不似少陰厥陰之厥逆所以為繫在太陰也小便利則濕熱下泄而不發黃此雖暴煩頻利有似少陰之症然以脉浮緩手足溫知其人脾氣實而非虛寒之比其濕熱所積之穢腐自當逐之而下也愚按煩症寒熱虛實皆有之此以暴煩手足自溫知脾中陽氣與邪相并戰勝而穢腐自去故雖下利必自止也不可不能發黃已耳喻氏撮附陽明篇末而續之曰至七八日大便秘者為陽明病也以明太陰有轉屬陽明府症蓋彼以胃實而便秘故為轉屬陽明此以脾實而下穢腐故繫在太陰也

此下
補入前
條

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥

湯主之

舒氏曰此條因誤下而傷脾中之陽不能健運升降失職
壅而為滿或甚而痛法當益氣補中驅陰散寒則脾氣復
理而病自愈桂枝湯不可用也方內重加芍藥尤不通
病本陰氣壅滿芍藥酸寒凝滯生陰之物豈可用乎

桂枝加芍藥湯方

於桂枝湯方內更加芍藥三兩隨前共六兩餘依桂枝湯法

大實痛者桂枝加大黃湯主之

此上二條舊註作一條解言太陽病誤下而傳太陰腹滿
時痛者宜桂枝加芍藥湯大實痛者宜桂枝加大黃湯也
柯氏發明二方主治之義最為寶貴動聽不思太陽病一
下而遂至腹中滿痛或大實痛其不可復用酸寒藥攻下
藥當不待智者而後知也總因叔和偽造陷胸瀉心各方
祇知病氣乘虛入裏之為實熱而不知元氣無辜被奪之

再按腹者太陰之部故
腹滿時痛為繫在太
陰若以大實痛者為
轉屬陽明則必具潮
熱自汗譫語躁煩諸
府證於太陽經脈不
相涉矣
也
湯火不可混用桂枝

益虛寒以致印定後人心目縱有聰明才辨都為所用每
於大無理處極意周旋曲護其真非以成其假是雖讀書明
理之士尚猶如是碌
碌者流何足責哉嘻

桂枝加大黃湯方

桂枝 三兩 大黃 二兩 芍藥 六兩 甘草 二兩 生薑 三兩

大棗 十二枚 擘

右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

太陰為病脈弱其人續自便利設當行芍藥大黃者宜減之以
其人胃氣弱易動故也



傷寒 張蓋仙曰脉弱便利何以又有當
行芍藥大黃之症其傳者之訛乎

太陰病欲解時從寅至丑上



本草綱目卷之六

桂枝 芍藥 黃芩 知母 甘草 大黃 芒硝 枳實 厚朴 木香 丁香 沉香 降香 蘇合 安息 乳香 沒藥 阿膠 龜板 虎骨 狗寶 熊膽 猴棗 蛇膽 蜈蚣 蟾蜍 麝香 蘇合 安息 乳香 沒藥 阿膠 龜板 虎骨 狗寶 熊膽 猴棗 蛇膽 蜈蚣 蟾蜍 麝香

大棗 十二枚

右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

本經師治諸邪氣逆氣利設常行等藥大黃古經疏之以

人得此藥大黃主其新香之脂平

