

21 世纪新农民文库

—— 特色果蔬栽培丛书 ——

TESE GUOSHU ZAIPEI CONGSHU

红龙果 高产 栽培技术

HONGLONGGUO GAOCHAN ZAIPEI
JISHU

林金良 李邦模 李发林 陈启治 编著

广西科学技术出版社





红龙果高产栽培技术

组稿编辑\姜连荣

责任编辑\姜连荣

\李永桃

特约编辑\亢霞生

责任校对\周华宇

\商海莲

封面设计\潘爱清

责任印制\熊美莲

ISBN 7-80666-292-8



9 787806 662922 >

ISBN 7-80666-292-8/S · 53 定价:6.50 元

特色果蔬栽培丛书

红龙果高产栽培技术

林金良 李邦模 编著
李发林 陈启浩

广西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

红龙果高产栽培技术/林金良等编著. —南宁: 广西科学技术出版社, 2002

(特色果蔬栽培技术丛书)

ISBN 7-80666-292-8

I. 红... II. 林... III. 热带果树—果树园艺

IV. S667.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 077417 号

特色果蔬栽培丛书

红龙果高产栽培技术

林金良 李邦模 李发林 陈启浩 编著

*

广西科学技术出版社出版

(南宁市东葛路 66 号 邮政编码 530022)

广西新华书店发行

广西博莱经贸有限责任公司印刷

(南宁市望州路 251 号 邮政编码 530001)

*

开本 787×1092 1/32 印张 3.5 插页 7 字数 72 000

2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—6 000 册

ISBN 7-80666-292-8

定价: 6.50 元

S·53


本书如有倒装缺页, 请与承印厂调换



↑ 编著者林金良先生




↑ 编著者李邦模先生




←

台湾新玫瑰红一号(红
皮红肉类红龙果)



→

台湾新玫瑰红二号(红
皮红肉类红龙果)



←

台湾新玫瑰红三号(红
皮红肉类红龙果)



↑ 黄皮白肉类红龙果外形与果肉图



↑ 红皮橙红肉类红龙果与黄皮白肉类红龙果同属,果实大小和糖度与黄皮白肉类红龙果相当



←

红皮红肉类红龙果外形与果肉图

→
黑金刚系列——红皮白肉类红龙果





在大棚内培育的嫁接砧木——番鬼莲



采用切接法的果苗嫁接部位



采用平接法的果苗嫁接部位


→
等待出售的成批
红龙果幼苗



←

定植前的红龙果嫁接幼苗

↓ 左为红皮白肉类红龙果肉茎, 中为
黄皮白肉类红龙果肉茎, 右为红皮红
肉类红龙果肉茎





↑ 采用自由放任法定植的红龙果树形



→ 采用单柱法定植的红龙果幼苗



← 刚刚定植后的大田图

→

定植 1 年后的大田图



←

每年挂果结束前后，
肉茎重新萌发出秋冬
梢，将成为来年的挂
果肉茎



→

适合盆栽的无刺红皮
红肉类红龙果





黄皮白肉类红龙果
的初生花苞



↑ 红皮红肉类红龙果的初生花苞



即将开放的红皮白肉类红龙果花苞

→

即将开放的黄皮白
肉类红龙果花苞



↑ 盛开的红龙果花朵

→

刚凋谢 2 天的黄皮白肉
类红龙果花朵及雏果





←

刚刚凋谢的红皮红
肉类红龙果花朵



←

红龙果喜欢在自然
下垂的肉茎上挂果



←

子房受孕 72 小时
后,黄白色的花萼与
绿色果房之间形成
一条明显的隔离带

→
将花萼与果房自黄白色隔离带
折断拉出,花萼可作蔬菜食用

↓ 如果遇到连续阴雨天,裸露的柱头
很容易腐烂,应及时按图所示摘除柱
头



→
左起第二个黄色果属
授粉不良,4~5 天将自
行脱落。左起第一个
果也为授粉不良,虽
然成熟但个小,不具
有商品价值





←

同一结果肉茎上相隔
25 天以上的果实和
花朵，可以不用疏花
疏果

→

挂果 28 天后，果皮
开始转红，果实不再
膨大



←

成熟的红皮白肉类
红龙果挂果状

→
成熟的红皮红肉类
红龙果挂果状



←
成熟的黄皮白肉
类红龙果挂果状

→
鲜果采用礼品盒
装出售,可提高售价

