

重修政和經史證類備用本草

十五



重修政和經史證類備用本草卷第十四

己酉增補

成都唐慎微續證類

審定  
鑒定  
校讎  
卷第十四  
增補  
己酉  
新編  
成都唐慎微續證類

敕校勘

木部下品總九十九種



一十八種神農本經

白字

七種名醫別錄

墨字

二十一種唐本先附

注云  
唐附

一十七種今附

皆醫家嘗用有  
效注云今附

九種新補

一種新定

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

**巴豆**

**訶梨勒**

隨風子  
附唐附

**蜀椒**

目葉崖椒  
續注

**皂莢**

鬼皂莢  
續注

**棟實**

即金鈴子也  
根附皮續注

**莽草**

**無食子**

唐附

**黃藥根**

今附

**雷丸**

**槲若**

唐附  
皮附

**白楊皮**

唐附

**桃榔子**

今附

**蘇方木**

唐附

**櫟樹皮**

葉山櫟  
續注

**桐葉**

花梧桐皮  
油續注

**胡椒**

唐附

**釣樟根皮**

樟梓  
續注

**千金藤**

今附

**南燭枝葉**

今附

**猝白皮**

附葉

**橡實**

唐附櫟樹  
皮續注

**石楠**

實附

**木天蓼**

唐附子  
續注

黃環	益智子	搜
鼠李	椰子皮	疏
小天蓼	小蘖	疎
紫荆木	紫真檀	音矩
南藤	烏臼木	音矩
接骨木	楓柳皮	枳止
樟木皮	鹽麴子	枳止
藥荆	扶移木	根
蔓椒	檻藤子	根
突厥白	赤爪	根
賣子木	木鼈子	根
婆羅得	榧實	根
藥實根	釣藤	根
感藤	赤櫟木	根
突厥白	藥華	根
蔓椒	扶移木	根
藥荆	檻藤子	根
突厥白	赤爪	根
蔓椒	木鼈子	根
突厥白	榧實	根
蔓椒	釣藤	根
突厥白	赤櫟木	根
蔓椒	藥華	根

甘露藤

新補

大空

唐附

椿莢

定新

水楊葉

唐附

楊櫬木

唐附

檣子

新補

NING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

南京中醫藥大學

1951

芫花

本草  
部今移

黃櫬

新補

棲櫬子

皮附  
新補

木槿

新補

二十六種陳藏器餘

栟櫚木

楸木皮

沒離梨

柯樹皮

敗扇

松根

櫟木灰

榔桐皮

竹肉

桃竹筍

颺子桐子

馬瘡朮

木細辛

百家筋

檼木皮

巴豆味辛溫生溫熟寒有大毒主傷寒溫瘧寒熱破

戎州巴豆



刀鞘  
結殺  
檀  
爪蘆  
諸木有毒  
石荊  
木黎蘆

芙蓉

丹桂

木皮

杓

車家雞棲木

癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩練五藏六腑

開通閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒盡症邪物殺蟲

魚療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺班貓

毒可練餌之益血脉令人色好變化與鬼神通一名色

椒生巴郡川谷八月採陰乾用之去心皮

芫花爲之使  
惡蘋草畏大

黃連蘆薈陶隱居云出巴郡似大豆最能瀉人新者佳用之皆去心皮乃秤又熬令黃黑別擣如膏乃和丸散爾道方亦有練餌法服之乃言神仙人吞一枚便欲死而鼠食之三年重三十斤物性乃有相耐如此爾唐本注云樹高丈餘葉似櫻桃葉頭微赤十二月葉凋至四月落盡五月葉漸生七月花八月結實九月成十月採其子三枚共蒂各有殼裹出眉州嘉州者良

金按陳藏器本草云巴豆主

癰癧瘍氣痞滿腹內積聚冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片并四邊不得有損鉗吞之以欹壓令下少閒腹內熱如火痛出惡物雖痛不虛若久服亦不痢白膜破者棄之生南方樹大如圍極高不啻一丈也呂禹錫等謹按藥性論云巴豆使中其毒用黃連汁大豆汁解之忌蘆筍醬豉冷水得火良殺班貓蛇虺毒能主破心腹積聚氣治十種水腫

日善子

云通宣一切病泄壅滯除風補勞健脾開胃

痿痺大腹能落胎  
消瘀破血排膿消腫毒殺腹藏蟲治惡瘡息肉及疥癩丁腫凡合丸散炒不如去心膜煮五度換水各煮一沸

圖經曰

巴豆出巴郡川谷今嘉眉戎州皆有之木高一二丈葉如櫻桃而厚大初

生青後漸黃赤至十二月葉漸凋二月復漸生至四月舊葉落盡新葉齊生即花發成穗微黃色五六月結實作房生青至八月熟而黃類白豆蔻漸漸自落即收之一房有三瓣一瓣有實一粒一房共實三粒也戎州出者殼上有縱文隱起如線一道至兩三道彼土人呼爲金線巴豆最爲上等

它處亦稀有

人雷公云

凡使巴豆之與豆及剛子須在子細認勿誤用殺人巴顆小緊實色黃豆即顆有三棱

色黑若剛子顆小似棗核兩頭尖巴與豆即用剛子勿使凡修事巴豆敲碎以麻油并酒等可煮巴豆了研膏後用每服事一兩以酒麻油各七合

聖惠方

治中風口渴巴豆七枚去皮研喝左塗右

盡爲度心須臾即便正洗去藥并頻抽掣中指

又方

治牙疼用巴豆一粒煨至黃熟去殼用蒜一瓣切一頭作蓋剜去中心可安巴

瓦在內以蓋子合之用綿裹隨患處左右塞耳中

外臺秘要

聲皮膚黑名曰水蠱巴豆

九十枚去心皮熬令黃杏人六十枚去皮尖熬令黃二味擣丸如小豆大水下一丸以利爲度勿飲酒

人小兒風癩癰瘍心迷悶方巴豆二兩槌破以水七升煮取三升以帛染拭之

又方

治寒癥宿食久飲不消大便秘巴豆人一

本草古口

千金方

大主

升清酒五升煮三日三夜研令大熟合酒微火煎  
之丸如胡豆大每服一丸水下欲吐者服二丸  
者巴豆去皮針線穿入喉中牽出

## 千金翼

治小兒身腫并手足腫兼癰瘍

巴豆五十枚去皮心以水二升煎取一升

外

又方 治喉痺已死有餘氣

用綿於湯中經驗方 隨手拭之

## 又方

鄭解侍御傳治氣痢

巴豆兩去皮心熬細末飲下量力加減

鈍入箭瘻裹

服之牛肝尤佳如食素人以蒸餅丸服

## 又方

治耳聾聾巴豆一粒蠟裹

針刺令通透用塞耳中

又方 治箭瘻入

骨不可拔取巴豆微熬與蜣螂同研塗所傷處斯須痛定微痒忍之待極痒不可忍便撼動箭鏃即拔之立出夏疾

鄭云初在潤州得方後

箭鏃出後速以生肌膏傅之說者云兼治瘡瘍得方後

至洪州旅舍主人妻患背瘡呻吟嘔嘔用此方試之愈

勝金治瘡瘍

治疥瘍

喉風巴豆兩粒紙緊角可通得入鼻用刀子切斷兩頭殼子將針穿作孔子內鼻中久即差

十全方 治疥瘍

巴豆十

粒火炮過黃色去皮膜右順手研如麵入酥少許膩粉少許同研勻爪破以竹篦子點藥不得落眼裏及外腎上如熏劄着外腎以黃丹塗甚妙

初虞方 治藥毒祕効巴豆去皮不出油馬牙消等分合研成膏冷水化一彈子許服差

賈相公進過牛經牛有卒疫動頭打肋者以巴豆兩箇去皮搗末生油二兩淡漿水半升灌之差

蜀椒味辛溫大熱有毒主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒以服之頭不白輕身增年開腠理通血脉堅齒髮調關節耐寒暑可作膏藥多食令人乏氣口閼者殺人一名巴椒一名蕕音唐數音穀



# 生武都川谷及巴郡八月採實陰乾

杏人爲之使畏欵冬  
陶隱居

云出蜀都北

疏

部人家種之皮肉厚腹裏白氣味濃江陽晉原及建平間亦有而細赤辛而不香力勢不如巴郡巴椒有毒不可服而此爲一名恐不爾又有秦椒黑色在中品中凡用椒皆火微熬之令汗出謂爲汗椒令有熱力椒目冷別入藥用不得相雜唐本草云椒目味苦寒無毒主水腹脹滿利小便今椒出金州西城者最善呂禹錫等謹按爾雅疏云燭者大椒之別名郭云今椒樹叢生實大者名爲櫟詩唐風云椒聊且陸機云椒樹似茱萸有針刺葉堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以爲香今成臯諸山間有椒謂之竹葉椒其樹亦如蜀椒少毒熱不中合藥也可著飲食中又用蒸雞豚最佳香東海諸島上亦有椒樹枝葉皆相似子長不圓甚香其味似橘皮島上獐鹿食此椒葉其肉自然作椒橘香藥性論云蜀椒使畏雄黃又名陸撥有小毒能治冷風頑頭風下淚腰脚不遂虛損留結破血下諸石水能治嗽主腹內冷而痛除齒痛又云椒目使治十二種水氣味苦辛有小毒主和巴豆菖蒲松脂以蠟溶爲筒子內耳中抽腎氣虛耳中如風水鳴或如打鍾磬之聲卒暴聾一日一易若神驗曰藥子云漢椒破癥結開胃治天行時氣溫疾產後宿血治心腹氣壯陽療陰汗暖腰膝縮小便椒目主膀胱急又云椒葉熱無毒治黃疸伏梁氣及内外腎鈞并霍亂轉筋和艾及葱研以醋湯排暑並得圖經

曰

蜀椒生武都川谷及巴郡今歸峽及蜀川陝洛間人家多作園圃種之高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而滑可煮飲食甚辛香



四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓皮紫赤色八月採實焙乾此椒江淮及北土皆有之莖實都相類但不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈耳服食方單服椒紅補下宜用蜀椒也韋宙獨行方治諸瘡中風者生蜀椒一外取少麪合溲裹椒勿令漏氣分作兩裹於塘灰火中燒熟及熱出之刺頭作孔當瘡上置著使椒氣射入瘡中冷則易之須臾瘡中出水及遍體出汗即差施州又有一種崖椒彼土人四季採皮入藥云味辛性熱無毒主肺氣上喘並效嗽并野薑筍未酒服錢匕甚効忌塗下又有蔓椒條云生雲中川谷及丘冢間採莖根煮釀酒陶隱居云俗呼爲擗似椒薰音薰小不香耳今亦無復分別或云即金椒是也薰子出閩中江東其木似桺莖間有刺子辛幹如椒主遊蠭飛尸及腹冷南人滌藏以作果品或以寄遠吳越春秋云越以甘蜜九攢與薰同報吳增封之禮然則薰之相贈尚矣

**雷公去** 一名南椒凡使須去目及閉口者不用其椒子先湏酒拌令濕蒸從巳至午放冷密蓋除向火四畔無氣後取出便入甕器中盛勿令傷風用也

**食療** 云溫粒大者主上氣咳嗽久風濕痺又患作餛飩灰中炮之使熟斷空心吞之三五匙飯壓之再服差又椒溫辛有毒主風邪腹痛痺寒溫中去齒痛堅齒緩明目止嘔逆減癥生毛髮出汗下氣通神去老益血利五臟治生產後諸疾下乳汁久服令人氣喘促十月勿食及閉口者大忌子細黑者是秦椒白色也

聖惠方

因治

熱取涼睡有她入口中挽不出用刀破外臺秘要治瘡腫生椒  
她尾內生椒三三粒裹著湏臾即出

### 千金方

有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜  
末之以大醋和傅之

丸囊令厚半寸湏臾熱氣

大通日而易之取消差

一孔當瘡上掩之引風出

可作數枚以差替換之妙

食之損氣傷

### 又方

治心腹俱痛以布裹板薄

並藥擣傅之止

心令人多忘

注上火熨令板汗出良

### 又方

治腹內虛

并藥擣傅之止

云十月

勿食椒

### 斗門方

治腹內虛

冷火服駐

### 孫真人

治腹內虛

勿食椒

### 深師方

治手足皴

治小兒水瀉

南京中醫藥大學

勝金方

治好食生茶用椒末不限多少

人思飲食妙

以糊丸如梧子大茶下十九

裂椒四合水煮之去滓瀆之半食項出

并藥擣傅

令燥湏臾復浸乾塗羊豬髓腦極妙

調之少少傅

腦上日可三度

譚氏用椒二兩醋二升煮醋盡慢火焙乾爲末

器貯之每服二錢

匕酒或米飲下之

又方治漆瘡漢椒

湯洗之即愈

援神契

補益聰明行義

治小兒水瀉散及人年五十以上患癥

竹筒中以粳米之播取紅如米盡更揀更春以盡爲度凡用椒湏

入

蜀椒湏微炒使汗出又湏去附紅黃殼去殼之法先微炒乘熱入

竹筒中以粳米之播取紅如米盡更揀更春以盡爲度凡用椒湏

入

姚和衆

治小兒水瀉散及人年五十以上患癥

一分去目爲末

1951

如此其中子謂之椒目治盜汗尤功將目微炒搗爲極細末用半錢  
匕以生豬上脣煎湯一合調臨睡服無不效蓋椒目能行水又治水盜

猪牙皂莢

皂莢



皂莢味辛鹹溫有小毒主風癰死肌邪氣風頭瘡出刺丸

竅殺精物療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明

目益精可爲沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如猪

牙者良九月十月採莢陰乾

柏實爲之使惡麥門冬畏空青人參苦參陶隱居云今處處有長尺二者良俗人見其皆有蟲孔而未嘗見蟲形皆言不可近令人惡病殊不爾其蟲狀如草菜上青蟲莢微欲黑便出所以難見爾但

取青莢生者看自知之

**唐本注**

云此物有三種猪牙皂莢最下其形

曲戾薄惡全無滋潤洗垢不去其尺二寸者龐大長虛而無潤若長

六七寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好

**目禹錫等謹按藥性論**

云皂莢使主破堅癥腹中痛能墮胎又曰將皂莢於酒中取盡其精

於火內煎之成膏塗帛貼一切腫毒兼能止疼痛

**陳藏器**

云鬼皂莢

作浴湯去風癩疥癬投葉去衣垢沐髮長頭生江南澤畔如皂莢

州川谷及魯鄒縣今所在有之以懷孟州者為勝木極有高大者此

有三種本經云形如猪牙者良陶注云長尺二者良唐注云長六寸

圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好今醫家作疎風氣丸煎多用長

皂莢治齒及取積藥多用猪牙皂莢所用雖殊大抵性味不相遠九

月十月採莢陰乾用張仲景治雜病方欬逆上氣唾濁但坐不得卧

皂角丸主之皂莢杵末一物以蜜丸大如梧子以棗膏和湯服一丸日

三夜一服崔元亮海上方療腹脹滿欲瘦病者猪牙皂角相續量長

一尺微火煨去皮子搗篩蜜九大如梧子欲服藥先喫煮羊肉兩瓣

呷汁三兩口後以肉汁下藥十九以快利為度覺得力更服以利清

水即停差後一月已來不得食肉及諸油膩又治熱勞以皂莢長一

尺續成者亦可湏無孔成實者以土酥一大兩微微塗於火上緩灸

之不得令酥下待酥盡即搗篩蜜丸如梧子大每日空腹飲下十五

丸漸增至二十九重者不過兩劑差其初生嫩葉芽以為蔬茹更益

人核中白肉亦入治肺藥又炮核取中黃心嚼餌之治膈痰吞酸又

**白華子**

云皂莢通關節除頭風消痰殺勞蟲

**圖經**

曰

皂莢

出雍

南京中医药大学图书馆版权所有



米醋熬嫩刺針作濃  
煎以傅瘡癬有奇効

雷公云

凡使湏要赤膩肥并不艸者然用新汲水浸一宿了用銅刀削上龜

皮用酥反覆炙酥盡爲度然出搥之去子擣收得揀取圓滿堅硬不蛀者用瓶盛下水於皮一重了取向裏白嫩肉兩片去黃其黃消人腎氣將白兩片用銅刀細切於日中乾用

篩皂莢一兩酥二分子  
火畔煮待泡熟剝去硬  
壳治時氣三日頭痛煩

**要** 熱用皂角燒作灰爲末。非時新汲水一中盞生薑少許和二錢服之。先用暖水淋浴後服藥酒。更江治卒中風口渴以皂角五兩去皮爲末。以年大醋和右渴塗左。左渴塗右乾更傳之。善

五二  
又方  
齧齒方擣  
盥出愈  
外臺秘

炙爲末塗  
齒上吐之

溺死一宿者尚活擣皂角紙裹內下部湏臾出水即活

**千金方** 鳴臯灸皂  
角末如小

豆以竹管吹入臯中又方

鬼魘不悟皂英  
末刀圭起死人

又方

吞皂角  
枚立差

肘後方

卒腫滿身面洪用  
一斗漬合器煮令

用皂角剥炙令黃坐三外  
水沸服一升日三服頻作

酒

**又方** 小兒身上惡瘡先以皂角水洗

拭乾以少油麻擣爛傳燒即差經驗方

治食氣遍身黃腫氣喘令不駐皂角去皮及子塗好

食不得心脅滿悶  
好醋條令焦爲末

一錢七巴豆七枚  
三丸食後陳橘

取去油膜二件以淡醋及  
桐皮湯下曰三服隔一日

研好墨爲丸如麻子大每曾一丸以利爲度如常服

消酒  
梅師方

治霍乱轉筋皂莢末  
小豆入臯中導更

吹一  
又方

以利經厥如薄用  
治卒外腎偏疼皂  
莢和皮爲末水調



傳之孫真人

治咳嗽皂莢燒研碎  
二錢七枚湯下之

又方

治大小便不通開格  
利燒皂莢細研粥飲下

不

三錢

又方

傷寒無問陰陽神驗方以皂角一挺肥者燒令

立通治腰脚不覆地取子一千二百箇淨洗令乾少酥熬令香

又方

不

爲末蜜丸如梧子大空心以蒺藜子酸棗子湯下三十丸

死以末

又方

治誤食物落鼻中及入

又方

人好齶以末吹鼻中

又方

卒治

吹鼻中

又方

眼不出吹皂角取嚏

又方

治中風口噤不開涎潮吐方用

又方

皂角一挺去皮塗豬脂灸令黃

又方

治

治卒頭痛以皂角末

又方

吹入鼻中令嚏則止

簡要濟衆

治中風口噤不開涎潮吐方用

又方

皂角一挺去皮塗豬脂灸令黃

又方

治

色爲末每服一錢匕非時溫酒服如氣實脉盛調二錢

七如牙關不開用白梅揩齒口開即灌藥以吐出風涎差

又方

英水并惡水入口內熱痛不止以皂莢子燒存性一分

又方

沙糖半兩先殺研皂子令細續入沙糖勻和如膏含之

又方

治急喉閼逡巡不救方以皂莢去皮

又方

治

分燒爲末揩疼處良

靈苑方

治急喉閼逡巡不救方以皂莢去皮

又方

子生半兩爲末每服少許以飭頭點

又方

腫處更以醋調藥末厚傅項

又方

治卒中風昏昏若醉形體惛

又方

口角似利微有涎出斯湏不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於

又方

不

上膈痺氣不通宜用救急稀涎散

猪牙皂角四挺須是肥實不艸削

去黑皮晉磬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研爲散如有

患者可服半錢重者三字七溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀

又方

治

又方

治

又方

治

又方

不

口角似利微有涎出斯湏不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於

又方

猪牙皂角四挺須是肥實不艸削

去黑皮晉磬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研爲散如有

患者可服半錢重者三字七溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀

又方

治

又方

治

又方

治

不

口角似利微有涎出斯湏不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於

又方

猪牙皂角四挺須是肥實不艸削

去黑皮晉磬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研爲散如有

患者可服半錢重者三字七溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀

又方

治

又方

治

又方

治

不

口角似利微有涎出斯湏不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於

又方

猪牙皂角四挺須是肥實不艸削

去黑皮晉磬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研爲散如有

患者可服半錢重者三字七溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀

又方

治

又方

治

又方

治

不

口角似利微有涎出斯湏不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於

又方

猪牙皂角四挺須是肥實不艸削

去黑皮晉磬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研爲散如有

患者可服半錢重者三字七溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀

又方

治

又方

治

又方

治

不

口角似利微有涎出斯湏不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於

又方

猪牙皂角四挺須是肥實不艸削

去黑皮晉磬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研爲散如有

患者可服半錢重者三字七溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀

又方

治

又方

治

又方

治

不

口角似利微有涎出斯湏不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於

又方

猪牙皂角四挺須是肥實不艸削

去黑皮晉磬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研爲散如有

患者可服半錢重者三字七溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀

又方

治

又方

治

又方

治

不

口角似利微有涎出斯湏不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於

又方

猪牙皂角四挺須是肥實不艸削

去黑皮晉磬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研爲散如有

患者可服半錢重者三字七溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀

又方

治

又方

治

又方

治

不

口角似利微有涎出斯湏不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於

又方

猪牙皂角四挺須是肥實不艸削

去黑皮晉磬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研爲散如有

患者可服半錢重者三字七溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀

又方

治

又方

治

又方

治

不

口角似利微有涎出斯湏不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於

又方

猪牙皂角四挺須是肥實不艸削

去黑皮晉磬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研爲散如有

患者可服半錢重者三字七溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀

又方

治

又方

治

又方

治

不

口角似利微有涎出斯湏不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於

又方

猪牙皂角四挺須是肥實不艸削

去黑皮晉磬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研爲散如有

患者可服半錢重者三字七溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀

又方

治

又方

治

又方

治

不

口角似利微有涎出斯湏不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於

又方

猪牙皂角四挺須是肥實不艸削

去黑皮晉磬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研爲散如有

患者可服半錢重者三字七溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀

又方

治

又方

治

又方

治

不

口角似利微有涎出斯湏不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於

又方

猪牙皂角四挺須是肥實不艸削

去黑皮晉磬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研爲散如有

患者可服半錢重者三字七溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀

又方

治

又方

治

又方

治

不

口角似利微有涎出斯湏不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於

又方

猪牙皂角四挺須是肥實不艸削

去黑皮晉磬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研爲散如有

患者可服半錢重者三字七溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀

又方

治

又方

治

又方

治

不

口角似利微有涎出斯湏不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於

又方

猪牙皂角四挺須是肥實不艸削

去黑皮晉磬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研爲散如有

患者可服半錢重者三字七溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀

又方

治

又方

治

又方

治

不

口角似利微有涎出斯湏不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於

又方

猪牙皂角四挺須是肥實不艸削

去黑皮晉磬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研爲散如有

患者可服半錢重者三字七溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀

又方

治

又方

治

又方

治

不

口角似利微有涎出斯湏不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於

又方

猪牙皂角四挺須是肥實不艸削

去黑皮晉磬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研爲散如有

患者可服半錢重者三字七溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀

又方

治

又方

治

又方

治

不

口角似利微有涎出斯湏不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於

又方

猪牙皂角四挺須是肥實不艸削

去黑皮晉磬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研爲散如有

患者可服半錢重者三字七溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀

又方

治

又方

治

又方

治

不

口角似利微