

# 流行花草

本书详尽介绍了植物的别名、实际应用、产地及习性、栽培管理、繁殖方法、病虫害防治等知识，针对花草的种养问题提出了专业解答意见。

如花的生活，需要我们亲手创造！






S68-64

W373

# 流行花草

家庭养花实用图解系列

王巍 主编



## 图书在版编目 (CIP) 数据

流行花草 / 王巍主编. —长沙：湖南科学技术出版社，  
2010  
(家庭养花实用图解系列)  
ISBN 978-7-5357-5824-8

I. 流… II. 王… III. 观赏园艺—图解 IV. S68-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第147593号

读者如有不明之处或需邮购，请电话联系。

地 址：长沙市车站北路70号万象企业公馆1808

网 址：<http://www.yhcul.com>

长沙市越华文化传播有限公司 邮编：410001

电 话：0731-84444800

家庭养花实用图解系列

## 流行花草

策 划：越华文化

主 编：王 巍

责任编辑：王 燕

编 委：张 苗 陆 林

摄 影：杨 吴

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市湘雅路276号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系：本社直销科 0731-84375808

版式设计： 嘉偉文化

印 刷：长沙湘诚印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址：长沙市开福区伍家岭新码头95号

版 次：2010年第1版

2010年第1次印刷

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：6

书 号：ISBN 978-7-5357-5824-8

定 价：25.00元

(版权所有·翻印必究)

# 前言



# PREFACE



在注重家庭绿化和身心愉悦的今天，用花草美化生活环境已成为一种时尚享受。各类花草从苗圃大棚走进了普通老百姓的家居庭院，并成为人们生活中不可或缺的一部分。许多花草艳丽多姿、形态优美，很适合作装饰之用，无论是用来放在家庭居室中，还是配置在办公楼、公园、休闲广场等场所，都能形成一道靓丽的风景，让人身心愉悦。此外，种植花草还能陶冶情操，放松身心，是减压宽心的有效手段。因此，学会种植护理花草可谓一举多得。

家庭养花实用图解系列丛书之《流行花草》是一本专门介绍当下流行、时尚的花草种植方面知识的书籍。全书从实用角度出发，介绍了花草的别名、实际应用、产地及习性、栽培管理、繁殖方法、病虫害防治等知识，详尽地介绍了多种流行花草的种植要点。全书图文并茂、明了直观，每个品种都配有精美的插图，适合家庭养护花木的花友参考，也适合学生、花卉爱好者学习及参考。

如花的生活，需要我们亲手去创造。

# 目录 CONTENTS



## 第一部分 流行花草的基本知识

- 流行花草的概念与趋势 ..... 3
- 流行花草养护之浇水细则 ..... 4
- 花盆小知识 ..... 5

## 第二部分 29种流行花草的养护要点

- 矮牵牛花 ..... 7
- 金盏菊 ..... 10
- 大花马齿苋 ..... 13
- 扶桑花 ..... 16
- 菊花 ..... 19
- 万寿菊 ..... 22
- 蓝眼菊 ..... 25
- 鸡冠花 ..... 28
- 孔雀草 ..... 31
- 四季海棠 ..... 34
- 勋章花 ..... 37

- 天竺葵 ..... 40
- 贴梗海棠 ..... 43
- 西番莲 ..... 46
- 一串红 ..... 49
- 马蹄莲 ..... 52
- 飘香藤 ..... 55
- 鸳鸯茉莉 ..... 58
- 紫叶酢浆草 ..... 61
- 大叶落地生根 ..... 64
- 虎耳草 ..... 67
- 小叶罗汉松 ..... 70
- 迷迭香 ..... 73
- 碰碰香 ..... 76
- 枪刀药 ..... 79
- 薰衣草 ..... 82
- 一品红 ..... 85
- 银叶菊 ..... 88
- 石莲花 ..... 91



## 第一部分

# 流行花草的基本知识





# 流行花草的概念与趋势

## 一、什么是“流行花草”

顾名思义，“流行花草”是指受到当前社会绝大多数人关注、了解并喜爱的一些花草。它们的共同特点是：易活、易养、耐看、价格低廉。如：开运竹、粉菠萝、仙人掌、金边竹、西红柿等，这类花草既适合办公室人群种植，也适合在家居、酒店、休闲会所、会议室等场所摆放。

## 二、花草的流行趋势

**花形互变型：**即改变传统的花形，使大的变小、小的变大，给人耳目一新的感觉。如用木瓜嫁接的海棠花，直径可达5~12厘米，比普通品种的海棠花大一倍多，而袖珍盆栽碗莲的直径要比池栽碗莲的直径小一半。

**一花多色型：**即花卉由一种颜色或两种颜色变为多种颜色。如荷花本来只有白色和粉红色两种颜色，而现在却有红色、桃红、紫红、浅黄、橙色等多种颜色。又如槐树，普通品种的花为白色，现在则有了黄色和红色等香花槐树新品种。

**造型盆景型：**即各种工艺造型的花卉盆景，可分为一个品种的花木盆景或多个品种的组合盆景。如灵芝盆景、银杏盆景、石榴盆景、枣树盆景、桃树盆景、苹果树盆景等多种造型盆景花卉。

**地栽变盆栽型：**即由室外地栽花卉向室内微型盆栽观赏花卉发展。把一些以前只在池塘、花园、果园等室外露地栽培的较大型花卉变成能在庭院、阳台、街道、办公室栽培的较小型花卉。此类花卉有微型盆栽月季、盆栽荷花、盆栽桃花等花卉品种。

**四季常青型：**即一年四季绿叶常青的树种，此类树种有冬青、松柏、四季杨等。

**速生用材型：**即生长迅速，长大后主要用于加工的树种，如速生杨、速生柳槐、速生型扁桃树等。

**净化绿化型：**即具有显著的杀菌、消毒、绿化环境功能的树种，此类树种有石榴、中林杨系列等。

**观赏美化型：**即枝、叶异于普通品种的树种，具有较高的观赏、美化价值，如金叶国槐、金枝国槐、金丝垂柳、金枝垂柳、红柳、观赏花桃等。

**经济效益型：**即除了美化、绿化功能外，还能在较短时间内形成较大规模的市场效应和经济效益的树种。如扁桃树，不仅具有很好的观赏价值和美化环境的作用，其果仁还富含人体所需的18种微量元素，具有极高的营养价值和药用价值。



# 流行花草养护之 浇水细则



## 草本多浇，木本少浇

草本花卉根系浅，吸收水分能力差，体内需水量多，叶面蒸发快，故浇水应多而勤，夏天除每日浇水外，还应向叶面喷水。木本花卉根系入土深，分布面广，吸水力强，浇水量可适当少些，夏季一般隔日浇一次水即可。

## 叶大质软的多浇，叶小有蜡的少浇

叶片愈大，质地愈软，水分愈易蒸发，应多浇水。叶小有蜡质的花卉，叶面水分蒸发慢，可适量少浇，保持盆土不过干即可。

## 沙质土多浇，黏质土少浇

沙质土疏松，保水性差，宜适当多浇水。黏质土紧实，保水性好，透气性差，浇水不宜过多过勤。

## 天旱多浇，天阴少浇

天气干旱，土壤容易失水，浇水要多而勤，小盆每日浇水2次，大盆每日浇水1次。阴天空气湿度大，叶面及土面水分失量少，浇水量宜少些。

## 旺盛期多浇，休眠期少浇

花卉生长旺盛期需要大量的养分和水分，故应结合施肥多浇水、勤浇水。花卉休眠期时，生长趋于停滞状态，需水量很少，应严格控制浇水。

## 湿生花卉多浇，旱生花卉少浇

龟背竹、吉祥草、唐菖蒲、旱伞草等湿生花卉应多浇水。仙人掌类、玉莲花、南天竹、紫薇、剑麻等旱生花卉要少浇水。

## 天热多浇，天冷少浇

天气炎热的盛夏酷暑，叶面水分蒸发量大，盆土干燥快，浇水要及时，要浇透，有干热风时还应向地面和叶面洒水。在天气严寒、蒸发量少的隆冬时节，花卉生长极其缓慢，甚至停止生长，浇水量应少。





# 花盆小知识

人家说美食美器，其实漂亮的花草，配上漂亮的花盆也能加分。花盆有很多种，从材质上讲有素烧盆、紫沙盆、塑料盆、木盆等，各有各的特点，想要养好花，首先要选好、选对盆。

**素烧盆：**最朴素的花盆。素烧盆的盆壁有细微的孔隙，有利于土壤中的养分分解和排湿透气，是非常能帮助花草根部正常生长的。不足之处是质地粗糙，不够美观，用的年头长了，较易破碎，虽然外形属于下里巴人型，但是许多专业人士喜欢选择这种盆来种花，原因是性价比高。

**紫沙盆：**排水和透气性虽不及素烧盆，但也是比较理想的盆器。而且紫沙制作工艺历史悠久，很多精致古朴的上乘作品会为花卉增添很多韵味，紫沙盆也常用来种植兰花，盆花相衬，自成一景。

**塑料盆：**便宜轻便，色彩造型比较丰富，但也有透气性、排水性差的问题。可以用来栽培吊兰、垂盆草等对养护要求不是很高的植物。

**木盆：**现在市场上有很多木制的花盆、花器，木盆透气、排水性能较好，很适合栽种花草。这些木盆用材大多经过防腐处理，但使用年月略长后，要注意换盆时将盆做一次彻底的消毒、上漆，以免腐烂、生虫。



## 第二部分 29 种

### 流行花草的养护要点





# Ni gian niu hua 矮牵牛花

别名 健子花、矮喇叭  
科属 茄科碧冬茄属  
花语 与你同心

## 实际应用 SHI JI YING YONG

矮牵牛花大色艳，花色丰富，为长势旺盛的装饰性花卉，而且还能做到周年繁殖上市，可以广泛用于花坛布置、花槽配置、景点摆设、窗台点缀、家庭装饰等。



## 产地及习性 CHAN DI JI XI XING

原产于南美洲阿根廷，现世界各地广泛栽培。



喜温暖和阳光充足的环境。不耐霜冻，怕雨涝。生长适温为13℃~18℃，冬季温度在4℃~10℃，如低于4℃，植株生长停止，夏季能耐35℃以上的高温。

## 栽培管理 ZAI PEI GUAN LI

矮牵牛为多年生草本植物，常用作一年生栽培，温室内四季均可播种。发芽适温20℃~25℃，当真叶3~4片时移栽，定植后摘心一次，早秋播种花期最长，花期4~10月。

幼苗长出5~6片真叶时可定植于10厘米的花盆中，苗高10厘米时进行摘心，在摘心后15天用0.25%~0.5%的B9喷洒叶面3~4次，用以控制其高度，促进分枝。

生长期中除在土壤中施用稀薄豆饼肥水外，再每隔半月施用0.3%磷酸二氢钾液肥喷洒叶面，以促使花芽分化多、旺盛、色艳。夏季酷暑多雨期，植株易倒伏，注意修剪整枝，摘除残花，达到花繁叶茂。





盆栽时，宜经常保持盆土湿润，施肥不宜过量，不然植株生长过旺而开花不多。生长发育期间约15~20天施一次腐熟的稀薄饼肥水即可。应注意适当修剪，控制植株高度，促使多开花。当矮牵牛长到一定高度时，用小竹竿作支柱支撑，以免倒伏。

## 繁殖方法 FAN ZHI FANG FA

通常用播种、扦插的方法进行繁殖。

**播种繁殖：**播种时间应根据用花的时间而定，如5月需花，应在1月温室或大棚内播种。10月用花，需在7月初播种。矮牵牛种子细小，每克种子约9000~10000粒，发芽适温为22℃~24℃，播后不需覆土，轻压一下即可，上盖地膜保湿。当子叶出土时，揭去地膜。出苗后维持在9℃~13℃可使苗矮壮、充实。幼苗期移植宜早，并尽量避免土团松散，否则根系恢复慢。

## 病虫害防治 BING CHONG HAI FANG ZHI

矮牵牛常见的病害有：白霉病、叶斑病和病毒病。

**1.白霉病：**发病后及时摘除病叶，发病初期喷洒75%百菌清600~800倍液。

**2.叶斑病：**尽量避免碰伤叶片并注意防止风害、日灼及冻害，及时摘除病叶并烧毁，注意清除落叶，同时可喷洒50%代森铵1000倍液。

**3.病毒病：**间接的防治方法是喷杀虫剂防治蚜虫，喷洒40%氧化乐果1000倍液。在栽培作业中，接触过病株的工具和手都要进行消毒。





## 矮牵牛花花事问答



### 家里种的矮牵牛叶子发黄了，该怎么办？

矮牵牛叶子发黄的原因很多，看看你的是哪一种，以便对症下药。

1. 长久脱肥。长期没有施氮肥或未换盆换水，水中氮素等营养元素缺乏，导致枝叶瘦弱，叶薄而黄。需及时换入新的培养水，逐渐增施稀薄腐熟液肥或复合花肥。
2. 施肥过量。施肥过多就会出现新叶肥厚，且多凹凸不平，老叶干尖焦黄脱落，应立即停止施肥，增加换水量，使肥料流失掉，或立即倒盆，用水冲洗球根后再重新栽入盆内。
3. 炎热高温。若将花卉放在高温处让强光直晒，极易引起幼叶叶尖和叶缘枯焦，或叶黄脱落。需及时移至通风良好的阴凉处。
4. 蔽阴过度。若将花卉长期放在阴蔽处或光线不足的地方，就会导致枝叶发黄。
5. 水土偏碱。由于水中缺乏可被其吸收的可溶性铁等元素，叶片就会逐渐变黄。栽植时要选用酸性水土，生长期间经常浇矾肥水。
6. 密不通风。若施氮肥过多，枝叶长得过于茂盛，加上长期未修剪，致使内膛枝叶光线不足，容易引起叶片发黄脱落。应合理施肥并加强修剪，使之通风透光。
7. 空气干燥。室内空气过分干燥时，花卉往往会出现叶尖干枯或叶缘焦枯等现象。应注意采取喷水、套塑料薄膜罩等法增加空气湿度。
8. 温度不当。冬季室温过低，花卉受到寒害，因而导致叶片发黄，严重时枯黄而死。若室温过高，植株蒸腾作用过盛，根部水分养分供不应求，也会使叶片变黄。应注意及时调整室温。

# Jin zhan ju 金盏菊



别名 金盏花、黄金盏、长生菊

科属 菊科金盏菊属

花语 惜别、离别之痛




## 实际应用 SHI JI YING YONG

金盏菊植株矮小、密集，花色有淡黄、橙红、黄等，鲜艳夺目，是早春园林中常见的草本花卉，适用于中心广场、花坛、花带布置，也可作为草坪的镶边花卉或盆栽观赏。

## 产地及习性 CHAN DI JI XI XING

金盏菊原产欧洲南部，现世界各地都有栽培。


喜阳光充足的环境，适应性较强，能耐-9℃低温，怕炎热天气。不择土壤，以疏松、肥沃、微酸性土壤最好。



## 栽培管理 ZAI PEI GUAN LI

幼苗3片真叶时移苗一次，待苗5~6片真叶时定植于10~12厘米盆。定植后7~10天，摘心促使分枝或用0.4%比久溶液喷洒叶面1~2次来控制植株高度。生长期每半月施肥一次。肥料充足，金盏菊开花多而大。相反，肥料不足，花朵明显变小退化。花期不留种，将凋谢花朵剪除，有利花枝萌发，多开花，延长观花期。留种要选择花大色艳、品种纯正的植株，应在晴天采种，防止脱落。





金盏菊的生长期应保持土壤湿润，每15~30天施10倍水的腐熟尿液一次，施肥至2月底止。在金盏菊长至幼苗后期，叶片4~5片时，实行摘尖（即摘心）能够促使侧枝发育，增加开花数量，在第一茬花谢之后立即抹头，也能促发侧枝再度开花。

米，7~10天发芽。种子发芽率在80%~85%，种子发芽有效期为2~3年。土壤酸碱范围PH值为4.5~8.3。在园子里的种子可以自己发芽，所需土壤不必特别肥沃。

### 病虫害防治 BING CHONG HAI FANG ZHI

#### 繁殖方法

FAN ZHI FANG FA

金盏菊主要用播种繁殖。常以秋播或早春温室播种，每克种子有100~125粒，发芽适温为20℃~22℃，盆播土壤需消毒，播后覆土3毫

常发生枯萎病和霜霉病危害，可用65%代森锌可湿性粉剂500倍液喷洒防治。初夏气温升高时，金盏菊叶片常发现锈病危害，用50%萎锈灵可湿性粉剂2000倍液喷洒。早春花期易遭受红蜘蛛和蚜虫危害，可用40%氧化乐果乳油1000倍液喷杀。





# 金盏菊花事问答



## 如何调整金盏菊的花期？

金盏菊的开花期可以通过改变栽培措施加以调节，调节的措施主要有以下几种：

1. 早春正常开花之后，及时剪除残花梗，促使其重发新枝开花；加强水肥管理，到了9~10月可再次开花。
2. 8月下旬秋播盆内，降霜后移至8℃~10℃温度下培养，白天放室外背风向阳处，严寒时放在室内向阳窗台上。一周左右浇一次水，保持盆土湿润，每月施加一次复合液肥，这样到了隆冬季节即能不断开花。
3. 3月底或4月初直播于庭院，苗出齐后适当间苗或移植，给予合理的肥水条件，6月初即可开花。因金盏菊成花需要较长的低温阶段，故春播种株比秋播的生长弱，花朵小。
4. 8月下旬露地秋播，苗期适时控制浇水，培育壮苗。入冬后移栽到防寒向阳处越冬，气温降至0℃以下时，夜间加盖草帘防寒，白天除去草帘。翌年早春最低气温回升到零下7℃以上时，及时除去薄膜，夜间盖上草帘即可。此时适当浇水保持土壤的湿润性，同时，每隔15天左右追加一次稀薄饼肥水，这样到了五一节，金盏菊便可鲜花怒放。



## 金盏菊有哪些药用价值？

金盏菊性味淡平，花、叶有消炎、抗菌的作用。根能行气活血，花可凉血、止血。欧洲民间外用于皮肤、黏膜的各种炎症，也可以内服治疗各种炎症及溃疡。新鲜的花卉可以放在色拉里吃。

1. 胃寒痛：金盏菊鲜根50~100克，水或酒水煎服。
2. 痢气：金盏菊鲜根100~200克，酒或水煎服。
3. 肠风便血：金盏菊鲜花10朵，酌加冰糖，水煎服。



# Dahua Ma Chi Wan

**别名** 大花松叶牡丹

**科属** 马齿苋科马齿苋属

**花语** 光明热烈



## 实际应用 SHI JI YING YONG

大花马齿苋花色丰富，茎叶翠绿肥厚，适应性强，管理粗放，是优良的花坛、花境材料，适合作镶边或栽种于石阶旁、岩石园，也可盆栽观赏，或点缀窗台、居室、阳台，或作吊盆栽种，悬挂于廊下、窗前，绿叶之中开放着鲜艳的花朵，随风摇曳，非常美丽。

## 栽培管理 ZAI PEI GUAN LI

盆栽一般选用3~5枝生根插条或播种苗，栽后浇水不宜过多，保持稍湿润和半阴环境。生长期必须放阳光充足处，每半月施肥一次，可用卉友20-20-20通用肥。要防止土壤积水或空气湿度过大而引起烂茎现象。母株在北方必须放温室内越冬，在温暖、干燥条件下能结实。在高温多湿情况下，难于结实或能结实，但种子很少。

大花马齿苋喜温暖湿润、阳光充足的环境，耐干旱，怕积水，忌阴蔽，不耐寒。虽然对土壤要求不严，但在疏松肥沃、透气排水性良好的土壤中生长为佳。生长期给予充足的阳光，浇水掌

## 产地及习性 CHAN DI JI XI XING

原产南美洲的巴西。

喜温暖、干燥和阳光充足的环境。不耐寒，怕高温和多湿，耐干旱和瘠薄土壤。生长适温为13℃~18℃，冬季温度不低于10℃，夏季高温长势减弱，开花少。对水分比较敏感，土壤过湿，茎叶徒长，柔软，花朵稀疏；过于干旱，茎叶萎缩，茎结短，花朵小。对光照反应十分敏感，花朵在阳光下开放，阴天及早晚温度低时闭合。在阳光充足的情况下，开花时间长，花朵大，色彩鲜艳。土壤以肥沃、疏松和排水良好的沙质壤土为宜。

