

广东省叶甲科昆虫名录

华立中编



中山大学昆虫研究所

1982.4.

**A CHECK LIST OF THE LEAF
BEETLES OF GUANGDONG
PROVINCE
(COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE)**

Compiled By Hua Lihong

1982

**INSTITUTE OF ENTOMOLOGY,
ZHONGSHAN UNIVERSITY
GUANGZHOU, CHINA**

说 明

广东省的叶甲科昆虫，现据资料及本所标本整理，共计有549种，分隶于170属，13亚科，其中茎甲亚科Sagrinae 5种，距甲亚科Megalopodinae 3种，负泥虫亚科Criocerinae 49种，锯角叶甲亚科Clytrinae 8种，隐头叶甲亚科Cryptocephalinae 29种，瘤叶甲亚科Chlamisinae 25种，隐肢叶甲亚科Lamprosomatinae 3种，肖叶甲亚科Eumolpinae 96种，叶甲亚科Chrysomelinae 19种，萤叶甲亚科Galerucinae 143种，跳甲亚科Alticinae = Halticinae 77种，铁甲亚科Hispininae 59种，龟甲亚科Cassidinae 38种，广东省新记录8种，有寄生植物资料的106种。现按亚科列出，供有关方面参考。

编者 于中山大学昆虫研究所

1982.4.

广东省叶甲科昆虫名录

一、茎甲亚科 *Sagrinae*

1. 三齿茎甲 *Sagra tridentata* Weber
分布：广东，广西，云南，四川，福建。
2. 茎甲 *S. femorata* (Drury)
分布：华南。
3. 紫茎甲 *S. femorata purpurea* Lichtenstein
分布：广东：海南，广西，福建，浙江，江苏，江西，四川。
寄主植物：豆工豆，刀豆，扁豆，葛等。
4. 齿茎甲 *S. odontopus* Gistel.
分布：广东：雷州半岛；亚洲东南部。
5. 大齿茎甲 *S. fulgida fulgida* Weber
分布：广东，广西，福建，江西，贵州，四川，云南；缅甸，泰国。

二、距甲亚科 *Megalopodinae*

6. 丽距甲 *Poecilomorpha pretiosa elegantula* Gressitt
分布：广东，福建。
7. 黄角距甲 *Temnaspis insignis* Baly
分布：广东：海南岛；印度北部。
8. 广东距甲 *T. kwangtungensis* (Gressitt)
分布：广东：九连山，广州。

三、负泥虫亚科 *Criocerinae*

9. 长头负泥虫 *Mecoprosopus minor* (Pic)

- 分布：广东，福建，台湾，浙江，云南，贵州。
10. 直胸负泥虫 *Ortholema punctaticeps* (Pic)
分布：广东：海南，广西，福建。
11. 黑缝负泥虫 *Oulema atosuturalis* (Pic)
分布：广东，广西，福建，台湾，江苏，云南，四川，山东，越南此部。
寄主植物：升马唐，紫马唐，蟋蟀草，狗尾草。
12. 黑头负泥虫 *O. subelongata* (Pic)
分布：广东，云南。
13. 水稻负泥虫 *O. oryzae* (Kuwayama)
分布：广东，福建，广西，台湾，贵州，湖北，云南，陕西，黑龙江，吉林，辽宁，朝鲜，日本。
寄主植物：除水稻外，还为害粟，黍，大麦，玉米，芦苇，糠稷，茭白，白茅，梯牧草，柳叶箬，稻状游草，碱草。
14. 多斑负泥虫 *Lema multimaculata* Jacoby
分布：广东沿海岛屿。
15. 泰国负泥虫 *L. mouhoti* Baly
分布：广东：海南岛，福建，泰国。
16. 红胸负泥虫 *L. fortunei* Baly
分布：广东，广西，福建，台湾，浙江，江苏，湖北，安徽，四川，陕西，河北，朝鲜，日本。
寄主植物：薯蓣属。
17. 印度负泥虫 *L. singularis* Jacoby
分布：广东：海南岛，印度。
18. 赭色负泥虫 *L. adamsii* Baly
分布：广东，福建，江西，浙江，日本。
19. 儋县负泥虫 *L. duplicata* Gressitt

分布：广东：海南岛儋县。

20. 黑胫负泥虫 *L. pectoralis unicolor* Clark

分布：广东：海南岛及广东沿海岛屿，广西，台湾，
云南；越南北部，老挝，泰国，新加坡。

寄主植物：薄叶万带兰，竹叶兰。

21. 平顶负泥虫 *L. lacosa* Pic

分布：广东，广东沿海岛屿，广西，福建，四川，云
南，西藏；越南北部。

寄主植物：蓟、蓼属。

22. 广州负泥虫 *L. djoui* Gressitt

分布：广东：广州。

23. 红顶负泥虫 *L. coronata* Baly

分布：广东，江苏，福建，浙江，湖北，广西，四
川，日本。

寄主植物：鸭跖草，菊属。

24. 薯蓣负泥虫 *L. infranigra* Pic

分布：广东，广西，福建，四川，湖北，浙江。

寄主植物：薯蓣。

25. 齿负泥虫 *L. coromandeliana* (Fabricius)

分布：广东：广东沿海岛屿。

寄主植物：裸花鸭跖草。

26. 黑额负泥虫 *L. nigrofrontalis* Clark

分布：广东：海南岛，云南，印度，尼泊尔，孟加
拉。

27. 红带负泥虫 *L. delicatula* Baly

分布：广东，福建，浙江，江苏，日本。

28. 斜斑负泥虫 *L. fanheanga* Gressitt

分布：广东：海南岛。

29. 海南负泥虫 *L. marginalis* Gressitt
分布: 广东: 海南岛。
30. 竹节草负泥虫 *L. commelinae* Gressitt
分布: 广东; 越南。
寄主植物: 竹节草。
31. 三沟负泥虫 *L. trisulcata* Gressitt
分布: 广东: 海南岛。
32. 毛顶负泥虫 *L. paagai* Chujo
分布: 广东: 海南岛, 台湾, 云南; 越南。
寄主植物: 长丛枝, 蓼稻。
33. 光顶负泥虫 *L. chujoi* Gressitt et Kimoto
分布: 广东: 广州, 广东沿海岛屿, 鼎湖山, 海南岛,
广西, 云南; 越南北部, 印度尼西亚 (爪哇)。
寄主植物: 裸花鸭跖草。
34. 褐负泥虫 *L. rufotestacea* Clark
分布: 广东: 海南岛, 广东沿海岛屿, 广西, 台湾,
四川, 云南; 越南北部, 缅甸, 印度。
35. 黑唇负泥虫 *L. inconspicua* Gressitt
分布: 广东: 海南岛。
36. 香港负泥虫 *L. bohemani* Clark
分布: 广东沿海岛屿。
37. 褐足负泥虫 *L. lacertosa* Lacordaire
分布: 广东: 海南岛, 云南; 越南北部, 孟加拉, 马来半岛, 新加坡。
38. 鸭跖草负泥虫 *L. diversa* Baly
分布: 广东, 广西, 福建, 浙江, 安徽, 江苏, 湖南,
四川, 湖北, 河北, 山东, 辽宁, 吉林, 黑龙江,
贵州, 河南; 朝鲜, 日本。

39. 红角负泥虫 *L. demongei* Pic
分布: 广东: 海南岛; 越南。
40. 驼负泥虫 *Liliocerus gibba* (Baly)
分布: 广东, 福建, 台湾, 浙江, 江苏, 江西, 广西, 四川, 云南; 朝鲜, 越南北部。
41. 橙肩负泥虫 *L. scapularis* (Baly)
分布: 广东: 海南岛, 福建, 浙江。
42. 四斑负泥虫 *L. quadripustulata* (Fabricius) (广东新记录)
分布: 广东: 海南尖峰岭, 云南; 越南, 泰国, 印度尼西亚(爪哇), 亚洲东南。
43. 越南负泥虫 *L. major* (Pic)
分布: 广东及其沿海岛屿; 越南。
44. 黄肩负泥虫 *L. luteohumeralis* (Pic)
分布: 广东: 海南岛; 越南。
45. 黄斑负泥虫 *L. hainanensis* (Gressitt)
分布: 广东: 海南岛。
46. 黑角负泥虫 *L. inflaticornis* Gressitt et Kimoto
分布: 广东: 雷州半岛, 广州, 福建
47. 点列负泥虫 *L. laticornis* (Gressitt)
分布: 广东: 海南岛。
48. 脊负泥虫 *L. subcosta* (Pic)
分布: 广东: 海南岛, 尖峰岭, 云南。
49. 纤负虫 *L. egena* (Weise)
分布: 广东: 海南岛及广东沿海岛屿, 广西, 江西, 四川, 云南, 福建, 浙江, 台湾。
寄主植物: 黄独。
50. 异负泥虫 *L. impressa* (Fabricius)

分布：广东：海南岛，广西，四川，云南，贵州，浙江，台湾，福建；印度，泰国，斯里兰卡，菲律宾，印度尼西亚（加里曼丹，爪哇），马来西亚（马六甲）。

寄主植物：薯蓣，橡树。

51. 皱胸负泥虫 *L. cheni* Gressitt et Kimoto

分布：广东，福建，台湾，广西，四川。

寄主植物：薯蓣属。

52. 腹凸负泥虫 *L. neptis* Weise

分布：广东，广西，湖南，江西，福建，浙江，台湾。

53. 红负泥虫 *L. lateritia* Baly

分布：广东，广西，江西，福建，浙江，安徽，湖南，湖北，四川；日本。

寄主植物：菝葜。

54. 半鞘负泥虫 *L. semipunctata* (Fabricius)

分布：广东：海南岛，尖峰岭，广西，四川，云南，印度，斯里兰卡，印度尼西亚，苏门答腊，爪哇。

寄主植物：菝葜属。

55. 钢兰负泥虫 *L. rufometallica* (Pic)

分布：广东：海南岛，尖峰岭，云南；越南北部，朝鲜。

寄主植物：菝葜属。

56. 红腹负泥虫 *L. cyaneicollis* (Pic)

分布：广东，雷州半岛，广西，云南，福建；越南。

57. 斑肩负泥虫 *L. scapularis* (Baly)

分布：广东：包括海南岛，广西，福建，浙江，江苏，陕西；朝鲜，日本，越南北部。

四、锯角叶甲亚科Clytrinae

58. 黄盾叶甲 *Aspidolopha melanophthalma* Lacordaire

分布：广东：海南岛，广西，云南；越南北部，泰国，孟加拉国，印度。

59. 双斑盾叶甲 *A. bisignata* Pic

分布：广东：海南岛，广西，云南；越南北部。

60. 黄毛额叶甲 *Diapromorpha pallens* (Fabricius)

分布：广东：海南岛，尖峰岭，云南；泰国，印度。

61. 广东光额叶甲 *Aetheomorpha hakka* Gressitt et Kimoto

分布：广东：梅县。

62. 双带方额叶甲 *Physauchenia bifasciata* (Jacoby)

分布：广东：海南岛，广西，四川，江苏，浙江，福建，台湾，湖北，江西，云南；朝鲜，日本，越南北部，印度。

寄主植物：算盘子，柑桔属，黑荆树，南紫微。

63. 梳叶甲 *Clytrasoma palliatum* (Fabricius)

分布：广东，广西，四川，云南，湖南，江西，福建，台湾；越南北部，日本，印度。

64. 十二斑锯角叶甲 *Clytra duodecimmaculata* (Fabricius)

分布：广东：海南岛，广西；泰国，印度尼西亚：爪哇，苏门答腊。

65. 黑额光叶甲 *Smaragdina nigrifrons* (Hope)

分布：广东，广西，贵州，四川，湖北，江西，福

建, 浙江, 安徽, 山东, 辽宁, 朝鲜, 日本。

五、隐头叶甲亚科 *Cryptocephalinae*

66. 红胸隐盾叶甲 *Adiscus exillis* (Weise)
分布: 广东, 贵州, 云南。
67. 光背隐盾叶甲 *A. laetus* (Weise)
分布: 广东: 海南岛; 苏门答腊, 马来亚槟榔屿。
寄主植物: 三角枫。
68. 广东隐盾叶甲 *A. fracticeps* (Gressitt)
分布: 广东: 沿海岛屿。
69. 红斑隐盾叶甲 *A. annulatus*
分布: 广东, 广西, 云南, 福建。
70. 斜沟接眼叶甲 *Coenobius sulcicollis* Baly
分布: 广东; 日本。
71. 棕头接眼叶甲 *C. obscuripennis* Chujo
分布: 广东, 江西, 福建, 琉球岛。
72. 海南齿爪叶甲 *Melixanthus minimus* Gressitt
分布: 广东: 海南岛。
73. 广州齿爪叶甲 *M. adamsi* Baly
分布: 广东: 广州。
74. 凹股齿爪叶甲 *M. moupinensis* (Gressitt)
分布: 广东, 四川, 贵州, 云南, 福建, 越南北部, 马来亚。
75. 水柳齿爪叶甲 *M. birmanicus* (Jacoby)
分布: 广东 (包括海南岛), 广西, 四川, 云南, 江西, 浙江, 安徽; 越南北部, 缅甸。
76. 涡盾齿爪叶甲 *M. subsimulan* (Chen)

分布：广东：海南岛，台湾。

77. 黑腹隐头叶甲 *Cryptocephalus discoderus discoderus* Fairmaire

分布：广东，贵州，四川，云南，江西，湖北。

78. 大黄隐头叶甲 *Cr. infraflavus* Pic

分布：广东：海南岛；越南北部。

79. 海南隐头叶甲 *Cr. nigrorufus* Gressitt

分布：广东：海南岛。

80. 广州隐头叶甲 *Cr. lingnanensis* Gressitt

分布：广东：广州，梅县，汕头，海南。

81. 香港隐头叶甲 *Cr. lofgrenae* Gressitt et Kimoto

分布：广东沿海岛屿。

82. 一色隐头叶甲 *Cr. subunicolor* Gressitt

分布：广东：梅县，海南岛；儋县。

83. 锡金隐头叶甲 *Cr. suavis* Duvivier

分布：广东：海南岛，广州，广西；锡金。

84. 六斑隐头叶甲 *Cr. ngae* Gressitt

分布：广东。

85. 台湾隐头叶甲 *Cr. bicoloripennis* Chujo

分布：广东：乐昌，台湾。

86. 赭隐头叶甲 *Cr. hainanicus* Gressitt

分布：广东：海南岛。

87. 黄斑隐头叶甲 *Cr. luteosignatus* Pic

分布：广东：海南岛，沿海岛屿，江苏，浙江，台湾，江西。

寄主植物：日本樱花，青冈栎，台湾桉木，榕树。

88. 十四斑隐头叶甲 *Cr. tetradecaspilotus* Baly

分布：广东；连县，福建，江西，湖北，台湾，浙

江, 江苏, 辽宁; 日本。

寄主植物: 龙芽草。

89. 三带隐头叶甲 *Cr. trifasciatus* Fabricius
分布: 广东: 海南岛, 梅县, 曲江, 福建, 浙江, 江西,
台湾, 云南, 广西, 湖南; 越南北部, 尼泊尔。
寄主植物: 算盘子属, 继木, 紫微。
90. 横斑隐头叶甲 *Cr. bryanti* Gressitt
分布: 广东: 海南岛, 沿海岛屿。
91. 缅甸隐头叶甲 *Cr. birmanicus* Jacoby
分布: 广东: 海南岛, 四川, 云南, 越南, 缅甸。
92. 宝兴隐头叶甲 *Cr. moupinensis* Gressitt
分布: 广东: 乐昌, 贵州, 四川, 福建; 马来亚。
93. 大隐头叶甲 *Cr. subsimulans* Chen
分布: 广东: 海南岛。
94. 隐头叶甲 *Cr. sp.*
分布: 广东: 海南岛: 尖峰岭。

六、瘤叶甲亚科 Chlamisiinae

95. 白水瘤叶甲 *Chlamisius shiroozui* Chujoi
分布: 广东沿海岛屿。
96. 钝瘤叶甲 *Ch. martialis* (Gressitt)
分布: 广东, 江苏。
97. 黑翅瘤叶甲 *Ch. rusticus* (Gressitt)
分布: 广东沿海岛屿。
98. 漆树瘤叶甲 *Ch. semirufus* (Chen)
分布: 广东, 广西, 江西, 福建; 越南北部。
寄主植物: 漆树属, 悬钩子属。
99. 红斑瘤叶甲 *Ch. uniformis* Gressitt

分布：广东。

100. 锐脊瘤叶甲 *Ch. superciliosus* Gressitt
分布：广东：海南岛。
101. 黄头瘤叶甲 *Ch. pallidiceps* Gressitt
分布：广东：海南岛，尖峰岭。
102. 中华瘤叶甲 *Ch. chinensis* (Baly)
分布：中国东部，广东沿海岛屿。
103. 凹缘瘤叶甲 *Ch. angularis* (Gressitt)
分布：广东。
104. 红瘤叶甲 *Ch. rufulus* (Ghen)
分布：广东，广西，江西，福建。
寄主植物：算盘子属。
105. 锈色瘤叶甲 *Ch. subferrugineus* (Gressitt)
分布：广东：海南岛，鼎湖山。
106. 栗色瘤叶甲 *Ch. castaneus* (Chen)
分布：华南。
107. 黑绒瘤叶甲 *Ch. velutinomaculatus* Gressitt
分布：广东：海南岛，江西，福建。
108. 砖红瘤叶甲 *Ch. rufescens* Gressitt
分布：广东。
109. 凹盾瘤叶甲 *Ch. maculiceps* (Gressitt)
分布：广东，福建。
110. 中沟瘤叶甲 *Ch. piceifrons* (Gressitt)
分布：广东：海南岛。
111. 四脊瘤叶甲 *Ch. pallidicornis* (Gressitt)
分布：广东。
112. 云南瘤叶甲 *Ch. yunnanus* (Bowditch)
分布：广东：海南岛，尖峰岭，云南。

113. 红足瘤叶甲 *Ch. sexcarinatus* (Gressitt)
分布: 广东, 江西。
114. 网点瘤叶甲 *Ch. reticulicollis* (Gressitt)
分布: 广东, 江苏。
115. 凹臀瘤叶甲 *Ch. diminutus* (Gressitt)
分布: 广东: 海南岛, 沿海岛屿, 江苏, 浙江, 湖北, 福建; 日本, 朝鲜。
116. 黄跗瘤叶甲 *Ch. palliditarsis* (Chen)
分布: 广东, 包括海南岛, 广西, 四川, 云南。
117. 红头瘤叶甲 *Ch. ruficeps* (Chen)
分布: 广东, 广西, 福建, 江西。
寄主植物: 高粱泡。
118. 悬钩子瘤叶甲 *Ch. latiusculus* Chujo
分布: 广东沿海岛屿, 海南岛, 广西, 福建, 台湾。
寄主植物: 周毛悬钩子。
119. 齿胸瘤叶甲 *Ch. tuberculithorax* (Gressitt)
分布: 广东: 海南岛。

七、隐肢叶甲亚科 *Lamprosomatinae*

120. 毛叶槲卵形叶甲 *Oomorphoides tonkinensis* (Chujo)
分布: 广东: 海南岛, 四川, 云南, 湖北, 福建; 越南北部。
寄主植物: 毛叶槲木, 栗属, 银鹊树。
121. 槲木卵形叶甲 *O. yaosanicus* (Chen)
分布: 广东, 广西, 云南, 江西, 福建, 浙江; 越南北部。
寄主植物: 槲木。

122. 红角卵形叶甲 *O. pallidicornis* Gressitt et Kimoto

分布：广东：沿海岛屿，海南岛，梅县，江西。

八、肖叶甲亚科 *Eumolpinae*

123. 斑鞘豆叶甲 *Colposcelis signata* (Motschulsky)

分布：广东：海南，广西，四川，云南，湖北，江西，福建，台湾，浙江，江苏，安徽，河北，陕西，辽宁，吉林，黑龙江；朝鲜，西伯利亚，日本，越南，缅甸，印度，菲律宾，印度尼西亚。

寄主植物：大豆及其它豆类。

124. 粗刻凹顶叶甲 *Parascela cribrata* (Schaufuss)

分布：广东沿海岛屿，广州，四川，云南，福建，浙江。

寄主植物：杨树，樱桃属。

125. 宽角叶甲 *Parhemimodes collaris* Chen

分布：广东，海南岛。

126. 桑皱鞘叶甲 *Abirus fortunei* (Baly)

分布：广东：沿海岛屿，广西，贵州，四川，云南，湖北，江西，福建，浙江，江苏；朝鲜，越南北部。

寄主植物：桑，榆。

127. 越南扁头叶甲 *Iphimoides suturalis* Pic

分布：广东：连平；越南。

128. 红李叶甲 *Cleoporus rugiceps* Chen

分布：广东：信宜，雷州半岛，鼎湖山，广州，汕头，广东沿海岛屿，海南儋县，江西；越南。

129. 李叶甲 *C. variabilis* (Baly)
分布: 广东: 海南岛, 尖峰岭, 广西, 江西, 福建, 浙江, 江苏, 湖北, 贵州, 四川, 云南, 陕西, 山西, 台湾, 山东, 黑龙江, 辽宁; 苏联(西伯利亚), 朝鲜, 日本。
寄主植物: 桃、李、梨、苹果、蔷薇, 月季、委陵菜、酸枣、艾蒿, 麻栎, 长梗柳, 算盘子, 野桐, 柠檬桉, 玉米, 亚青刚。
130. 六斑李叶甲 *C. lefevrei* Duvivier
分布: 广东(包括海南岛); 孟加拉。
寄主植物: 番樱桃。
131. 华南凹眼叶甲 *Triclionia megalops* Chen
分布: 华南。
132. 堇色突肩叶甲 *Cleorina janthina* Lefevre
分布: 广东: 广州, 鼎湖山, 海南岛, 尖峰岭, 广西, 四川, 云南, 江西, 福建, 台湾。
寄主植物: 良姜属, 栲属。
133. 临高突肩叶甲 *C. subnodosa* Gressitt et Kimoto
分布: 广东: 海南岛临高。
134. 海南突肩叶甲 *C. haina* Gressitt et Kimoto
分布: 广东: 海南岛, 琼山。
135. 单脊球叶甲 *Nodina punctostriolata* (Fairmaire)
分布: 广东: 广州, 梅县, 海南岛, 广东沿海、海南岛, 江西, 福建, 云南, 湖南, 浙江, 广西。
寄主植物: 桃, 吊山桃, 野桐属, 柑桔属。
136. 皮纹球叶甲 *N. tibialis* Chen
分布: 广东: 乐昌, 广州, 沿海岛屿, 广西, 四川, 贵州, 云南, 湖北, 江西, 福建。