

傷寒正醫四錄

八



中医珍本丛书已出版书目

御药院方

元·许国祯撰

轩岐救正论

明·肖京编

岭南卫生方

宋·李瑒 张致远原辑

济众新编

朝鲜 康命吉撰

勿听子俗解八十一难经

明·熊宗立撰

幼科类萃

明·王銮撰

黄帝虾蟆经

晋·不著撰人

质问本草

琉球 吴继志著

针灸内篇

清·林屋江上外史编

灵枢经脉翼

明·夏英编

外经微言

(原题)岐伯天师传陈士铎述

奇效医述

明·聂尚恒编

伤寒方论

清·不著撰人

医学入门万病衡要

明·龚廷贤原辑

伤寒六书纂要辨疑

明·童养学纂辑

秘传眼科七十二症全书

明·袁学渊编

罗遗编

清·陈廷铨编

活幼口议

元·曾世荣著

卢经哀腋

日·加藤宗博著

凌门传授铜人指穴

清·不著撰人

方症会要

清·佚名氏编

温病合编

清·石寿棠编

食物本草

(原题)元·李杲编辑

杏苑生春

明·芮经编

伤寒源流

清·陶愔庵编

心印绀珠经

明·李汤卿编

医略

清·钱一桂著

舌鉴辨正

清·梁玉瑜传 陶保廉录

温病浅说温氏医案

清·温载之编

温病指南

清·娄杰撰

采艾编翼

清·叶茶山辑

二火辨妄

日·芳村恂益撰

证因方论集要

清·汪汝麟撰

疫证治例

清·朱增藉著

万育仙书

清·曹无极著

扶寿精方

明·吴旻 王来贤编

苍生司命

明·虞抟撰

众妙仙方

明·冯时可撰

卫生编

清·石文焯编

小儿推拿直录

清·钱怀村辑

外科集验方

明·周文采编

针灸六赋

明·辑者不详

鸡峰普济方

宋·张锐撰

神灸经纶

清·吴亦鼎编

经穴汇解

日·原克昌编辑

仙方合集

清·贾山亭辑

寿世秘典

清·丁其纂

杂症会心录

清·汪蕴谷撰

张仲景先生伤寒一百十三方发明

清·徐彬撰

内经述

清·方本恭述

炮炙全书

日·稻宣义撰



重编医经小学

清·不著撰人

穷乡便方

明·不著撰人

脉确

清·黄琳撰

医方集宜

明·丁凤纂辑

神农本草经

清·黄奭辑

晋唐名医方选

日·喜多村直宽撰

家居医录二种

明·薛己著

活人慈航

清·郑道谦编

古今医统大全

明·徐春甫编

仲景全书

汉·张机等撰

伤寒正医录

清·邵成平编

备急千金要方

唐·孙思邈撰

千金翼方

唐·孙思邈撰

傷寒正醫錄

卷十 目次

春溫二十一條 方俱在正傷寒

夏熱八條

白虎湯加味

通解散

葱白香豉湯

竹葉石膏湯

黃連解毒湯

加減

發斑十二條

升麻葛根湯

三因加味羌活湯

加味小柴胡湯

消毒犀角飲

大青四物湯

當歸丸

葛根橘皮湯

漏蘆連喬湯

黃連一物湯

五物木香湯

孫兆山梔散

加減三黃石膏湯

通脉四逆湯

附子理中湯

陰毒甘草湯

調中湯 大建中湯

人參三白湯

黃連解毒湯

竹葉石羔湯

白虎湯加味

補中益氣湯

疫二十五條

達原飲加味

承氣湯

白虎湯加味

柴胡清燥湯

茵陳蒿湯

瓜蒂散

舉斑湯加味

桃仁承氣湯

犀角地黄湯

清燥養榮湯

柴胡養榮湯

瓜貝養榮湯

枳朮順氣湯

人參敗毒散

補中益氣湯

二黃湯

荊芥敗毒散

生犀散

人中黃丸

清熱解毒湯

人中黃散 雙解散

普濟消毒飲

蒼朮白虎湯

火劫十條

桂枝加桂湯

蜀漆龍骨牡蠣救急湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

狐惑四條

治蠱桃仁湯

黃連犀角湯

雄黃丸

雄黃銳散

終



傷寒正醫錄卷十

春溫

內經曰冬傷於寒春必病溫。又曰冬不藏精春必病溫。仲景別無溫病篇。朱奉議活人書與劉守真輩俱以傷寒並論。後人群起非笑。謂傷寒專在霜降以後。春分以前。遂有宜於冬不宜於春夏。宜於北不宜於南諸說。幾視桂枝麻黃如鴆毒。陶節庵雖妄自變方。猶能師仲景之意。如陽虛不能發汗。用參芪桂附之再造散。何習之者。



不辨陰陽虛寔。但以模稜作活計乎。愚親試盛暑冒寒。一服桂枝立愈。每致疑於溫病篇遺失之言。及讀尚論序云。治溫法度。俱錯出於治傷寒中。蓋天氣有涼燥。人身之六經則同。謂春夏融和。無嚴肅之氣。感寒者少。則可。若六經治法。具載正傷寒中。嘉言以冬傷於寒。冬不藏精二者分條。卽摘傷寒論以証之。內經雖云必先歲氣。毋伐天和。又云有故無殞。則春溫以正傷寒爲依據。甚爲有見。因之。

冬傷於寒

太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病。

脉浮頭痛項脊強者爲太陽病。然冬傷於寒感春月之溫氣而發則厥陰風木主事與太陽之寒水不涉。故雖從太陽而不惡寒也。或新中微寒且表氣素虛者亦有衛虛惡風營虛惡寒。然必微而不甚。此所以爲春溫證也。

形似傷寒其脉不弦緊而弱弱者必渴。被火者必譫語。弱者發熱脉浮者解之當汗出愈。

風性緩弱不弦緊而弱者非傷寒也。弱者發熱卽內經



諸弱發熱也。脉浮而解之乃解肌。不可發汗。
脉浮熱甚。反灸之。此爲寔。實以虛治。因火而動。必咽燥吐
血。

浮熱甚。邪氣實也。傷寒已不可灸。况溫病乎。

病如桂枝證。頭不痛。項不强。寸脉微浮。胸中痞硬。氣上衝
咽喉。不得息者。胸有寒痰也。當吐之。宜瓜蒂散。又云病人
有寒。復發汗。胃中冷。必吐蚘。

瓜蒂散。取吐頑痰而逐水。則膈快矣。有痰而悞發汗。亡
津而胃虛。必蚘上逆。

病人手足厥冷。脉乍緊者。邪結在胸中。心下滿而煩。飢不能食者。病在胸中。當須吐之。宜瓜蒂散。

此非厥陰之厥冷。乃邪結在胸。類傷寒之痰證也。

病人身大熱。反欲得近衣者。熱在皮膚。寒在骨髓也。身大寒。反不欲近衣者。寒在皮膚。熱在骨髓也。

前是表寔裡虛。後是表虛裡寔。

病在陽。應以汗解之。反以冷水噴之。若灌之。其熱被却不
得去。彌更益煩。肉上粟起。意欲飲水。反不渴者。服文蛤散。
若不差者。與五苓散。寒寔結胸無熱証者。與三物小陷胸

傷寒正金
湯白散亦可。

病人藏無他病。時發熱自汗出而不愈者。此衛氣不和也。先其時發汗則愈。宜桂枝湯主之。又云病自汗出者。此爲營氣和。營氣和者。外不諧。以衛氣不共衛氣和諧故耳。以營行脉中。衛行脉外。復發其汗。營衛和則愈。

春溫症。由肌肉而達於皮膚。則自陽明胃經傳入太陽膀胱。故只用解肌。不可發汗。

病人脉數。數爲熱。當消穀引食而反吐者。此以發汗令陽氣微。陽氣虛。脉乃數也。數爲客熱。不能消穀。以胃中虛冷。

故吐也。

因發汗而陽微。則胃虛不能食。非不藏精之真陽微。不過客熱而脉數也。溫其胃即愈。

病人耳聾無聞者。以重發汗。虛故也。

此與傷寒少陽邪盛者迥異。見溫症禁過汗也。

病人不大便五六日。繞臍痛。煩躁。發作有時者。此有燥屎。故使大便硬也。病人小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。喘冒不能卧者。有燥屎也。宜大承氣湯。大下後五六日不大便。煩不解。腹滿痛者。有燥屎也。宜大承氣湯。

