

士林餘業醫學全書

二



王林餘業醫學全書

目錄

卷一

集例

自箴篇

箴時篇

陰陽篇

保養篇

纂運氣

明形氣

別臟腑

附經絡

約脉訣

叢本草

卷二

理傷寒

診要三十條

表裏陰陽寒熱虛實汗吐下門要



南京中医药大学图书馆版权所有  
1951

七  
類傷寒辨疑凡十條

傷寒初症難症辨疑凡七十

瘟疫病治

者症捷法

六經用藥方法

內傷夾外感症治

內傷似外感症治

### 卷三

總方閑要凡十四條 用藥法則凡十四條

用方要訣

要方歌括

察病機

五運主病 六氣為病 内傷別外感論

內傷不辨悞人論 傷寒別傷暑 面部色候要訣



病診秘旨 脏腑病機捷要 五臟捷候

十二經溫涼補瀉法 問症之法 消息訣竅

標本治法 十二經水火分治 氣血痰治法

內外分治法 陰陽分治法 陰陽之辨 寒熱論

脾胃虛實傳變摘要 求本之要 百病闕徒

雜治賦 古應賦 醫先門戶 居方辨症

## 卷四

### 六淫治法

中風 中寒 中暑 中溫 燥病 火病



風類症治

眩暈

頭痛

頭風

面風

眉稜

眼病

耳病

鼻病

口舌唇症

齒病

咽喉

音啞

癰風

痺風

斑疹

赤白遊風

寒類症治

咳嗽

霍亂

胃脘痛

厥心痛

腹痛

暑類症治

瘧 痢

溫類症治



痞滿 泄瀉 嘔吐 吞酸 黃疸 水腫  
鼓服

赤濁 腰痛 痰氣 脚氣

燥類症治

消渴 燥結

火類症治

脇痛 夢遺 淋 痛 不禁 脱肛

卷五

內因症治

脾胃 諸氣 諸血 諸痰 諸鬱 積熱 虛損

沈寒痼冷

內傷發熱

內傷悲寒

病癒

積聚

瘴氣

喘咳

惡心

嘔氣

呃逆

膈噎

閑格

癰

顛狂

邪祟

驚悸

怔忡

健忘

自汗

盜汗

痿

厥

婦科秘旨

調經

潮熱

血腫

水腫

種子

崩漏

帶下

癥瘕

胎前

臨產

產後

瘍火秘旨

凡十二客  
十三方

十八症

目錄半

士林餘業醫學全書卷之二

●傷寒序

百病起於傷寒仲景立論萬世典也劉河間補溫暑方以備三時之用至於傳經直中分別陰陽雜症乃丹谿之獨見但傷寒挾內傷者什嘗五六故東垣作内外傷論以辨之傷寒之書可謂全且備矣顧舊文法全辭畧且意太簡古學者亦難了悟及而問活人本畫家寶等書疊出雖有發明各自成帙浩博難求余嘗閱玩迺知學有要領知其要一言而終遂掄其要括其辭族其隱而編之使人易知易從蓋傷寒方雖多不過汗吐下滲

和解溫補而已傷寒法雖多不過表裏陰陽虛實而已故先別六經正病再詳六經正治捷法及六經用藥方法次分表裏陰陽寒熱虛實汗下等法閑要此外有類傷寒症有傷寒初症有傷寒雜症有傷寒變症有傷寒溫濕病皆當辨別亦各立指條分至於傷寒挾內傷者尤掇辨疑多方庶主傷寒者不專於發散主內傷者不專於溫補龍服習四家之教或者不負其萬一也若常行總方與用藥法則非條是皆傷寒通用之法故亦類編之以便初學之採覽云

傷寒脈法

寸口為陽尺澤為陰陽主氣陰主血血為榮氣為衛寒則傷  
榮風則傷衛故以尺寸為主

太陽受病尺寸俱浮浮緊為傷寒浮緩為傷風帶數為有熱  
陽明受病尺寸俱長

少陽受病尺寸俱弦以上別三陽受病則然其要不出浮  
中沉三法即舉按尋之謂蓋浮脉察表之虛實而審陽明少  
陽病沉脉審裏虛與實沉診最為緊要以決虛實分熱如沉  
遲無力為寒不熱不頭疼不渴嗜卧此是陰經自中真寒症

輕則裡中陽重則四肢陽溫之如沉疾有力則為正陽明胃  
府病狂譫揚手足潮熱不大便輕則大柴胡湯重則六乙順  
風陽下之

寸口數大有力為重陽重陽者狂

尺部微而無力為重陰重陰者頰故曰脉沉兼伏是重陰氣  
刺胸膈腋塊結

寸口細微如絲為脫陽脫陽見鬼如尺部細微如絲為脫陰  
脫陰目盲

寸口浮而有力主寒邪表冒空汗散如寸浮而無力主風邪

表虛宜和解、

尺脉沉而有力主陽邪在裏為實宜下如尺脉沉而無力主陰邪在裏為虛宜溫、

又曰脉浮而緊見於尺部者腎虛感寒也宜以溫暖之劑逐散寒邪、又云浮而兼緊腎之虛溫助寒邪益精血、

中寒之症尺部微細則為陽絕速灸闕元氣海穴緩則竭絕寸口弱而無力切忌發吐尺部弱而無力切忌汗下

陽脉浮而有力方可汗陰脉沉而有力方可下、  
汗下後脉靜者生躁亂身熱者死乃邪氣勝也、

純弦之脉名曰**瘈瘲**者死

三部脈盛大汗出不鮮者死乃邪氣內勝正氣外敗也

陰陽尺寸俱虛熱不止者死脉至如轉索者死

凡身熱喘甚見陽脉而燥者死

傷寒譫語妄言身微熱脉浮大手足溫者生過冷脉沉細死

**暴寒脉緩明**

浮者太陽之脉弦者少陽之脉一經俱病是以外症頭皮體痛內為胸膈迷悶

凡傷寒一見緊脉即為外感之症一見實脉即為內鬱熱之

症蓋為寒邪客於肌表必發熱惡寒熱邪留於臟腑必煩躁  
閉塞

浮為風遲為寒脉浮遲者知寒邪外侵風熱內搏也藥宜辛  
溫兼辛涼之劑

太陽症見伏脉此因寒邪不得發越為陰伏必有邪汗當攻  
如兩手雙伏外症神清氣炎此將欲正汗勿攻

一溫病發在春月者為風溫風傷衛四肢不收溫傷氣氣昏  
鼻息不利甚者身熱自汗脉陰陽俱浮治在心火肝木二經  
一熱病發在夏月者熱渴更甚陽脉洪數陰脉實大主裏熱



南京中医药大学图书馆版权所有  
NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE LIBRARY  
1951

熱病

人曰熱病陰陽俱浮浮之而滑沉之散濁浮滑者心傷熱發  
濁者津液少禁用溫劑

熱病脉燥盛而不得汗者此陽脉之極也不治

熱病未經汗下脉强急生虛緩死已經汗下脉虛緩生強急  
死入裏腹痛甚下利脉強者死

疫病左手脉大於右手浮緩而盛按之無力

熱病診得脉浮洪細小徒費用神功汗後脉靜便當瘥喘熱  
脉亂命應終



● 傷寒要領

傷寒六經  
常次序

百病始於傷寒必湏先別六經者大陽次陽明又次少陽為三陽經陽傳陰經首太陰次少陰又次厥陰為三陰經

邪在表則屬三陽邪在裏則屬三陰風寒自背而入則中太陽太陽行身之背故頭疼身熱脊強風寒自面而入則中陽明陽明行身之前故目痛鼻乾不眠風寒自身側而入則中少陽少陽行身之側故耳聾脇痛寒熱往來不食嘔口苦乾自眩此三陽經受病則然也

聚拳此論三陰傳經熱症則然但亦有直中陰經者分兩等看  
傷寒不拘日數但見太陽症即汗太陽見少陰症即溫少陰見  
陽明症即下陽明見真寒症直入陰經即救真陰此最活法  
風寒中人有不傳經者有間傳一二經者有不自陽經直中陰  
經者邪無定體故也

凡見頭疼嘯熱惡寒便清腰項脊痛脉浮緊即屬太陽表症不  
論日數便宜解表有汗表虛宜解肌無汗表實宜發汗三時宜  
微汗冬月皮毛堅緻者可大汗

凡見潮熱譫語渴不惡寒反惡熱揭衣揚手足或發斑黃狂