

傷寒論參注

三



傷寒論目錄

長沙公自序卷之首

辨太陽病脉證第一

上篇

桂枝湯 五苓散 桂枝加附子湯 桂枝去芍藥湯 桂枝

枝人參湯 葛根黃連黃芩湯 桂枝加芍藥湯 桂枝

去芍藥加附子湯 桂枝加厚朴杏仁湯 桃核承氣湯

抵當湯 十棗湯 大陷胸湯 大陷胃丸 蜜蛤散

白散

共十四方

中篇



麻黃湯 小建中湯 茯苓甘草湯 芍藥甘草附子湯

禹餘糧丸 方缺 桂枝新加湯 麻黃杏仁甘草石膏

湯 桂枝甘草湯 茯苓桂枝甘草大棗湯 厚朴生薑

甘草半夏人參湯 生薑瀉心湯 甘草瀉心湯 大黃

黃連瀉心湯 附子瀉心湯 半夏瀉心湯 赤石脂禹

餘糧湯 大柴胡湯 旋覆代赭石湯 小陷胸湯 散 柴

胡桂枝湯 柴胡加龍骨牡蠣湯 炙甘草湯 四逆湯

梔子厚朴湯 梔子乾薑湯 梔子豉湯 梔子甘草

豉湯 梔子生薑豉湯 乾薑附子湯 茯苓桂枝朮甘

草湯 抵當丸 桂枝附子湯 桂枝附子去桂枝加朮

湯 甘草附子湯 麻黃連軀赤小豆湯 梔子蘘皮湯

共三十方

下篇

大青龍湯 真武湯 桂枝麻黃各半湯 桂枝二越婢

一湯 桂枝二麻黃一湯 桂枝湯去桂加茯苓朮湯

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯
 桂枝甘草龍骨湯
 桂枝甘草湯
 芍藥甘草湯
 茯苓四逆湯
 黃連湯
 小青龙湯
 白虎湯
 白虎加人參湯

共一十五方。篇中有證象陽旦句而原文未著陽旦湯方喻氏因謂桂枝湯加黃芩則名陽旦湯加桂則名陰旦湯

湯意近傳會
 姑存其說
見後麻象陽旦條下

辨陽明病脉證第二

上篇

小承氣湯
 調胃承氣湯
 猪苓湯
 茵陳蒿湯
 共四方

中篇



蜜導煎方

猪膽汁方

土瓜根方

大承氣湯

麻

丸

共五方

下篇

辨少陽病脉證第三

小柴胡湯

柴胡桂枝乾薑湯

共五方

附合病併病第四

附字頂格予寫

桂枝加葛根湯

葛根湯

葛根加半夏湯

黃芩湯

黃芩加半夏薑湯

共五方



壞病第五

痰病第六

似低一字

瓜蒂散

辨太陰病脉證第七

桂枝加芍藥湯
共二方

桂枝加大黃湯

辨少陰病脉證第八

前篇

麻黃附子細辛湯
黃湯 白通湯

白通加人尿

麻黃附子甘草湯
吳茱萸湯
通脉四逆湯

目次

四逆湯



共七方

後篇

黃連阿膠湯
半夏散及湯
苦酒湯
四逆散
桃花湯
豬膚湯
甘草湯
桔梗湯

共八方

辨厥陰病脉證第九

烏梅丸
麻黃升麻湯
當歸四逆湯
乾薑黃連黃芩人參湯
白頭翁湯
當歸四逆加吳茱萸生薑湯

共六方

過經不解第十



柴胡加芒消湯

差後勞復食復陰陽易病第十

枳實梔子豉湯 牡蠣澤瀉散 理中丸 竹葉石膏湯

燒裨散

共五方

以上三行俱低一格

溫病第十

傷寒論後編目錄

辨症濕暍病脉證第十

辨霍亂病脉證第十四

辨脉法第十五

另作一頁
後編之前



平脉法第廿六

可汗第廿七

不可汗第廿八

可吐第廿九

不可吐第卅

可下第卅一

不可下第卅二

序例附卷末



故少變其例
不混同原文

下仍另為釋明以待讀者之

為貫通庶幾理圓

停矣見疎上篇凡外邪

初入陽明而太陽尚有未盡者謂之太陽陽明也

陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

陽明病脉浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯

此二條初走陽明而病仍在太陽者故各從

及頸項連背而強者則又以方來之陽明為重

湯吳針氏曰篇中未揭陽明經證疑有闕簡

額連即眩脹痛發熱不惡寒方為陽明經症

亦未之見若合病篇中之葛根湯乃與桂麻合

陽陽明兩經之方非專主陽明

陽明



病若能食名中風不能食名中寒

風為陽邪雖傳陽明本末一氣為患尚輕故胃食寒為陰邪入裏反鬱而為熱變本加厲為

中實而不能食此指轉經之病邪而言若論則以能食者為實不能食者為虛雖傷寒不能

仙曰陽明病在經主葛根入裏主白虎入府主承辦其也中風與傷寒也今不察其病之在經在府而

能食不能食何為也

哉仲景當不若此

脉陽微而汗出少者為自和也汗出多者為太過陽脉實因

其汗出多者亦為太過太過為陽絕於裏亡津液大便因鞭也

喻氏曰仲景每於亡津液者悉名無陽玩本文陽絕於裏亡津液大便因鞭其理甚明傷寒發太陽經之汗即當顧



南京中醫藥大學圖書館版權所有

慮陽氣以膀胱主氣化故也發陽明經之汗即當顧慮陰津以胃中藏津液故也所以陽明多有熱越之證謂胃中津液隨熱而盡越於外汗出不止耳然則陽明病不論中風傷寒脉微脉實汗出少而邪將自解汗出多則陰津竭致絕也

問曰陽明病外症云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱

方氏曰此太陽中風轉入陽明經之外證

問曰何緣得陽明病答曰太陽病若發汗若下若利

津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難

也

此太陽經病轉屬陽明之府症體氣不足之
詳慎設不明乎此而誤為施治徒亡津液必

問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰唯

惡寒將自罷即自汗出而惡熱也

方氏曰此太陽傷寒傳入陽明經之外證愚按得
指陽明證也始之太陽惡寒原不必計日一傳陽明

汗出而惡熱也汗出

惡熱陽明正病也

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中土也萬物所歸無所復

始雖惡寒二日即止此為陽明病也

此釋惡寒自罷之義二日字勿泥言初雖惡寒及傳
陽明即止猶上條得之一日即自汗出而惡熱也

本太陽病初得時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明也

汗出不徹則徒耗津液而病邪不解反得挾所服藥辛熱之性以就燥而入胃與前降之過汗奪液者雖有過不及之殊其失則均也

太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞭者與小承

湯和之愈

奪液者胃氣乾燥不和可知與小承氣湯則煩
液自復故曰和之愈言微下之以解其燥而胃

謂承氣為和劑也

小承氣湯方

調胃承氣大承氣二湯中
大黃用酒浸洗蓋以芒消
性急恐下行之勢一往作
前故用酒製大黃以緩之
欲令藥不致驟過而與
病相值也若小承氣既去
芒消則大黃自可生用

大黃 四兩
厚朴 二兩
炙甘草 三枚
枳實 三枚
大

已上三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二

當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯

誤行湧吐而傷上焦清陽之氣則陰氣獨治於中凝
舒而為脹滿非燥實鞭痛之比若復下之豈不更傷其
而增病變乎喻氏於此亦似未安然不敢明目張胆言
其非而反曲為調停曰此亦和法非下法也試問大黃芒
消不足為下然則必割
腸剖胃而後為下耶

調胃承氣湯方



大黃

四兩去皮酒浸

甘草

二兩炙

芒消

半升

右三味以水三升煮取一升去滓內芒消更煮兩沸少少溫

服之

陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

舒氏曰嘔多者胃氣虛寒之徵且其氣逆而不降故雖有陽明症不可攻之

食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇

凡病寒者多兼虛吳茱萸湯溫中補虛降逆屬上焦之下疑有闕文蓋上焦是板實字面



揭其所因也然則屬陽明也句下何以知宜
食穀欲嘔已具虛寒之象矣有謂得湯反劇
然則其初何以反用吳茱萸
湯仲景當不教人試藥也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮而緊

腹滿小便難也

此條陽明經僅見腹滿微喘之證而中風脉浮緊發
寒與大青龍症同口苦咽乾則見少陽府症當察其緩
輕重而斟酌以治之非能預擬成方若下之則
斷斷不可恐人目腹滿而誤下故諄切戒之

陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡
熱身重若發汗則躁心憤憤反譫語若加溫鍼必怵惕煩躁不



南京中醫藥大學圖書館版權所有