

永類鈴方

三



永類鈐方卷第四



Seal of the National Diet Library (National Diet Library Seal)

碧山李仲南集成

青原孫允賢校定

七氣

人稟天地陰陽之氣以生。一氣升降周流。一身呼吸。往來無窮。皆氣所爲。亦猶天地之無氣。不於肺臟者。外因也。散見於各病類例之中。七情之氣。干於肺臟者。內因也。七者不同。氣本乎夏。也尚隸於陰陽。有形之氣。知天元真一無形之氣。祖若則無病矣。六腑惟膽有君火。夏可恒。非轉輪例。故能蓄驚而爲病也。其餘痰喘。膈噎。癰疽。積聚。肢滿。且見各門。皆藏氣不行。鬱而生痰。隨氣積聚。變生諸證。詳明寒熱。分五藏寒。則經絡凝滯。諸氣壅聚。熱則榮衛湊理。開通氣泄。而汗亦出也。中藏經云。諸氣屬肺。陽中之陽。居五藏之爲華蓋。系清陽升之氣。傷寒發喘。而有太陽陽明二證。屬熱。可知故仲景所用皆清利之藥。間易心氣飲之。論有合於此溫熱藥宜少用。又有合於五臟噎膈。五淋疏之。說用藥者。當通論之。至於氣之爲積聚者。亦先清利而後溫散爲可法也。

脉病證

積聚之脈
盛而緊浮
而牢半強
急者生虛
弱者死

真氣散故傷心 自汗
怒氣擊故傷肝 上氣短乏
憂氣聚故傷肺 夜卧不安
思氣結故傷脾 腰膝肢惰

簡易分心氣散治氣藥多溫熱此方瀟清而疎快分氣蒸散飲
木香分氣湯集易方降氣湯大降氣湯甘味流氣散射山
人降氣湯加減降氣湯宮滯閃挫傷元通氣散蘇合香元
集藥氏消氣散療濕吐衄氣湯

夏方聖湯七氣湯水香調氣散次降氣湯秘傳降氣湯



悲氣之鼓傷胞 牽脾健志
恐氣之鼓傷腎 猶稜精却
驚氣之鼓傷膽 神慮恍惚

痰飲

痰則伏於包絡隨氣浮遊於肺經因嗽而發則伏於肺先隨氣滯而流出於胃腑為嘔為吐醫易

龐安常云人身無倒之邪出無逆流之水當順氣也脾土虛弱不能攝養肺金四氣之情所干氣壅痰聚爲喘咳嗽泄眩暈八噎怔忡寒熱疼痛腫脹驚悸癰閉疰寒疝氣如顛昏痰所爲飲雖有六治法順氣爲先分導之溫利自小便中出爲六可注下氣順津液流通痰飲自

脉病證

其脉偏弦
爲飲浮而
滑亦爲飲
又曰盛微
滑滑爲飲
各曰寸沉
寒食在胸
中

懸飲

溢飲
飲流於四肢汗
不升身重

支飲 咳逆倚息短氣不
臥形如腫

痰飲
其素盛今瘦胸中
漉漉有聲

三因平素傷脈弦者倍木元半夏枳實湯
破飲元枳木元齊生枳木湯

大青龍湯加減青龍湯

三因方 種痘湯 脈沉緊 牛黃 小承氣湯 伏苓 五味子湯
小半量 湯草 塵太 裏馬 肺湯

三因癰入臍下有悸味淡羸眩五苓散分毫飲破散元
御院不香餅餅元中事完并元一注諸醫本元

留飲

胃脘疼痛嘔吐泄瀉

伏飲

喘滿咳嗽惡寒而熱
腰背痠痛

胃脘

停痰腹鳴足淡食不
化嘔吐胃脘項疼

脾胃

虛冷泄瀉痰音

氣虛

痰嗽

腎虛

氣寒水泄嘔吐痰水

痰癖

氣逆痰涎持有水聲

風痰

頭眩嘔吐胸膈不利

痰熱

酒傷胃

朝歲食久則手足
振掉或痺

積年

痰痞胸膈馬曰雞腹也痰者食積與食吐出雞雛而愈
引飲過度遂成痰飲水無時亦石脂散兩細末每服錢姜湯或酒調不拘時 濟生方

局方參蘇散快散三夏湯簡易白朮茯苓湯

參蘇散易簡快散三夏湯

局方五苓散元一沈透南湯胃弱十味正氣散但香砂仁

簡易扶元本事故元濟生草薢湯胃冷三生湯

局方五苓散元脾虛利八味元一砂二陳湯下青州白朮三因強中元

簡易新法事湯御院法製養三因保嬰元湯元香扶苓湯

局方蘇子降氣湯前之降氣湯魚鰔丹靈砂丹簡易潔皂

滋養順氣散元砂白朮氣滯胸膈百選四元氣清平湯

八味元好黑錫丹

濟生扶元湯實即散三因保嬰湯局方倍本元桂枝湯白朮湯

即肉桂五苓散元青州白朮元加神保元五元三夏湯

御院半夏利膈元簡易分經湯局方桂枝湯本事故元

腰實元紫胡湯元蘇散百選食前胡湯蕪荳散元元散門

生肌胃加香半夏茯苓勝紅元姜汁理中元五苓散元倍本元

生冷丁砂二陳湯



五噎五膈

諸方論皆以順氣化滯溫脾養胃順調陰陽氣順痰消誠是美此七情內傷脾胃鬱而生痰致氣搏升而不降是氣為濁氣非得於天之清氣者人有此清氣而清氣常不足濁氣常有餘清氣多濁氣少病生痰不化脾胃不待溫養也若必順化溫養則濁氣者愈擁而不能清矣又此疏論之極詳宜驗別刊于后昔先君子患此惜見此疏之晚其後先兄得此疏於湖上歸之憶其所用者皆順化溫養之劑初已危困過期而不得用矣哀哉

脉病證

治

七情 憂 思 勞 食 氣

飲食必於靜處噫噦
胃脘痛
善怒憂慮傷肺大
便不和或微嗽
情思不寐面青淨心
怔忡目視眩暈
傷神生痰其憂氣
上胃痛
飲食不吞或與津液
結為痰為膈中

蘇合香丸和姜汁四七湯七氣湯降氣湯溫膽湯四磨湯
濟生養散散因沉者散開易而磨飲子
分心氣飲磨沉香四磨湯聖惠半夏散大便不通寶即散
煩則大休及散
參香散聖惠昆布元本香散
生料嘉禾散濟胃丹
五膈元有極附者食食惡又陳皮連白兩青代薑薑辛兩
為末蒜汁侵蜜元彈子六噎化

本嘉中膈是死第子開胃得與道太無自養多中後後黃煎乃心為此乃生積飲食所致



閉塞胃脘滿噫

聞食臭

清夏

棄我瘠之

氣

結

志

六實遠噫嗽醋
瘡如小便利

股

腹脹妨逆膈塞

則成

腹中

五

歲熱五中熱隔

熱

通見嘔噎

隔噎交膏肓隨年數作壯妙候人痊

炎聖中死在兩乳正帝

膈氣變翻胃用刺紅花吐瘀血及虫

分并附於黨牛兩本香牛兩寶則三棲我不煙傳皮貫衆去辛

各乙兩金黃春二兩秋冬夏乙兩乾漆

煙起已九味作末糊元壯工可平元又元夜之兩醃煮已三升

油耳遂之兩爲米糊元梧桐子大候乾用

包之絲線於繫剪斷服前藥內加用一粒萬病回春湯使工更和

服瘳疾醋炙肉噉婦人醋湯名秦川

元有氣騰龍好對合香元隔姜介少許喉中燭聲微愈

勞察門以至膈下氣元噲化至五膈膏肓

崇無司施者有聞噓鰥黃太令其教鍾書自後用字未

或用粟不俟其糞以淘洗淨換以作粥

二、握湯以浸去熟去雄取其通氣強熟与入次香末發下帶結者

翻胃始因膈噎成有痰每患痰非好藥

附子片兩兩是之西巴豆廿粒去皮穢水之兩同炒地黃去心二兩入

干姜丁香末各半兩同煎作末五更早服

熊乾喫半錢津化仍懷皮湯呷送下又蘇合香元書治台元行

生薑元服有翻胃噎塞煩悶諸藥不效蓋根煎湯下枳壳湯又真阿魏末少許外野人掘下乾糞多作末
五更初姜汁煎食能起死人趙王國傳又翻胃吐黑汁治不愈用薑汁煎米米粉糊元姜湯下而愈其服平
胃散三貼又姜汁調白虎湯治翻胃如神白虎風化持太師元

十膈五噎浪分文法疏卷二十三

病必之矣果是病失其本必自集氏何者老子曰少則得多則惑且俗謂噎食噎在內經苦無多
語惟三陽結謂之膈三陽者大腸小腸膀胱也結謂結熱也小腸結熱則腹中燥大腸結熱則後不固
膀胱結熱則遺精三陽俱結則前後澀澀下既不通必上行此所以噎食不下而下而後出也謂胃五更海
受其新以易其陳曰便六常度也今病噎者三五日不便其度也豈非三陽俱結於下大腸枯澀所食物為
咽所拒縱大倉還噎噎此陽火不推而下行也經曰太陽所至為嘔涌溢食不下又氣厥論云行後寒於為狂
膈中注陽與寒相搏故膈食而中不通此膈熱與寒為之也非獨專於寒也亦即藏家天迎四盛以下為格陽天樞
云陽盛極故膈拒而食不入正理論云格則逆故膈亦當為格後後強分為五噎後又別為五膈五噎其必既多其
惡滋甚之溢食初未必噎然也初或傷酒食或胃熱或吐酸不察本原公裏燒姜湯中黃桂丁香木香冠繼之
畢終未三胡桃繼之雖曰實胃本不寒雖曰補胃胃本不虛設如傷飲可逐飲如傷食可逐食食可逐食虛便將
執補素問無方素熱之三陽必結三陽既結食不潮醫有猶云胃寒不納燒劍者三陽轉結分明何到了難
從不過搜新最熱最為緊要楊湯并愈急愈增歲日深為醫所誤言可下也陽養陰張眼吐舌恐傷元氣上
在抑和閉塞不通腸胃通暢是以噎膈腸既不通遂成噎症傳五噎實中散有姜有桂有木香有烏金手既其方
信乎與否聽後賢或曰薑氣結亦可乎余曰姜志熱便同太熱不食公曰見此皆下法服以求下其不復令代
劉河間治氣膈噎食服用承氣三湯獨超近代今用藥者不識主用將謂風狂吐舌誅詠及翻其好猶時五原既
問生薑與非生薑今不如此後用藥之時更詳輕重假如關公慎勿煩致縱得攻開必廣後患宜先開食小
量藥更宜開胃自逐其或咽噎上阻痰涎輕用苦酸微微涌出因而治藥易易行誤或不行寧下下

難治之病，藥難通結，散陽消飲食，其莫將官耗，即本長液，燥津既流，毒未去，言此病曾下奪，從下奪來轉，虛轉死，此為已非大黃，牽牛之過也。其城河官病，嘔吐連年不愈，皆以胃寒治之，下其苦青，其苦附種，燥熱，燒雖療之，莫有數效。愈後，其病且十年，大便秘燥，小便亦黃，余視之，舌諸瘰，喘喘皆屬牛，主大僕不謂上，焦也。火氣炎之氣，謂其熱甚而為嘔，以四生丸下，行燥其腸，垢何處，如其人昏困，三日煩，水水之新投，其乳酪之麻，故時時嘔，其數日後，大嘔飲，其精神與食如昔，繼生三子，至五歲。

三承氣湯，其大黃去其皮，其硝即煅，其厚朴、枳實、芍藥，其生用，各半兩，甘草去皮，炙，兩當歸酒洗，焙，三錢，半重。右以每服半兩，水煎，生薑五片，早不覺，同煎七分，去滓，熱服，不拘時候，病重者，再服之，兩加姜五片，早不若，不細藥，須時時呷服，之以通為度，雖為下藥，有油有補，卓有奇功。利河間又加甘草，以為三承氣，以甘和其中，最得甘多，秘試論，其論曰：味當歸不在，試論之，列之，可用然，等分，不多綴，用亦無妨。

四生丸，治切結熱，常服，肢體潤澤，而老壯，去其粗皮，酒洗，紙包，煨，香，不可過存，度，兩黑牽牛三兩，取頭末，之兩尾，角，去生，生用之，兩生用，生兩兩，為末，滴水為丸，每服三十丸，白湯送下。

對金散，字淨，除及兩兩，兩兩，參之，兩制厚朴，兩兩，甘草炙，三兩，黃芩三兩，去其皮，黑灰，黃芪之兩兩，連服，半兩，水煎，生薑五片，早不覺，同煎七分，去滓，熱服，先服，氣湯，夜服，星丸，乾，效進食，不格拒，方用對金散，字淨，初病作，且於嘔，胃熱，類內，選用清利之藥，實其虛，實重，輕方用前藥，更佳。

傷寒嘔吐乾嘔吐逆一

胃受水谷，脾主運化，脾胃所傷，遂成嘔吐，嘔有節，來遲，嘔來速，嘔者有聲，俗謂之呃，吐者有物也。故有乾嘔而無乾嘔，傷寒嘔吐有熱有寒，主於吐，吐言虛，冷傷寒表邪欲傳裏，裏氣逆則為嘔，是半表半裏證，多云嘔熱，吐利則酸臭，寒吐利則腥穢，此猶飯熟，熱則酸，寒則水腥。近世姜是嘔，不聖藥，能散逆氣，半裏能去水去嘔，則止，能下痰，飲古多用之，九嘔不可下。



脉病證

弦長而緊

弦緊

寸數

長大

而弦

寸數

無陽則厥無陰則嘔嘔者是陽明胃經脈下硬滿不大便而嘔者百治

使景石嘔多雖陽明證不可下

若胸脇滿而嘔日晡發潮熱

若嘔不止下急者當微煩

太陽少陽合病頭疼身痛口苦咽乾者來寒熱自利又嘔者

春初肌肉癢疹嗽而悶但嘔清汁

陽明少陽合病下利身熱胸脇痛

乾嘔往來寒熱去夜水賊更下

利為胃中困脈不弦為順

食胃而嘔屬陽明

傷寒差後嘔胃脘不餘熱

手熱心煩渴而吐少胃脘有熱

傷寒發熱出未解半瘧嘔吐下利

表不解下有氣乾嘔微利發熱咳

醫汗出因有微下利脾胃有熱乾嘔

傷寒解後虛弱少氣氣逆欲吐

治

小柴胡湯焦得連津液得下胃氣和汗出得采而解

氣逆亦為實也加瀉小柴胡去半夏加人參栝樓湯

小柴胡湯加芒硝半瘧小便利去黃芩加茯苓

大柴胡湯大便秘加大黃枳實湯中有枳實為妙

黃芩湯加半夏生姜

葛根橘皮湯黃連橘皮湯

小柴胡湯其則大柴胡湯因渴飲則不可下

小柴胡湯小半夏湯加茯苓東皮

竹葉湯加生薑陳皮竹茹湯

五苓散

大柴胡湯下之汗自出乾嘔加枳湯

小青龍或元花使不利腹滿去麻黃加茯苓

桔梗湯官局

竹葉石膏湯陰陽易者後勞復脈證



汗吐後虛煩不得眠者嘔者

汗下後實中虛冷而吐者吳茱萸

咽乾煩躁嘔吐

發汗過多煩躁則吐水

少陰利下自利而嘔渴煩不得眠

少陰餘自山嘔者

表邪而裏未和身涼汗出不惡病

脅痛或乾嘔短氣為裏有水

少陰下利裏寒外熱或腸上有寒

乾嘔腹脹痛或手足逆冷煩躁甚者

少陰病飲食入口欲吐不能吐始得之

手足冷胸中實不可下當吐之

若脈沉遲心煩欲寐目利而渴便白

傷寒大熱乾嘔呻吟錯語不得眠

先嘔後渴者欲解先渴却嘔者為水

停心下屬飲家

中風惡頭痛煩躁不安不快

腳氣嘔吐而腫疼弱或疼若毒

氣急腸痛連不嘔吐死在旦夕

梔子生薑湯

乾姜黃芩黃連參湯寒多不飲水而苦理中湯寒加

甘草乾姜湯 黃芩陳皮干姜湯

五苓散三服次服芍藥湯

猪苓湯

真武湯去附子加生薑

藥湯

通脈四逆湯

吳茱萸湯

炮子生薑湯若燥舌乾知其熱大承氣湯

四逆湯脈弱小便利身微熱見厥者為難治虛寒甚也

黃連解毒湯

赤茯苓湯

五苓散香薷散和湯

見脚氣門

治中湯積散腹中若吐不腹滿痛宜下

五苓散

五苓散

五苓散



雜病嘔吐

傷寒嘔吐景數十方急欲獨少陰腎經五方行溫劑至其雜病所重乃在脾胃脾太陰濕土胃陽明燥金之熱自胃脾為藏胃為府表裏陽陰了然則胃蓄燥熱於脾為嘔脾宿冷於濕為吐是熱為嘔冷為吐明矣而况飲食不化發生陽氣亦不啻胃胃熱足於脾脾熱口且可分不啻以酸為熱酸為冷矣治法治熱之分當審於此決不可輕用下藥惟腹滿胸脹視何部不利而利之因詳論及此不可不審

脉病證

治

右關浮緊

脾胃宿寒面青吐酸水

濟生加減理中湯丁香半夏元胃丹活金養種湯局方丁香散散丁附治中湯

關洪數

胃皖蓄熱

虛煩面紅舌冷心滿嘔血淡手足心熱

小承氣湯

濟生行氣湯赤芍藥湯小柴胡湯加竹青

寸口滑

停痰結氣

眩暈胸滿少食小便少頭目疼

局方霍香半夏散陳湯平縮木丁香五香元胃湯濟生丁香半夏元胃香散旋覆花湯

諸噎

脾胃虛弱

惡谷食面青黃

加減四君子湯參苓白朮散丁香五香元胃養脾元胃湯

難治虛

脾胃受濕

嘔黑汁

丁沉透膈湯赤芍散濟生加減理中湯丁香元胃丹百濟安脾散

參瀉湯正氣散五寶散



朝起嘔吐飲食酒中積

婦人虛 夜則嘔嘔肝木克土應四不周

婦人癰

中毒困酒其發

蘇感元金露元紅元勝紅元青元利和精血元

局方內氣散蘇葉湯參香散

局方半夏茯苓湯安胎飲竹茹湯

齊生參橘散滋陰散半夏湯

因酒升湯黃連散散陳湯背發引香散嘉禾散

傷寒咳嗽

秋傷於風冬咳嗽又至五藏六腑皆有咳嗽肺指咳嗽先於肺肺為五臟華蓋聲音所從出皮毛賴之而潤澤邪水由榮而生養凡傷寒感冒有咳嗽為重以和氣不傳入藏者傳入五藏六腑而咳漸重蓋之下關胃中疝氣古人多作九竅之傷寒咳而小便利者不可汗汗則氣逆而咳為難治中堅為逆肺敗者為危公利於肺金匱賊相刑者死

脉病證

治

太陽證熱在表飲水咳嗽表不解心下水乾咳發熱而咳為水飲為表寒相合也

少陰證咳而喘重腹脹者亦有水小便利自利而喘為水飲與里寒相合也

三陽寒中風往來寒熱胸脇痛不食煩

三陰嘔咳此陽邪自表傳裏動肺而咳

小青龍湯小便利小腹滿去麻黃加茯苓

真武湯加五味子細辛乾姜病在陽以青龍

去之病在陰以真武湯主之

小柴胡湯去參大棗生姜加五味子乾姜

沉緊

字



微者

大陰病里氣逆喘中痛或泄利而咳
少陰邪傳裏動肺而咳

四逆散加五味子乾姜

微者

不利不日咳而泄瀉煩不得眠
痰逆至矣煩渴燥倦急惡寒

猪苓湯古今錄驗橘皮湯尤良
橘皮湯不寒寒竹葉湯

雜病咳嗽

咳嗽自肺傳至感臍咳不已而後大府受之至三焦受之咳而腹滿不欲食其始關於
肺終則聚於胃使人多涕唾而面浮腫氣逆也治法當審脉證三因若外因邪氣當發
散之須厚甘肅實於熱若內因七情則隨其部紐在與氣脉相應浮緊為虛寒次數為實
熱弦滑為少無滑為多痰當順氣為尤下痰次之有停飲而咳又須消化之功不可用烏梅
罌粟酸之藥其寒邪除亦可信用補藥尤忌憂思過度至憂傷遂成癆瘵養脾生肺

脉病證

治

浮

風 憎寒身熱惡風身汗煩躁渴清

敗毒散加葉白皮金沸散加杏仁三拗湯溫經五柳湯
濟生香蘇湯久咳久咳散麻黃甘主根節

緊

寒 發熱無汗煩躁渴喘熱湯
止者冷也呼冷者熱也

華蓋散金沸散青龍湯杏仁湯如麻黃湯肺湯
款冬花散百溫人參飲子烏龍中化痰元清肺湯
簡易金沸仁齊加減連中湯御院八味款花散

數

暑 煩渴引飲咽乾喘稠黃風
頭疼有熱

竹葉石膏湯人參胡藹白皮麥門冬三拗湯蘇合香湯
金沸草散濟生香蘇散久咳加五味子杏仁



濕

四支重痛即寒熱風頭痛
面目浮小便不利

寒濕

喜傷心 自汗煩熱喘咳咯血痰腫

驚風

怒傷肝 左脅痛腹脹疼或嘔

驚悸

思傷脾 右脅痛腹脹嘔或頭目腫

驚而乳

憂傷肺 涎白唾自鼻聲嘶咯血

左足浮滿而數

恐傷腎 懷月引痛等症

諸數脈

勞咳 身疲盜汗異夢發熱熱
骨蒸或有傳

近太而滑

生沉伏

氣結 胸滿夜臥起數不止

能

虛冷 憂思頭眩盜汗四支厥小便清

發實

實熱 胸滿咽渴面赤小便赤或肺癰

嗽嘔吐至飲食痰物皆盡肝亢脾土

楊氏湯曰散濟生白朮散仁齋味理中湯

三因五氣飲無風生氣散和敗毒散及薄荷煎

濟生團參飲子通治五藏咳嗽所傷

團參飲子

楊氏湯曰散濟生團參飲子

肺癰咳血理懷濟生三因理中湯寧歷散團參飲子紫菀湯

局方鍾乳補肺湯參養肺元三因扶本補心湯

三因扶本補心湯濟生團參飲子潤肺元

御院紫參三元局方人參養肺元通見勞瘵門

前易九室湯礬石香三因平氣湯參蘇飲加板安

團參飲加木香豆蔻人參紫苑湯楊氏大降氣湯

御院蠟煎散局方養肺元潤肺元三夏元主參散

理中湯加五子沉附湯黑錫丹

小柴胡加桑白皮麥門冬行葉石高湯玉液元主元

局方溫中化痰元溫肺湯潮飯理中元主參散

五弱言
采大為
火克金

血痰
和手咳痰有紅不進食

動胎 因日久氣入肺傳入肺經

前五味子調理中湯鍾乳補肺湯熟用團參飲
子所藕節地黃汁換加反藥略飲童子
小便浸杏仁煉膏入蜜少許啗
簡易九室湯黃圓豆紫金丹

又去合白片上兩張大南星兩沙至煙透已耳半去油其末二錢作茶和勻大人一錢小兒半錢姜茶服

心湯臨卧一服至常華蓋散打和太蘇飲服婦人九室湯和清肺湯如言婦煎服

暴嗽要散毛用條不對者去黑皮并子江子三去油半夏三不杏仁五去皮炒焦黃為末每服半錢生
姜汁調於手心用舌點之其效思矣薄油服

一切素咳用好乾姜并無紅皂用去皮紫辣桂三寸等分煉蜜拌為元梧桐子各每服三元遇發

即服忌葱油鹹醒其効如神凡嗽不敢服此藥試之方知其妙本草

痰嗽終又不寐面淨如盤蚌粉一味新居通紅梓青八小軒用滾水清油數滴服効如神

肺虛久嗽或主寒熱落家用款花芽三兩於瓦罏內燒煙以口吸至倦常作之

傷寒喘急

中藏經云疾風暴雨天地節節肺乃陽中之陽諸氣屬肺諸喘亦傷肺居五臟之上為華蓋專清虛
而欲寧也陰陽不和形寒飲冷則傷肺故氣逆而行氣粗息數張亡擗有搖身滾肚是為
喘也傷寒發喘有太陽陽明二證屬熱可刺河間云寒水為陰主寸遲緩熱火宜陽主寸急
寒則息遲氣微熱則息數氣餘而為喘矣故仲景所用皆清利下藥

脉病證

治



仇

清

淨

強則生
滿則死

太陽病頭痛發熱惡寒無汗而喘者

醫家王利不脈以表裏辨之而喘者

若因喘而汗出者邪氣在裏難表水解

若因汗出而喘者邪氣在表難經汗下

不惡寒反惡熱心腹下微滿汗出胃中乾煩

煩熱大便硬氣脹滿而喘或譫語裏證也

心腹連臍在肺腹脹出則不安喘急

太陽陽明合病喘而胃滿者

發汗後引飲心下有水者嘔吐發熱微喘

發汗後小便不利小腹滿而喘

水傷心下腎氣乘心為悸為喘

太陽煩躁全不與水無由作汗發喘欲死

或發散後小滿結喘也

陽明病汗出不惡寒腹滿而喘或有潮熱

潮熱獨語者死按腹則不硬人尋衣臥

空直視微喘或譫語

頭疼身熱自汗身體重者必喘其形不仁

但欲眠者風溫證

賊風虛邪入府身熱不時一為喘呼

傷風發湯

桂枝加厚朴杏湯汗後不可行桂枝湯

麻黃根黃芩黃連湯以和之

麻黃黃芩甘草石膏湯以發之

小承氣湯微瀉之不可大泄也

小承氣湯微瀉之不可大泄也

宜麻黃湯不可下

小青龍湯厚黃加杏仁發散水氣麻黃湯去

之則氣易順杏仁苦溫加之以逆氣

小青龍去麻黃加茯苓

五苓散或陷膏丸

五苓散或陷膏丸

取氣湯然陽明多汗無汗脈浮而喘黃連湯

大承氣湯一服利則止

姜糖湯



雜病喘急

肺以清陽充之氣居五臟華蓋之上通榮衛合陰陽升降往來無過不及六淫七情之所傷感飽食動作藏氣不扣呼吸不意不得宣暢而為喘急亦有脾腎俱虛之氣能發喘急者其因或感邪則肺散之氣弱則調順之脾腎虛者溫理之更有產後喘急為危疾見濟生方中

脉病證

治

有子日氣

風寒

應手有力肺

實也必上蒸

喘逆咽塞

欲嘔自汗

胃肺實證

若氣急前

陰厥應手

無不煩乾

無不煩氣

肺虛證

肺浮滑手

尺脈者生

上氣急不得臥

暑濕

中氣或虛不出

胃熱

證

痰氣

停滯於肺或

大便不調

虛喘

喘微苦黃黑氣短

真喘

喘微苦黃黑氣短

局方三拗湯華蓋散人參定喘湯杏蘇散蘭易九室湯

滋陰去拘湯二因仲祖湯濟生痛蘇散

秘傳麻黃湯加減麻黃有汗不去而無汗去根黃川升麻升細辛

桑上及桂枝止其苦等分熱如小麥根濕如蒼朮善惡煎

溫熱服或加川芎乾薑川芎則群隊矣虛冷人勿服

輕者蘇散加紫蘇五枰或打和升麻湯姜蔥煎濟生去寒湯

蘇子降氣湯知母仁桑白皮紫蘇湯蘇子降氣湯加五味子

濟生四磨湯黃元易易蘇子降氣湯松傳降氣湯加枳實

分氣飲蘇散制半夏七不推散是用去皮蜜炙于半甘五子

生薑兩拍太水煎前安分頓服沈待制名子絡湯

濟生四磨湯活五味子湯參附湯磨沉膏調鍾乳粉

羅參末胡椒片大果片蠟片常嚼之

參附四磨湯去實即少年鍾乳補肺湯或除

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

