

新刊仁齋直指方論

三



修仁齋直指方論卷之十四

瀉痢

附 脫肛

瀉痢方論

痢與瀉名目不同而感受之源一也風邪得之臍腹脹滿腰膝
強痛寒邪得之面慘惡寒肢體拘攣受暑得之面垢背寒自汗
發渴受濕得之一身盡痛重有浮黃或得之面垢背寒自汗
熱則發熱煩燥冷熱不調者下泄下瀉飲食傷飽者注下酸臭
諸有積以肚熱纏痛推之諸有氣以狀如蟹渤驗之究其受病
之源決之對病之劑大要以散風邪行滯氣開胃脫為先不可
遽用**肉豆蔻****白芍**輩以補住寒邪不可遽投**熟地****白朮**
白芍輩以開泄腸胃邪氣得補而愈盛補之愈盛而愈作不為
纏擾痼痛則為裏急後重所以日夕淹延而未已也痢之赤白
其赤者熱乘於血血滲大腸則赤也若風邪挾熱則所下黃而

赤焉其白者冷搏腸間津液凝滯則白也若寒邪併之則所下
白而黑焉冷熱相交故赤白相半重者狀若膿涕而血雜之輕
者白涕中間微有赤縷是也內挾風邪故清血流注或濕毒乘
虛入腸胃之間則下如豆汁或有瘀血是也論者以手足寒為
冷手足溫為熱於理甚當亦當合赤白而並觀之庶乎其的矣
雖然風寒暑濕感之於外者也其有大醫傷飽宿酒漿醢醢以
成積滯房闔縱情加奔走勞役以耗精血此非病生於內者乎
必明別內外而權度之則受病淺深用藥輕重知有定嚮矣毋
誤曰無積不成痢○下痢壯熱須用**敗毒散**加**陳米**間與**五苓**
散連日服之○下痢雖曰有積有暑如用藥不效即是腸胃
有風邪熱者赤者與**敗毒散**冷者白者不換**金正氣散**加**木香**

馮刺證治

敗毒散治風邪寒邪壯熱下痢方見寒熱
陳米飲調**五苓散**佐
之方見水飲門



痢

佐之

不換金正氣散治風邪寒邪冷證下痢方見寒類

治要除濕湯方見吐瀉門加黃連治風寒冷證下痢加乾

薑伏苓治傷濕下痢仍以白朮利其小便

治濕冷下痢方見瀉門加厚朴治濕冷下痢

治濕冷下痢膿血腹痛婦人下血

乾艾葉附子川白薑薑兩炮

右為末醋煮麴糊圓桐子大每染拾圓食前溫米飲下

人參薑散治冷證瀉痢通用

木香厚朴製蒼朮乾薑炮

肉豆蔻各兩半陳皮炒阿膠炒

罌粟殼去筋縮砂炒甘草各兩半

右剉每參錢薑薑煎食前服

黃連散五物黃連湯方見暑門治傷暑下痢五苓散



升麻湯

升麻

白芍藥

甘草

各拾兩

白乾葛

拾伍兩

右麗末每參錢薑參三片同煎吞

方見寒門

治傷暑下痢纏痛

治暑痢

方見寒門

藥皮湯

方見寒門

治熱證發熱下痢亦

香連圓

治冷熱不調瀉痢

黃連

去味連用

方見寒門

木香

壹分

右取香連為末醋糊圓桐子大每參拾圓米飲下前

通用

真人養臟湯

治冷熱不調下痢

方見瀉門

依前法用之

三寶散

治食積下痢腹痛

方見瀉門

依前法用之

紅蓮圓

方見瀉門

料藥雄黃圓

方見瀉門

治諸積下痢用

五寶散

送下

和劑流氣散

大異香散

五寶散中散

方見瀉門

治諸氣痢



痢

治氣痢如蟹動

草撥末

牛乳

右同煎減半空腹服

治赤白下痢

吳茱萸

黃連

大腸痢半寸壹錢同

右各碾末醋麪糊圓桐子大赤痢專服白痢專服赤白併服或多或少以意增減每服茶拾圓陳米飲下以愈為度

治風冷客入腸胃泄下鮮血及腸胃濕毒下如豆汁或

下瘀血

人參

白茯苓

川芎

當歸

辣桂

白朮

白芍藥

等分

右剉每服參錢藥末百餘粒同煎食前熱服腹痛加木香

肉桂治冷證久痢不止

方見漏門



附子湯 方見類編 木附湯 方見類編 治虛損久痢

四肢厥冷以意擇用

禁口痢方

石蓮肉 目黃

右為末每服貳錢陳米飲調下便覺思食仍以日照東方壁土炒真箇為末薑棗略煎佐之

斷下止赤白痢

茯苓 白朮 各壹錢 甘草 半錢 草果 連皮壹枚

大罌粟殼 炒去毛 加木香 半錢

右為籠末分作兩服每服薑伍片大棗叁箇大烏梅叁箇食

前煎服固腸 方見溫門 通用

至末白治臍腹久虛止瀉止痢

陽起石 入甘肅乾薑 白石膏 煨紅

左顧牡蠣 白者各壹兩 種乳粉 壹兩



脱肛

右研極細如粉和粳米糊圓空心米飲下渴者人參湯下
亦治腸風下血又

赤石脂禹餘糧湯治瀉痢諸藥不效以此固其下焦

赤石脂劉小埤禹餘糧 瀉痢滑以碎為度

右等分夾和每服肆錢空心煎溫服

瀉痢須要末服周密恐瀉風冷九蘊熱血利裏急而痛甚雖已
疎通瀉滌然其痛不減者非熱亦非積也榮血虧心陽剛勝陰
故爾用藥當以

脱肛

脱肛方論

四十八難曰病之虛實出者為虛入者為實肛門之脫非虛無
故然哉蓋惟實則溫溫則內氣充而有所畜惟虛則寒寒則內
氣緩而不能收而沉大腸之厚薄膏脂之瘠肥亦視夫內氣之

虛實何如耳大凡脫肛須以溫湯澆令和軟然後摩掌而入治法以溫斂行之其有產婦用力過多及小兒叫號努氣久痢不止風邪襲虛亦有此證○凡腸頭作癢即是腹中有虫(金匱)煎藥煎湯熏洗仍以(防風)煎服其脫肛腸風痔漏者登溷不可用舊紙若包裹湯藥雜物尤不可用縱有一毫染汚其間立見痛腫如此急以溫湯滌之患在肛腸登溷後須用一洗

脫肛證治

蠟皮治肛門脫出不收

蠟皮黃蠟黃白蠟各等分

辣桂參桂

磁石半兩法醋煎數沸

右細末每服貳錢食前米飲調下仍以破草鞋底炙上面熨按令入

驚頭治脫肛

驚頭慢火炙



脫肛

右為末塗傳腸頭用軟紙糊輕輕接入仍以方寸匕食前不飲調下

磁石治脫肛

磁石半兩入煎沸藥中久煮火

右為末每服壹錢空心米飲調下

香薷散治脫肛

大香附

荊芥穗各半縮砂實錢半

右末每服叁錢食前新水煎數沸即服小兒通用

白礬治大腸虛冷脫肛不收及腸風諸痔

白礬

綠礬

訶子

枳殼

白附子

生南星

生半夏

生附子

黃瓜羹

言菌燒存性

蠟皮

言菌燒存性

雞冠花

劉妙司兩半

胡桃仁

朱簡不用油者

右細末醋煮麪糊圓桐子大每服貳拾圓空心溫酒下或



脫肛送下

治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

縮砂

黃連

木賊

右末每貳錢米飲調下

黃連

治腸虛為暑熱所攻脫肛紅腫肛門熱

痛仍以

治大腸本虛風毒客熱乘之脫肛紅腫

鐵粉

治大腸本虛風毒客熱乘之脫肛紅腫

鐵粉

右入三錢末夾和傳之即接

治脫肛熱痛

生蒲黃以猪膏和傳即接

治脫肛

桑根上緣桑螺子

右末以和塗兩後緣桑者佳



脫肛

橡斗子燒存性指脂和傳

橡斗子燒存性指脂和傳

木賊燒存性為末慘以帛接入

木賊燒存性為末慘以帛接入

獨虎散治脫肛不收（五倍子）半兩末井水參碗入磁瓶內慢火

煎半續入（白胡椒）各壹錢東熱薰洗仍以（五倍子）末傳之

石灰方治大腸積冷久年脫肛

石灰炒熟以帛包裹肛坐其上冷又別換仍以（五倍子）末傳

收口方小兒割後風邪入大腸脫肛不收以此散風邪加（陳米）

煎方見寒熱類

桑葉方

黃皮桑揆取葉參升煎帶溫

右以布盛菴小兒肛門輕手按入次用門臼中細塵綿蘸撲之

直取前後髮際折中橫取兩耳尖折中在頭



之中心端正螺毛處是也兩手握蒜灸則肛腸自收
蟲蝕肛門咽乾唇蒼齒晦方見活人總括

增修仁齋直指方論卷之十四

增修仁齋直指方卷之十五

積熱

附

癰冷

秘瀝

轉胞

便多

積熱方論

酒麪煎燂雄附峻補皆能生熱謂之積者何哉朝斯夕斯其所由來尚矣夫人偏陰不可以無陽偏陽不可以無陰惟在冷煖得中而已矯枉過正識者憂焉然則欲去積熱將何如曰
湯第一藥耳雖然凡熱皆出於心熱甚則能傷血熱出於心
所不可關熱能傷血
四順清涼散又不可無此自本自根之論也若夫酒後之麪飯後之酒最易積熱又當防於未然

積熱證治

小兒疳積

諸熱通用

方見傷寒總論

敗毒散

解熱次之類

方見寒

三黃湯

治積熱蘊隆三焦皆熱大小便閉

積熱

黃連

黃芩

大黃

等分

右剉細每服三錢蜜冬片慢火罌煎食後服

三黃圓證治同前即前項藥品等為末煉蜜圓桐子大每冬肆

拾圓熟水下

洗心散治壯熱煩燥風熱壅塞大小便秘澀

大黃濕熱煩燥甘草炒當歸芍藥

麻黃不去心荆芥穗各冬白木各錢半

右末每服貳錢半生薑酒同少許同煎食後服

四順清涼飲治血熱蘊結壅滯

大黃米上蒸赤芍藥當歸甘草各錢等分

右為灑末每貳錢半慢火煎服小兒調湯亦治血熱可擇用

心散治心熱煩燥目赤咽疼小便淋閉

大黃濕熱煩燥瞿麥木通滑石

篇竹車前子山施仁甘草各錢等分

右剉每服三錢入燈心煎食後服大凡心熱要得小便流利

積熱

而出

甘露飲 治諸瘡發熱

生乾地黄

熟地黄

天門冬

麥門冬並去心

黃芩

枇杷葉刷去毛淨

山茵陳

枳殼製

石斛

甘草

炙等分

右末每服貳錢半食前煎服加**藍芩****紫胡**尤佳

木通散 治諸熱利小便

生乾地黄

木通

荊芥

地骨皮

桑白皮炒

甘草

北梗等分

右剉每三錢**薑**二片煎服

甘豆湯 治諸熱煩渴大小便不利

黑豆貳合

甘草貳錢

右生**薑**柒片井水煎汁服

黃連湯 治一切熱血熱眼熱酒熱並主之

黃連 去鹽劉寄

右以井水浸良久磁碗盛之置鐵鉢內隔湯泔取清汁服再泔

馬牙硝

寒水石

硬石膏

甘草

微炙壹兩

牛膽南星

叁分

紫石英

研飛半兩

牛黃

腦子

麝香

各壹分

右末煉蜜圓每兩作肆拾圓每服壹圓溫酒下人參湯調下

解毒雄黃圓 取積下熱

雄黃

研飛

川鬱金

各壹分

巴豆

治肆箇去油

右末醋煮麪糊圓蒜子大每服伍圓加至七圓熱茶清下裏

實用此喉閉以熱茶清調灌

竹茹湯

治胃熱而嘔吐欲知胃熱手足心皆熱者是

半夏

叁分

水壹升

煎

去滓

乾葛

叁兩

甘草

叁分

右剉散每叁錢青竹茹一彈子許薑棗煎溫服或加前胡

諸熱酒家黃連圓 黃連阿膠圓皆可用

