

方處撰新

譯編 龔鴻年

上海錦章書局出版

R289
33

R289
方處撰新

編譯 鴻鵠

上海錦
早書局出版

新撰處方

印數 1—2000
50開 456面

編譯者 牟鴻彝

出版者 錦章書局

上海(十二)太倉路 135 號

發行者 通聯書店

上海山東中路 128 號

印刷者 大新印刷廠

一九五四年五月重一版 定價人民幣 16,000元

例 言

- 一 本書是臨床醫家處方之南針，又是一小藥治學、專供日常座右便覽之用，故以實地應用及簡便爲旨，選錄各種藥劑都是常用的有效藥品，各處方例，完全根據吾人實際上的經驗。
- 一 摘錄有各藥劑的藥理，醫治效用，副作用，適應症，禁忌症，及調劑法等的大意 以備忘記時參考應用，又於各劑之末設有注意欄及備考欄，詳記緊要的事項。
- 一 各處方例只揭其主要的，但附有應有配合藥品和禁忌，可隨機配合。又在各劑之後，均附註原文 以期處方、藥名、及用量的正確，而便覽者對照，至於略省的原文，用有略點（・）標明之。
- 一 劇藥及毒藥名一一記入極量，更爲便利記憶起見，特反覆記載，又在主要藥品的後面，揭有小兒用量。
- 一 藥品數量等皆根據普通處方例，皆用米突法。
- 一 卷末揭載有第四改正日本藥局方毒藥劇藥極量

表、藥室常備藥品表、及藥品貯藏法注意表。

編者識。

三次增訂序言

本書原係翻譯本，在 1950 年首次增訂，將新藥處方盡量加入，原書四十一章，增補後加入『青黴素』、『化學治療劑』、『腺體製劑』、『維生素劑』、『急性中毒的處置』五章，並於原有各章中分別增入新藥。又在附錄中增加『處方及處方箋』、『處方箋中服法說明』、『處方應用拉丁略語註解』、『計量及記法』等項。增訂後全部改用語體文，以便廣大醫務工作者普遍採用。

1952 年經讀者來信，提供意見：本書內容適於臨床應用，但遺漏『菌苗及血清製劑』一章，要求補編加入，趁第五版付印時，補編『疫苗、菌苗、類毒素及抗毒素的應用』，同時又加入『臨床對症特效藥表』，又將治結核病的新藥異菸肼插入第六章肺癆劑之末。

本書原由北新書局出版，因出版專業方向不同，故移轉錦章書局出版，該局許德榮君，囑我重加修改，除把錯誤的地方挖補，又在三三章眼科用藥內，加入砂眼用金黴素及氮黴素溶液處方。以後仍希讀者提供意見，以便隨時修訂。

牟鴻彝，於上海 1954 年 4 月 18 日

目 次

一	清涼劑 (Temperantia)	1
二	飽和劑 (Saturationes)	5
三	解熱劑 (Antipyretica)	9
	(附記) 瘧疾新藥	34
四	強心劑 (Cardiotonica)	35
五	祛痰劑 (Expectorantia)	50
六	肺癆劑 (Antiphtisica)	60
	(附) 派斯 P. A. S.	68
	鏈黴素 (Streptomycin)	
	異菸酸醯肼 (Isonicotin Acid Hydrazide)	
七	吸入劑 (Inhalans)	72
八	含嗽劑 (Gurgelwasser, Gargarisma.)	75
九	鎮痛劑 (Anodyna, Analgetica)	77
一〇	鎮靜劑 (Sedativa)	90
一一	催眠劑 (Hypnotica, Schlafmittel.)	96
一二	吸入麻醉劑 (Inhalations-Anaesthetica, Narcotica.)	104
一三	局所麻醉劑 (Lokalanaesthetica.)	107
一四	注射劑 (Injektiones)	114

一五	興奮劑(Analeptica, Excitantia.)	121
一六	吐劑(Emetica, Brechnittel.)	124
一七	下劑(Cathartia. Abführmittel.)	129
一八	利尿劑(Diuretica, Harntreibendes Mittel.)	150
一九	尿防腐劑(Harn-Antseptica)	163
	(附)尿防腐消毒新藥處方	168
二〇	發汗劑(Diaphoreica)	174
二一	止汗劑(Anidrotica)	177
二二	鎮吐劑(Antiemetica)	180
二三	止痢劑(Antidiarrhoica, Obstipantia)	184
二四	止血劑(Haemostyptica, Blutstillendes Mittel.)	195
二五	健胃劑(Stomachica)	205
二六	強壯劑(Roborantia)	221
二七	驅梅毒劑(Antisymphilitica)	233
二八	驅蟲劑(Anthelminthica, Wurmabtreibendes Mittel.)	248
二九	通利灌腸劑(Eröffnende oder Entleerende klystiere, Clysmata evacuantia)	259
三〇	腸洗劑(Enteroklyse, Mittel zur Darmspülung)	261
三一	滋養灌腸劑(Clysmata nutritia,	

	Närklystiere.)	262
三二	膀胱洗滌劑 (Lotiones vesic. urin., Mittel zur Blasenspülung.)	266
三三	眼科用藥 (Ophthalmica, Augenmittel.)	268
三四	婦科用藥 (Gynaekologisches Mittel.)	274
三五	外科用藥 (Chirurgisches Mittel.)	280
三六	膏藥 (Unguenta, Salbenmittel.)	282
三七	撒布藥 (Pulvis adpersorii s. crinalis, Streupulver.)	289
三八	塗布藥 (Bepinselungsmittel, Guttæ Pro usum externum)	290
三九	粘膜塗布藥 (Bepinselungsmittel der Schleimhäute, Frictiones mucosus)	292
四〇	坐藥 (Suppositoria)	294
四一	尿道洗滌藥 (Mittel zur Urethralspülung, Lotiones urethrales)	297
四二	青黴素 (Penicilin)	298
四三	化學治療劑	300
四四	腺體製劑	320
四五	維生素劑	326
四六	急性中毒的處置	338
四七	疫苗、菌苗、類毒素及抗毒素的應用 ...	358
四八	臨床對症特效藥表	367

附錄一

小兒藥物用量算出表	376
-----------------	-----

附錄二

毒劇藥極量表	377
藥局常應貯藏的藥品表	384
藥品貯藏法注意表	386
倍與%	390
配合禁忌一覽表	391

附錄三

(一)處方及處方箋	402
(二)處方箋中服法用語	404
(三)處方應用拉丁略語註解	407
計量及記法	412

索引	415
----------	-----

一 清 涼 劑

(Temperantia)

○清涼劑有清涼，止渴，消化的作用。

第一方（鹽酸清涼水）（稀鹽酸清涼水）

稀鹽酸 *Acidi hydrochlorici diluti* 0.8

純糖漿 *Sirupi simplicis* 10.0

溜水 *Aquae destillatae* 100.0

上爲一日量，三回分服。S. Täglich 3 mal zu nehmen.

○此處方如稀鹽酸爲1.0。則酸性過強。（藥局方爲0.5）。

○稀鹽酸爲鹽酸一分，蒸溜水二分和成。

○稀鹽酸使用豫先製成十倍用者爲便。

○所謂清涼水（Limonade）者，即含有糖分的酸性飲料的通稱。

○純糖漿即六五分的白糖，溶解於三五分的熱蒸溜水內而成。

○純糖漿先加蒸溜水稀釋後使用，較爲經濟。（通

常一廿糖漿內，加入溜水 100.0) (夏季注意)

第二方 ($\frac{1}{2}$ 鹽酸清涼水) ($\frac{1}{2}$ 稀鹽酸清涼水)

稀鹽酸 Acid. hydrochlorici diluti 0.4

純糖漿 Sirup. simpl. 10.0

溜水 Aq. destillat. 100.0

○主用於小兒，視年齡的大小，而用適當的分量。

【應用配合藥品】 (第一方)

●苦味酊 (Tinctura amara)

●胃液素 (Pepsinum)

●含糖胃液素 (Pepsinum saccharatum)

●規那酊 (Tinctura chinae) (規那劑與醋酸鉀液，硫酸鎂，法列水兒，禁忌配合。亦與赤酒禁忌，但配以酸質，則無妨害。)

●杏仁水 (極量一回 2.0 一日 6.0) 。 (Aq. pruni armeniaca) (Aqua Lauro-Cersi)

●莨菪酊 (極量一回 1.0，一日 3.0) 。 (Tinctura Scopoliae)

●莨菪浸膏 (Extractum Scopoliae) (極量一回 0.05，一日 0.15) (使用豫製成五倍用至十倍用的乾燥膏，較為便利) 。

●硫酸鎂 (Magnesium sulfarum) (硫酸鎂與規那劑禁忌)

●赤酒 (Vinum rubrum) (赤酒與規那劑禁忌；

但加酸配合,即無妨害。)

●毒毛旋花酊 (Tinctura Strophanthi) (極量一回 0.5, 一日 1.5)

●狄茄林 (Digalen)

●龐吉他耳 (pangital)

●狄吉他民 (Digi-amin)

●番木鱧酊 (極量一回 1.0, 一日 2.0) (Tinctura Strychni)

●桂皮酊 (Tinctura Cinnamomi)

●橙皮酊 (Tinctura Aurantii Corticis)

●芳香酊 (Tinctura aromatica)

●薄荷水 (Aqua Menthae)

●間苯二酚 (Resorcinum)

●美鼠李皮浸膏 (Extractum Cascarae Segradae fluidum)

●麥角流浸膏 (極量一回 0.3, 一日 1.0) (Extractum Secalis cornuti)

●阿片酊 (極量一回 1.5, 一日 5.0) (Tinctura Opii)

●治瘡蔓皮流浸膏 (Extractum Condurango fluidum)

●覆盆子糖漿 (Sirupus Rubi Ideai)

●安替芞林 (Antipyrinum) (極量一回 1.0, 一日

3.0)

● 疋拉米董 (極量一回 0.3, 一日 1.0) (Pyrami-
donum)

● 阿斯疋林 (Aspirin)

● 俄波疋林 (Opopirin)

● 鱗片醋基水楊酸 (Acidum acetylsalicylicum)

● 鹽酸規寧 (Chininum hydrochloricum) (須多
加純糖漿)

備考

△ 碘化鉀, 溴化鉀, 醋酸鉀, 水楊酸鈉, Brocin, 大
黃浸及大黃酊等, 均與酸性配合禁忌。

▲ 消化不良的時候多用稀鹽酸, 一歲以下的乳兒,
不宜飲用這種酸味飲料, 普通乳兒胃酸充足者, 亦不宜
與以酸性劑, 且須要時常投以重碳酸鈉水, (重碳酸鈉
水以 0.5 至 1.0% 爲適量)

△ 其他各種清涼水 (Limonade)

▲ 0.5% 枸橼酸清涼水

▲ 0.5% 酒石酸清涼水

▲ 1% 稀磷酸清涼水

▲ 0.5% 稀硫酸清涼水 (有止血作用)

▲ 1% 乳酸清涼水 (對於下痢有制瀉作用)

△ 稀磷酸 (磷酸 1 · 蒸溜水 1)

△ 稀硫酸 (硫酸 1 · 蒸溜水 9)

○次列處方亦可作清涼劑用。

重酒石酸鉀 *Cremor Tartari* 1.5—5.0

純糖漿 *Sirup simplicis* 10.0

溜水 *Aq. destillatae* 100.0

右一日量，三回分服，(用時振盪) S. Taglich

3 mal zu nehmen.

【應用配合藥品】

●苦味酊 (*Tinctura amara*)

●洋地黄劑〔洋地黄酊 (*Tinctura Digitalis*) (極量一回1.5，一日5.0)〕

●醋酸鉀液 (*Liquor kali acetici*)

●芳香酊 (*Tinctura aromatica*)

●橙皮酊 (*Tinctura Aurantii corticis*)

●薄荷水 (*Aqua Menthae*)

●毒毛旋花酊 (*Tinctura Strophanthi*) (極量一回0.5，一日1.5)

二 飽 和 劑

(*Saturations*)

○飽和劑有矯味，鎮吐，和利尿的作用。

第一方 (攝爾特水 Selterswasser)

酒石酸 <i>Acidi Tartarici</i>	1.5
重碳酸鈉 <i>Natrii bicarbonici</i>	2.0
純糖漿 <i>Sirup. simplicis</i>	10.0
溜水 <i>Aquae destillatae</i>	100.0

上爲一日量,三回分服 S. Täglich 3 mal zu nehmen.

第二方 (無糖漿 Selterswasser)

酒石酸 <i>Acidi tartarici</i>	1.5
重碳酸鈉 <i>Natrii bicarbonici</i>	2.0
溜水 <i>Aq. destillatae</i>	100.0

上爲一日量,三回分服 S. Täglich 3 mal zu nehmen.

第三方 (美味 Selterswasser)

枸橼酸 <i>Acidi citrici</i>	1.8
重碳酸鈉 <i>Natrii bicarbonici</i>	2.0
純糖漿 <i>Sirup. simplicis</i>	10.0
溜水 <i>Aq. destillatae</i>	100.0

上爲一日量,三回分服, S. Täglich 3 mal zu nehmen.

各種 Selterswasser 對於小兒的用量,隨年齡大小而用適量。(重碳酸鈉多係結晶,可細挫後使用)

【應用配合藥品】(第一方)

- 苦味酊 (Tinctura amara)
- 鹽酸可卡因(極量一回0.05,一日0.15) (Cocainum hydrochloricum)
- 薄荷水 (Aqua Menthae)
- 洋地黄酊 (極量一回1.5,一日5.0) (Tinctura Digitalis)
- 磷酸可待因 (極量一回0.1,一日0.3) (Codeinum phosphoricum)
- 甘硝石精 (Spiritus Aetheris nitrosi)
- 碘化鉀 (Kalium jodatum)
- 碘化鈉 (Natrium jodatum)
- 溴化鉀 (Kalium bromatum)
- 溴化鈉 (Natrium bromatum)
- 莨菪酊 (極量一回 1.0, 一日3.0) (Tinctura Scopoliae)
- 莨菪浸膏(極量一回0.05,一日0.15) (Extractum Scopoliae)
- 桂皮酊 (Tinctura Cinnamomi)
- 芳香酊 (Tinctura aromatica)
- 橙皮酊 (Tinctura Aurantii Corticis)

備考

△清涼水的簡易調製法:

薄荷油 Olei Menthae

1.0